



39671A

Exp 10 days  
9th

~~5~~  
Mar. 18

2.50

N. III

7/8

6690

1218





IGN. GBT.  
PARDIES  
Opera  
MATHE-  
MATICA.



12880.  
P. IGN. GAST. PARDIES S. J.  
OPERA

MATHEMATICA

*Bibl.* <sup>continentia</sup> ELEMENTA *BanH.*

GEOMETRIAE

DISCURSUM

DE

MOTV LOCALI

*at* STATICA *M. J. J.*

*fr. Theoph. afi* ET *Schwarz*

*Duas Machinas, ad conficienda*

HOROLOGIA SOLARIA


*babiles,*

In quibus omnibus nobilissima veterum &  
recentiorum Geometrarum & Mechanicorum  
inventa Methodo brevi & facili traduntur

IN USUM STUDIOSAE JUVENTUTIS  
LATINITATE DONATA.

EDITIO TERTIA.

VENÆ, Sumptibus GEORGII CHRIST. TROEBERT.  
MDCCXXI.





## AD LECTOREM.

**P**RODIT L. B.  
altera pars tra-  
ctatum PAR-  
DIES quam diu  
promiserat diuque Viri do-  
cti expectarunt; certè si Bi-  
bliopolæ Batavo licuit pro-  
crastinationem ejus in rari-  
tatem librorum gallico-  
rum, ex inopinato bello fu-  
nestissimo ortam, conjicere,  
& nostrati idem licebit, eo-  
que magis, quo tam mone-  
tæ depravatio momentanea  
ferè, & neglectus Mathe-  
matici-

maticorum studiorum, majus obstaculum eidem ponant, Ita est, Gallos amamus, gallica desideramus, gallica miramur & æstimamus, & tamen pauci nostrum, nisi in pejoribus, gallos imitamur. Saltandi artem, linguæ peritiam, exactionum modus & tributorum, & si præter inconstantiam alia quædam, Gallis usitata, in Germaniam reduces plurimi afferunt, optimas artes & in easdem studia indefessa Gallorum, nemo reportat. Mathesis apud Gallos sat exquisitè colitur, ipsique Galli eandem omnium belli

## PRÆFATIO.

belli Officialium primariam disciplinam esse volunt, opereque ipso probant, maximum rei bellicæ exinde commodum addi. Rex ipse, quem Magnum cognominant, sumtus prægrandes ministrat iis qui in Mathematicis studiis aliquid valent, inde Architecturæ militaris indefessi cultores dantur, ita ut reliquos præcedere conentur; Geographi, Astronomi & Mechanici talia quoque præstitere, ut nonnulli eorundem de palma cum reliquis gentibus certare videantur. Non nego quidem Germanos quoque

)( ; pos-



possidere quæ Gallis victo-  
riam dubiam reddere pos-  
sint, si non præripere; attamen incitamenta h. e. u-  
niversalis, studii Mathema-  
tici, amplexus & existi-  
matio deest, hinc vilescunt  
libri quoque mathemati-  
ci, & bibliopolæ deterren-  
tur sumtibus, quos in-  
terpretandis exterorum  
scriptis ministrarent. Cer-  
tè mirum est dari qui &  
Juris Studioso haud necesse  
dicant ut disciplinas ma-  
thematicas sciat, satis esse,  
modo ea, quæ in legibus  
tradita de ejusmodi casi-  
bus, noverint; annon, *ve-  
ram non simulatam Philo-  
sophi*

*sophiam*, cum Imperatore  
 profitentibus, necesse est,  
 & hanc utilem Philosophiæ  
 partem intelligere? Novi  
 ego JCtos Mathematicos  
 multis aliis palmam eripi-  
 entes; & quid de Feldeno  
 dicemus, ut alios taceam?  
 quantum lumen ipsi Ma-  
 theseos scientia dederit in  
 resolvendis Juris Quæstio-  
 nibus, satis demonstraret  
 opere ipso, si Senectus per-  
 mitteret. Quantum vero  
 damnum & opprobrium  
 neglectus disciplinarum  
 Mathematicarum attulerit  
 Consiliariis in perlustrandis  
 rationibus, Advocatis in  
 defendendis causis hujus

materiae , Nobilibus ipsis  
in ritè administrandis offi-  
ciis aulicis & bellicis , hoc  
alibi vidi cum stupore. Ne  
igitur & pauci isti quibus  
Mathesis arridet defectum  
librorum aut pretium ma-  
gnum & peregrinam lin-  
guam accusare queant,  
Bibliopola & hosce sequen-  
tes, *de motu locali, luminis,*  
*viribus moventibus, Stati-*  
*câ & horologiographica* ,  
priori Autoris libro *de*  
*Geometria* adjungere vo-  
luit, quorum interpretatio  
mihi ab Interprete prioris  
celeberrimò injuncta , non  
ob peritiam meam , cum  
vel quotidie a tantis Viris  
edo-

## P R Æ F A T I O.

---

edoceri non erubescam ,  
sed quod laudatissimus In-  
terpres aliis negotiis gra-  
vioribus distractus huic  
labori incumbere non pos-  
sit. Quantum ergo mihi,  
qui Galliam ipsam perlu-  
stravi parumper, licuit, ge-  
nuinum sensum secutus  
sum tum artis tum linguæ  
gallicæ. Hoc fateor, Au-  
torem multa non adeo  
clarè tradidisse quæ in præ-  
fatione sua promisit, præ-  
primis quæ Architecturam  
bellicam & Pyrobolicam  
sapiunt, interim in multis  
sua præstitit. Tuum erit  
L. B. operam meam be-  
nevole accipere, & ma-  
thema-

*PRÆFATIO.*

---

thematica non ante despicere, quam eadem edoctus videas nulli usui esse; Vale & fave tuo

*Frider. Vilb. Schu-  
macher / Phil. Mag.  
& U. J. Cult.*



*DISCURSUS*

DE

**MOTU LOCALI,**

UM ANIMADVERSIONIBUS  
IN MOTUM LUMINIS.

~



## PRÆFATIO.

**N**on hic elogia Mechanicæ componere, aut commoda scientiæ de motu exponere constitui. Notum satis, omnia producta aut ex industria humana, aut naturalibus causis provenientia, non nisi per motum fieri. Adeo ut impossibile sit secreta Physicæ penetrare, vel feliciter progredi in inventione & praxi artium, absque adminiculo mechanicorum, hoc est absque cognitione præceptorum motus. Nec totam hanc materiam hic tradere conabor; nimis ampla est quam ut adeo brevi discursu comprehendere possit. Ad ea me restrinxi quæ hujus scientiæ elementa dici possunt, & in specie, communicationem motus in percussio-

A a

cussio-

*cussionibus, considerare insisto. Hanc materiam à Magis viris pertractatam esse verum est; sed plane alia via, quam isti, incedere mihi videor: nam missis hypothesebus particularibus, in ipsis Naturæ fontibus causas omnium istorum effectuum invenire studeo, quos in motu videmus, & exin demonstrationes facere, quæ nullam experientiam præsupponentes, non nisi certissimis puræ Metaphysicæ principiis fundarentur. Propositum hoc sine dubio audax videbitur iis, qui difficultatem illam norunt experientiam sic præveniendi, & Naturæ leges imponendi, quas illa in posterum observet. Forsan & differentia quæ est inter regulas quas formare laboro, & eas quas Dn. Descartes in suis principiis proposuit, ansam dabit curiosis fautoribus Philosophiæ dicti Auctoris, inquirendi in quonam consistent paradoxismi mei, cum ratiocinia quæ facio admodum opposita sint iis, quas plurimi hætenus pro verissimis demonstrationibus habuerunt. Fateor enim ex septem regulis quas Cartesius de motu dat, non nisi*


*uni.*

unicam cum meis concordare; ita ut necessario aut Philosophus hic hallucinaverit, aut ego ipse in errores exstantes inciderim. Cæterum, quid per totam Galliam quoad regulas percussionis, quas nonnulli, celeberrimi Regiarum Academia-rum Mathematici Parisiis & Londini, proposuere, publicatum sit, haud ignoro. Si gloria est nova quedam in scientiis invenisse, eam his viris dubiam non reddam, quam exin contendere poterunt, quod secretâ legum motus invenerint; lubens eam illis cedo, nihilque mihi tribuo. Atamen dicere possum, me tribus jam abhinc annis publice edidisse quod hic in discursu propono; & si regulæ meæ cum istorum conserantur; fortasse conformitatis inibi satis invenietur, ut credas me cum illis in veritatem incidisse; ast satis etiam differentia reperietur, ut judicare possis, me non ab iis hæc didicisse; cum ad hæc non nisi regulas suas simpliciter, absque probatione proposuerint, ego autem omnes quas profero, demonstrare allaborem. Et licet Dn. Huygens speciem nobis fecerit, se  
brevis



brevi libellum editurum, in quo omnes  
suas regulas probaturus; nihilominus  
utut tali viro me nequaquam compa-  
rem, dicere tamen audeo methodum  
ejus à mea planè differre, quoniam  
satis jam se explicuit, & nobis ape-  
ruit demonstrationes suas specialibus hy-  
pothesibus fulcitas. Quicquid sit, men-  
tem meam jam explicavi, quam parum  
solicitus sim de gloria illa, ut habear pro  
autore harum rerum: totam his Viris lin-  
quo; & si iis placuerit me ejus partici-  
pem reddere, ut beneficium accipiam favo-  
rem reputabo, si modo agnoscere velint,  
me cogitationes eorum tetigisse, aut  
ad minimum non longe ab iis  
aberrasse.

[ DISCURSUS ]



DISCURSUS

DE

MOTV  
LOCALI.



I nobis imagi-  
namur, in toto mun-  
do nihil corporei  
præter unum aut  
duos globos esse, &  
de his globis omnia

*Corpus per  
se in disse-  
rens est, ad  
quidem aut  
motum.*

separamus quæ aliqualem sympa-  
thiam aut secretam communicatio-  
nem causari possint, per quam alter  
alterum aut attraheret aut propel-  
leret; uno verbo, si globos hos li-  
beros ab omni speciali determina-  
tione consideramus, absque levitate,  
absque gravitate, in vacuo quodam  
aut ad minimum in spacio plane uni-  
formi, ubi nihil sit quod eosdem ab  
uno latere ad aliud trahat, aut eos im-  
pedire queat quo minus liberè se mo-  
veant; si jam in locum aliquem pro-

truderentur, tunc conciperemus globos hos hosce plane indifferentes se habituros, ut se tangant, aut separentur, vel hic aut alibi sint; quoniam in uno loco non plus inveniunt quam in alio; & per consequens eodem modo indifferentes erunt, ut vel in quiete vel in motu sint.

**Corpus** II. Ita, si præterea concipimus, *quando semel in quiete est, semper inibi manet.* unum ex his globis in quiete alicubi esse, allatum illuc per causam aliquam, quæ potentiâ gaudet movendi vel retinendi corpus; eodem tempore concipiemus illum inibi perpetuò quieturum, nisi adsit nova causa eundem promovens aut de loco trahens eo quod motum ipsi det: Globus enim hic cum per se sit indifferens & ad quietem & ad motum, & semel ad quietem determinatus, impossibile est, ut se ipsum ad quietem hanc relinquendam, & motum recipiendum determinet. Sic perpetuo in quiete hac permaneat oportet, si nihil aliunde veniat eundem illinc auferens.

*Et si semel in motu est semper moveri pergit.* III. Per eandem rationem concipere debemus, quod si alteruter horum globorum in motu sit, pulsus & promotus a Deo, vel Angelo quodam; qui ipsum movere cœpit; concipere,

cipere, dico, debemus, globum hunc qui sic se movere incepit, semper in motu perrecturum, nisi nova adsit causa eundem retinens; quoniam globus hic cum per se indifferens sit ad motum & ad quietem, & semel ad motum determinatus, impossibile est, ut se ipsum ad reliquendum motum & recipiendam quietem determinet. Ita necesse est semper in motu hoc maneat, si nihil aliunde veniat eum inde auferrens.

IV. Probe video per naturam nos *Quies non* eo inclinare ut quietem considere- *est pura ne-* mus tanquam cessationem actionis, *gatio.* & motum ut actionem positivam, quam in nobis ipsis experimur, cum nos movemus aut aliud corpus movere volumus, cum concipiamus corpus manere in quiete, quamdiu nemo illud tangit, aut nulla alia causa adest quæ reipsa qualitatem aut actionem hanc ad motum necessariam ei imprimit. Ita videtur, quod licet corpus semel in quiete existens, in ea perpetuo maneat, non tamen sequatur, quod, si semel in motu sit, perpetuo in eo permaneat; ad se movendum enim actione positiva opus est, & quies nil nisi negatio, aut actionis, vel motus cessatio est.

*Tantum actionis positivæ esse in quiete quem in motu.*

V. Sed si gravitas corporum nostrorum, quæ portare oportet, rigiditas membrorum flectendorum. agitatio spirituum adhibendorum & multa alia aliquam nos experiri faciunt renitentiam, & nos obligant quadam violeutiâ uti ad superanda hæc impedimenta; inde nulla fluit consequentia contra nostram hypothesein, quâ supponimus nullum impedimentum nec gravitatis nec peculiaris inclinationis dari, neque corporis quod extrinsecus resistere possit. Hoc casu manifestum est, non plus actionis requiri ad motum quam ad quietem; & ut corpus quiescat. non minus necesse est illud in quiete positum fuisse quam necessarium est fuisse in motu, ad id ut moveatur. Et revera si consideramus naturam quietis aut motus, reperiemus motum æque dici posse *cessationem quietis*, ac quies dicitur *cessatio motus*: aut potius videbimus utrumque revera positivum quid esse quoniam motus est *status*, per quem corpus locis diversis successive respondet; aut *presentia transiens*, aut *series diversarum presentiarum in locis diversis*: sicut quies est *status*, per quem corpus semper uni eidem-

que



que loco respondet; aut potius *eandem præsentia in eodem loco*. Ita ut quies æque ac motus sit *Status*, aut potius *Præsentia*; cum hac tamen differentia, quod quies sit *Status* consistentiæ & præsentia constantis, quæ semper eadem conservatur; cum e contrario motus sit *Status* mutabilis, & præsentia transiens. Jam quo etiam modo considerentur præsentia hæ constantes aut transientes, si quædam actio aut vis adest, aut quoddam genus causarum, in corpore, hunc ordinem diversarum præsentiarum motus produgens; non minus actione aut vi opus est in quiete ad conservandam eandem præsentiam: quoniam rem aliquam conservare, est eandem perpetuò producere. Manifestum igitur, quod postquam præsentia per corpus in primo momento producta, (loquor cum iis qui veram harum præsentiarum productionem volunt) eadem de novo rursus producatu oporteat, per idem corpus in sequenti momento, ut in quiete permaneat. Jam mihi videtur, tantundem in hoc actionis & tantundem inesse vis, ac ad producendam præsentiam secundam in hoc secundo momento, loco repro-

ducendæ primæ; & in hoc sensu ver-  
sum Poëtæ cujusdam antiqui adhi-  
bere possumus:

*Non minor est virtus quam quarere  
parta tueri.*

Ita, sive oporteat quovis momento  
novam præsentiam, quoad motum  
producere; sive etiam quovis mo-  
mento sive instanti eandem præsen-  
tiam quoad quietem reproducere:  
semper eodem recidet, & corpus non  
minus laboris habebit ad se conser-  
vandam in eadem præsentia, & se  
retinendum in quiete, quam ad pro-  
ducendas novas præsentias & se con-  
servandum in motu. Hinc tandem  
concludendum, quod sicut corpus  
eo ipso quod semel ad quietem de-  
terminatum fit, sufficienter deter-  
minatam quoque ad se conserva-  
tum perpetuo in eadem præsentia;  
ita & statim ac semel determinatum  
ad motum, sufficienter determina-  
tum quoque ad semper novas præsen-  
tias producendas & ita se sine inter-

*Objectiones.* missione movendum.

VI. Non multum temporis te-  
ram respondendo ad omnes instan-  
tias rabulisticas quas facere possumus  
de hac materia cum faciles admo-  
dum sint soluti, Dicunt enim v. g.  
cau-

causam finitam effectum infinitum producere non posse, & motum hunc fore infinitum, quoniam perpetuo duraret. Dicunt eum qui corpus movet ipsi quoque certam qualitatem, quæ *impetus* vocatur, imprimere, & quamdiu qualitas hæc duret, durare etiam motum. Sed qualitate hac cessante, motum quoque cessare: addunt, qualitatem hanc non posse perpetuo durare, cum suapte natura tam imperfecta sit, ut durationem longi temporis non exigat. Dicunt adhuc experientiam testari, omnem motum paulatim cessare: quod in rota violenter agitata animadvertitur; in globulo tudiculari, in area sua agitato; in globo suspensso & aliis corporibus quorum motiones paulatim diminuuntur, & tandem plane extinguuntur.

VII. Dico facillime responderi *Causa finipossit ad has difficultates & multas ta effectum* ejus generis alias. Si motum hunc *perpetuum* volumus esse effectum infinitum, *habere pot-* quoniam perpetuo durat; etiam quies *est.* effectus infinitus dicendus erit, si ita perpetuo durat; & consequenter si causa finita non potest habere effectum infinitum, dicendum erit quod simulac homo corpus aliquod quie-

scere fecerit, corpus hoc non possit perpetuo in quiete hac permanere, sed necesse sit quietem hanc cessare tandem, & corpus se movere incipere; quod rationi non consentaneum est. Magna differentia est inter effectum infinitum, & effectum perpetuo durantem: & si verum est causam finitam non posse infinitum effectum producere; æque verum est, causam quibusvis terminis inclusam, tamen effectum dare posse qui perpetuo subsistat, nisi per novam causam destruat: si enim Quadratam figuram in cera describo, figura hæc semper durabit, si nihil eam corrumpit aut ipsam ceram destruit. Ita non inconveniens est dicere, quietem aut motum semel in corpore quodam productos, in infinitum durare, nisi ab alio destruantur.

*Qualitas*

VIII.

*qua Imperpetuo  
durat.*

quod qualitatem eam attri-  
buitur, nec quam in corpore productam vo-  
lunt per id quod movet, idem mi-  
hi est siue credas eam siue non; hoc  
tantum dico, si qualitas hæc necessa-  
ria est, durabit perpetuo, semel pro-  
ducta, & nunquam existere desinet,  
nisi tunc, cum a nova causa destrue-  
tur. Et in hoc Vasquii sententia  
rationi admodum convenit, dum in  
genere

*Vasquez*

*l. 2. d. 81.*

*c. 2. § 3.*

genere de omnibus formis tam substantialibus quam accidentalibus, & in specie de motu & *Impetu* asserit; quod si per momentum saltem subsistere possint absque influxu primæ causæ efficientis, etiam perpetuo durent, donec per productionem novæ formæ contrariæ destruantur. Si vero in sententia hac persistere volumus & dicere, qualitatem hanc esse naturâ suâ tam debilem, ut sponte destruat; hoc ipso contendo qualitate hac destructa, nihilominus necessum esse, ut motus daret, per rationes jam dictas: quoniam motus cessare nequit nisi quies de novo producat. Jam semper causa positivâ opus ad producendum de novo qualemcunque effectum; cum tamen non sit necessaria ut id quod jam est subsistere faciat; & hæc vera ratio est quare figura quadrata cæ in scripta in æternum duraret, si Deus omnia extrinsecus agentia impediret ne quid in cera corumperent, nam cera figuram hanc perdere nequit, nisi alia figura producat. Et sicut figura de novo existere nequit, absque causa positiva eam producente, qualem nos non adesse supponimus; necesse est hanc figuram primam jam

pro-

productam, semper in possessione existentiae suae subsistere. Eodem modo res se in motu habet; & licet præensus iste impetus existere cesset, motus tamen jam productus, idcirco cessare non debet, quoniam nulla nova adest causa quietem produciens, & motus non potest cessare quiete nondum productâ.

*Corpora  
mota move-  
beri desi-  
nunt, quo-  
niam impe-  
diuntur.*

IX. Tandem, quod videmus corpora propulsa brevi tempore moveri desistere, nihil contra nos probat, quoniam certum est corpora hæc impedimenta motus habere. Videmus quoque motum tanto diutius durare in corporibus hisce, quanto plus impedimentorum auferimus aut diminuimus. Sic globus certe diutius currit in pergula bene planata, quam in via scabra. Rota melius volvitur circa axem parvum & bene tornatum quam circa spissum & irregularem; lapis longius per aerem quam per aquam jaculatur. Ast in sequentibus explicare conabor, quomodo impedimenta hæc motum corporum paulatim cessare faciant.

*Postulatum  
ad certitudinem*


X. Quæ de natura & perpetuitate motus dixi, aliquo modo ad intellectum ejus quod in discursu sequenti demon-

demonstrare conabor necessaria *sequentium*  
sunt. Cum autem quæstio nunquam *demonstra-*  
adeo clare tractari queat, quin rixo- *et enim,*  
sis disputationibus obnoxia sit: pro-  
be video quod sine dubio non o-  
mnes, per omnes meas rationes,  
convicti sint de eo quod probare vo-  
lui. Cæterum cum nemine simul-  
tates suscepturus, nec ansam præbi-  
turus credendi, me discursum me-  
um in principio dubio fundare; de-  
claro, me, ad firmandas demonstra-  
tiones meas, non opus habere, ut  
quis cogitet, motum revera perpe-  
tuum esse, modo mihi concedatur,  
quod nemo hominum negabit,  
quod sc. motus cum semel inceperit,  
ad minimum per tempus aliquod du-  
ret & tanto magis uniformiter con-  
tinuetur, quanto minus impedimen-  
ti adest quod eundem retinet aut  
diminuit. Mihi unum idemque est,  
sive continuationem hanc motus per  
productionem *qualitatis impressæ,*  
aut per simplicem determinationem,  
aut per quicquid velis, explices. Tan-  
tummodo peto ut mihi permittatur  
ponere ut *Postulatum* geometricum,  
quod nempe corpus semel propul-  
sum, per aliquod tempus se movere  
continuet, & quod tempus hocce sa-  
tis

tis notabile sit, dum extrinsecus nihil adfit quod retinere motum aut diminueri possit. Hôc mediante spero demonstrationes sequentes omnem sua vim accepturas.

*Corpus successive plures determinationes recipiens ultimatantum additum manet.*

XI. Corpus non solum in quiete aut motu permanet, sicut semel incepit in eo esse, sed & in eadem motionis specie, & eodem velocitatis gradu manet, in quo positum. Verbi gratia, si incepit se movere in linea recta versus Orientem cum uno gradu velocitatis, pari gradu se movere pergit ita ut nunquam in uno saltem puncto a linea hac recedat. Id quod manifestum est per easdem rationes quas attuli probaturus motum semper durare. Notandum autem quod posteaquam corpus plures diversas determinationes successivè accepit, ultimæ additum maneat, ita ut præcedentes nihil juris in id retineant. Verbi gratia, si globus manu aut aliter pulsus sit ab *a* in *b*, & deinceps idem globus portetur






a b in d cumque inibi linquamus; dico globum continuare motum versus e in eadem linea b d e, cum ea velocitate quam habuit a b in d; & hæc prima determinatio quam accepit ab a in b, & quæ eum in c portasset, jam nulli usui est, non magis ac si nunquam fuisset; quoniam per secundam hanc determinationem destructa est.

XII. Hinc sequitur [corpus non posse determinari aut induci ut moveatur in lineatur curvâ, aut velocitate inæquali: sed omne corpus liberum in linea recta & uniformi velocitate se movere pergit. Exempli gr.

*Corpus liberum non potest determinari ut se moveat in linea curva, aut velocitate inæquali.*



Si corpus moveatur in linea curvâ ab a per b, c d e, usque in f; (uti lapis in funda) & inde corpus hoc in f linquatur ut videamus quo tendat: dico non continuaturum motum in curvilinea versus b, sed isurum rectâ ver-

versus  $g$  linea, quæ curvam in puncto  $f$  tanget. Nam quod corpus primo ab  $a$  in  $b$  motum sit, nihil ultimæ huic determinationi affert, eodem modo etiam jam moveretur, si tantum incepisset moveri a puncto  $b$  aut a  $c$  aut a  $d$  vel  $e$  adhuc propius, modo semper in  $f$  eundem velocitatis gradum habuerit: quoniam omnes hi primi motus totidem didiversæ determinationes sunt, quarum ultimæ primas annihilant; ita corpus ultimæ addictum manet determinationi. Ultima igitur determinatio illud versus  $g$  portabat; hoc est accipere debet inclinationem quam linea curva habet in puncto  $f$ ; quæ inclinatio per tangentem metitur, uti Geometris notum: secundum hanc tangentem ergo corpus ultimo determinatum est, & per consequens secundum hanc lineam se movere pergit.

Omne corpus quod circa centrum movetur ab eodem discedere conatur.

XIII. Hinc videmus hoc axioma verissimum esse, quod omne corpus in gyrum actum, conetur longius de centro motus sui recedere: sicut facit lapis in funda, qui facit ut sentiamus in manu vim quam adhibet ut recta incedere possit linea, & per consequens a manu quæ centrum motus est, recedere: quod faciunt aquæ guttæ

guttæ vel grana arenæ quæ recta lineâ defiliunt, quamprimum de rota cultrarii, aut verticillo, ubi admodum velociter volvebantur, se liberare possunt:

XIV. Falli quoque eos videmus, *Astra a se*  
 qui materiam coelestem liquidam & *ipsis moveri*  
 immobilem statuences, solem & a *nequeunt.*  
 stra primum aliquem impetum potuisse accepisse credunt qui semper duret, & qui eos in circulo circa centrum mundi faciat moveri. Manifestum enim est, quod si Angelus, aut alia quæcunque causa, astrum ita in circulo circa centrum mundi moverit; quamprimum Angelus hic aut hæc alia causa astrum reliquerit, hoc etiam eodem tempore in circulo moveri desineret, & rectâ linea versus extremitates mundi affugeret.

XV. Sed si corpus alligatum sit *Quomodo*  
 uti globus filo appensus vel rota im- *corpus mo-*  
 posita axi, - aut si liquidum & vasi *veri possit*  
 inclusum uti aqua in pelvi; tunc si *circulariter*  
 globus hic aut rota semel satis fortiter motus, vel liquor hic motus etiam fuerit; omnia hæc corpora pergent moveri in circulo, globus circa clavum cui appendet, rota circa axin cui affixa, & liquor circa centrum vasis cui inclusus. Item si duo cor-  
 pora

pora invicem juncta æqualiter ad diversa loca agitentur; necesse est corpora hæc opposita in circulo moveri circa punctum quod in medio eorum est: & ita fusus aut verticillum pergit moveri in circulo, quoniam partes oppositæ inter se cum sint unitæ & junctæ, & digitis agitæ duobus diversis modis, una in hac, altera in illa parte, fusum circa se ipsum volvi oportet. Si autem partes hæc oppositæ inæqualiter pulsantur, ita ut una velocius aliquantum ad latus aliquod feratur; tunc corpus hoc, præter circularem motum circa se ipsum, alium motum habebit, qui illud totum in aliquas diversas lineas mittet, secundum diversitatem & combinationem harum determinationum. Et ita verticillum axe suo in tabula diversas figuras concatenatas describit, quamdiu se cum incredibili velocitate circa proprium centrum movet.


*Corpus se  
movens con-  
tra aliud  
corpus, ipsi  
totum su-  
um motum  
dat.*

XVI. Cogitemus jam corpus se movens in lineâ rectâ, offendere aliud; & videamus, quid accidere debeat his duobus corporibus. Primum, cum corpora sint impenetrabilia, impossibile est corpus A se movere & corpus B quod ante se offendit, non  
etiam



etiam moveri; alias enim corpora  
 hæc se penetrarent. Et cum sup-  
 ponam corpus B esse plane indif-  
 ferens vel ad manendum in quie-  
 te vel recipiendum motum quem  
 ei dare poterimus, simul ac cor-  
 pus A se contra illud move-  
 bit, illud etiam ad æqualem mo-  
 tum determinabit; cum ergo nul-  
 lum impedimentum adfit, cor-  
 pus B tantundem motus, quan-  
 tum corpus A habebat, capiet, &  
 ad eundem locum eadem linea ea-  
 dem velocitate tendet, propter ean-  
 dem rationem: hoc est, quoniam  
 corpora impenetrabilia sunt, & cor-  
 pus *a* versus *b* se movere nititur;  
 & præterea corpus B ibi obvium  
 cum omnimoda & ab omni impe-  
 dimento libera indifferentia; liquet  
 corpus B se debere movere versus  
*b* qua eadem velocitate, corpus *a*  
 se movebat versus eundem locum.  
 Ita videtur non plus laboris esse ut  
 comprehendas, corpus naturaliter  
 movere posse aliud corpus; quam  
 ut concipias duo corpora esse impe-  
 netrabilia, & corpus se movens aliud  
 offendere posse,

*In concursu* XVII. Jam considerandum in  
*duorum* concursu duorum corporum, cer-  
*corporum* tam fieri percussione, quæ nihil  
*percussio fit* aliud est, quam concussio duorum  
*quæ mutua* corporum ad se invicem accedentium  
*est, & a-* & ita impenetrabilitate sua invicem  
*qualiter in* se impredientium. Enimvero cum  
*utroque* sæpissime non nisi unum corpus sit,  
*corpore re-* quod se movet, & quod percutit,  
*cipitur.* quamdiu alterum immobile manet,  
 & percussione excipit; percussio  
 semper mutua est, & æqualiter reci-  
 pitur in utroque corpore, ita ut quan-



tum corpus *a* percutit corpus B, tan-  
 tum & ipsum percutiatur. Quod  
 facile concipiemus, si supponimus  
 duo hæc corpora esse plane similia  
 quoad massam, figuram, duritiem;  
 & si ulterius nobis imaginemur, ea  
 sensum habere, & dolorem sentire  
 posse, cum percutiuntur: tunc enim  
 manifestum est corpus *a* percutiens  
 B, tantum doloris sentire ac B: uti  
 videmus manum, aliam manum per-  
 cutiendo, sibi ipsi tantundem malum  
 afferre, quam alteri, si æque mollis  
 sit. Idem concipitur supponendo  
 duos clavos plane æquales ad dimi-  
 dium

dium solummodo defixos alterum in corpore *a* corpore *B* alterum, inque motu corporis *a* contra *B* duo capita clavorum se offendere: concipimus enim quod in hac percussione duo hī clavi infigantur magis & nulla detur ratio, quæ nobis persuadeat, clavum in *B* magis infigi ac eum, qui est in *a*; e contrario quoniam ambo clavi æquales sunt, & in æquales cuspides desinunt, corporaque æquali duritie prædita, absque ulla alia differentia; necessum est, duos hos clavos æqualiter percuti & unum tantundem infigi ac alterum. Itaque pro axiomate generali ponere possumus, quod *dum duo corpora se percutiunt*, percussio mutua & æqualis sit ab utraque parte.

XVIII. Jam redeamus ad exemplum nostrum. Corpus *A* se movet *bile* offendit cum uno gradu velocitatis versus *a*, dens aliud ibique offendit recta corpus *B*, per corpus qui concussione ipsi communicat suum ipsi omnem motum, qui corpus *B* cum uno gradu velocitatis ad *b* pellet, se- cundum ea quæ monstravi §. 16. *commun-* Quoniam ergo percussio quam corpus *B*. accipit est unius gradus, h. e. *pso* immo capax ad promovendum corpus *B*, *bile* manet, cum uno gradu velocitatis versus *b*, sequitur repercussionem quam ac-

B

cipit

capit eodem tempore corpus  $a$ , esse quoque unius gradus, h. e. ut possit



corpus  $a$  cum uno gradu velocitatis pellere ad partes oppositas, h. e. versus  $A$  (percussiones enim hæ pellunt & pulsant duo corpora ista ad loca opposita, unum ad  $b$ , alterum ad  $A$ ) Et cum jam corpus  $a$  unum gradum impetus seu velocitatis habeat, ut iret versus  $b$ ; nunc vero similem accipiat ut recedat versus  $A$ : necessum est corpus hoc manere immobile in puncto  $a$ , absque progressu aut regressu; quoniam æqualiter ad loca opposita pellitur. Sic in percussione hac corpus  $a$  motum suum & velocitatem corpori  $B$  communicat, & interim ipsum immobile manet.

*Quid sit  
velocitas  
absoluta &  
respectiva  
talis?*

XIX. Supponamus jam duo corpora ista moveri, unum versus alterum in eadem linea; unum de  $b$  cum uno gradu velocitatis versus  $B$ , alterum ab  $A$  cum simili velocitatis gradu versus  $a$ , ubi concurrunt, & videamus quid accidet. Percussio non solum hic erit unius gradus, sed duorum; hoc vero ut intelligamus di-

stin-



stinguenda velocitas absoluta corporis alicujus a respectivè tali. *Absolutam* voco, quæ consideratur in corpore comparato cum spatio in quo movetur; *respectivè talem* eam, quæ in duobus corporibus inter se comparatis consideratur, per quam velocitatem corpora hæc duo ad se invicem accedunt aut a se invicem discedunt. Uti in exemplo nostro




Si consideramus corpus *b* in comparatione ad spatium, v. g. unius pedis, quod uno minuto percurrit, hoc appellabimus gradum velocitatis absolutæ. Si vero cum corpore *A* comparamus, quod de loco suo versus *a* movetur pari gradu velocitatis absolutæ, sc. percurrento etiam pedem uno momento tunc velocitas utriusque respectivè talis erit duorum graduum, quoniam se mutuo accedunt cum hac velocitate, & uno minuto duos pedes permeant, quibus invicem antea distabant.

XX. Enimvero vis percussionis *Percussio-*  
non per velocitatem absolutam sed *nes sunt ut*  
respectivè talem metienda; quoni- *velocitates*

*respective  
tales.*

am percussio, quemadmodum diximus non nisi ab impenetrabilitate corporum duorum provenit, quæ ad se invicem accedendo primum suum motum impediunt, & novas impressiones recipiunt. Unde & videmus percussione tantum majorem esse, quanto accessio hæc mutua velocior erit. Ita ut *percussiones sint semper ut velocitates respectivè tales*, modo reliqua sint paria. Itaque cum corpora duo se invicem accedant cum uno gradu velocitatis absolutæ, & quodlibet pedem migret uno momento de loco suo; manifestum est percussione quam quodlibet corpus accipiet in *a b*)



eandem futuram quæ foret, si unum immobile manserit in A, donec alterum venisset de B in A, cum duobus gradibus velocitatis absolutæ, percurrentes uno momento duos pedes qui sunt de B usque ad A: quoniam velocitates respectivè tales semper eadem sunt, sive supponamus, quamdiu unum manet immobile in A, tamdiu alterum se movere cum duobus gradibus velocitatis absolutæ, & uno

uno momento omnes duos pedes  
percurrere: five supponamus, u-  
trumque corpus moveri ac sibi mu-  
tuo occurrere, quodlibet cum uno  
saltem gradu velocitatis, ita ut uno  
momento absolverint duos pedes i-  
stos, qui inter ipsos erant ab initio  
momenti.


XXI. Cum igitur certum sit per- *Duo corpo-*  
cussionem in hoc concursu esse duo *ra sibi mu-*  
rum graduum; & utrumque horum *tuo occur-*  
corporum in hac collisione impres- *rentia re-*  
sionem accipere quæ cum duobus *currunt*  
gradibus velocitatis ipsa ad loca op- *mutantes*  
posita deferret. *velocitatem*  
*suam.*



Corpus inquam, *a* accipere impul-  
sum, qui illud ad A cum duobus ve-  
locitatis gradibus abriperet, & cor-  
pus B consimilem accipere, qui id  
cum similibus duobus gradibus ve-  
locitatis in *b*, pelleret, necesse est  
corpus *a* recurrere cum uno saltem  
gradu velocitatis versus A, quoniam  
propulsatur a duabus inæqualibus  
& plane contrariis impressionibus;  
una quæ duorum graduum est versus  
A, quam accipit in percussione & a-  
lia unius gradus versus *b*, quam an-  
tea habebat; sic illi solummodo su-

perest unus gradus liber ab impressi-  
 one & velocitate, quæ illud ad *A*  
 propellit. Et eodem modo *B* fere-  
 tur versus *b* cum uno gradu veloci-  
 tatis, ita ut ambo eadem linea ea-  
 demque velocitate recurrant qua  
 venerunt. Si nunc supponamus, u-  
 num velocius progredi altero, v. g.  
*A*, moveri cum uno gradu & dimi-  
 dio, & percurrere unum pedem &  
 dimidium uno momento: & *b*, mo-  
 veri cum dimidio gradu velocitatis,  
 ac dimidium pedis percurrere so-  
 lum: nunc percussio eodem modo  
 duorum graduum existens ac in ca-  
 su precedenti, quoniam velocitas  
 respectivè talis eadem est, licet ab-  
 solutæ differant; necesse est quod li-  
 bet corpus duos gradus impressio-  
 nis accipere & velocitatis ad recur-  
 rendum & per consequens corpus *B*  
 quod dimidium gradum solum ha-  
 bebat velocitatis versus *A*, recurret  
 cum uno gradu & dimidio velocita-  
 tis; cum uno *a* antea gradum cum  
 dimidio habens versus *b*, recurrat  
 tantum cum dimidio gradu. Et ita  
 generaliter probari potest, *duo cor-  
 pora sibi mutuo occurrentia in li-  
 nea recta recurrere ambo post con-  
 cursum, mutando velocitates suas.*

XXII. Si vero duo corpora moveantur versus eadem loca in recta linea, ita ut id, quod tardius movetur, antecedit & tandem velocius quod sequitur, illud consequatur; tunc ambo pergent moveri in eadem linea ad eadem loca; sed velocitates suas mutabunt. Moveatur corpus A, cum duobus velocitatis gradibus, uno momento duos pedes currens usque ad (a). Eodem




tempore corpus B moveatur in eadem linea cum uno velocitatis gradu, unum solummodo pedem percurrens usque ad (b) & ibi corpus (a) illud consequatur; quoniam vim percussionis metimur, uti ostendi, per velocitatem respectivè talem; percussio hæc non debet esse nisi unius gradus, quoniam ambo hæc corpora ad se invicem non accedunt nisi cum uno gradu velocitatis, & uno momento unum respectu alterius non nisi pedis spatium inigrat, quod ab initio inter illa erat. Cum igitur corpus (b) antea unum gradum velocitatis habeat, qui illud versus a fert, & jam in percussione alium ad eadem loca recipiat; necesse est

est ut cum duobus gradibus moveatur, & duos pedes usque ad *b* percurrat; dum corpus (*a*,) antea duos gradus velocitatis habens. versus (*b*,) & jam unum ad recedendum versus *B* accipiens, versus *a* cum uno gradu velocitatis currere cogitur.

*Corpus duram pul-  
sans aliud  
corpus im-  
mobile, re-  
currit cum  
omni sua  
velocitate.*

XXIII. Si corpus percussum plane moveri nequit; videamus qualem vim percussio habeat & quo corpus feriens deveniat.



Ponamus corpus *A* se movere uno gradu velocitatis versus *a*, ibique offendere corpus *B* indifferens ad motum, ita tamen ut adsit lamina *a*-liqua aut superficies ipsa quoque indifferens ad quietem vel motum, sed quæ penetrari nequeat; hoc casu corpus *a*, laminam hanc feriens, hac mediante & corpus *B* ferit, quod proxime post illam reperitur. Et cum alias supponam laminam istam non nisi impenetrabilitate sua resistere; manifestum est, (per id, quod evicimus §. 18.) in hoc concursu corpus *a* immobile manere in *a*, & tam laminam quam corpus *B* moveri versus *b* cum uno gradu velocitatis. Si vero supponamus, eodem

tem.

tempore quo A ferit laminam in *a*, eodem quoque B. eam pulsare in B, immobilis lamina manebit, quoniam æqualiter per latera opposita concutitur; & quodlibet corpus recurret cum suo gradu velocitatis, cum quo venerat. Nam, uti dixi, ambo corpora se feriunt, lamina haud obstante, ac si nihil inter illa esset. Quamobrem, si nihil intermedium esset, cum eodem velocitatis gradu recurrerent, uti probatum §. 21. Itaque licet lamina hæc ibi existat, non tamen desinent recurrere. Cogitemus jam hanc laminam esse impenetrabilem & insuper planè affixam, ita ut nec moveri nec flecti queat; & ponamus accurrere ut antea hæc corpora A & B, quæ eam concutiant, eodem tempore in *a* & B: dico hac collisione facta, utrumque corpus cum eodem velocitatis gradu reverti debere; quoniam si lamina indifferens fuisset & non affixa, recurrissent, & lamina immobilis facta fuisset. Ast idem effectus sequetur, licet supponamus, laminam hanc esse per se immobilem, affixam & firmam; quoniam utroque modo absque ulla actione aut motu manet. Si denique supponamus solum corpus A se movere versus *a*, & laminam affi-


B §      xam



xam & firmam pulsare, dicendum quoque corpus *a* recurrere versus *A*: quoniam recurreret si eodem tempore corpus *b* impetum fecisset in *B*: recurrit igitur etiam licet corpus *b* non venerit, quoniam lamina immobilis existens semper eundem effectum habet respectu corporis *a*, sive *B* eam concutiat sive non. Et sic demonstratur, corpus durum impingens in aliud corpus durum inflexile & immobile, reflecti cum omni suo motu: quod neminem adhuc demonstrasse puto.


*Angulus reflexionis similis est angulo incidentie.*

XXIV. Hactenus semper supposuimus, percussiones recta linea factas; videamus modo quid accidat si corpora se pulsent oblique aut a latere; hoc ut comprehendi clarius possit, semper globis aut planis corporibus utar; & sic facile intellectum erit, quid eveniat corporibus figuras irregulares habentibus. Moveatur globus *A* versus (*a*) oblique feriens



corpus immobile *B*. Per punctum  
atta-

attactus ducatur linea recta  $e d$ , postea parallela  $A e a$ , deinceps  $c a$ , aut  $B d$  æqualis  $c A$ , vel  $B e$ : dico globum recurrere per lineam ( $a a$ ) ita ut angulus hic reflexionis  $a a d$  semper similis sit angulo




incidentiæ  $A a e$ . Ad hoc probandum cogitemus globum  $A$  accipere una vice duos pulsus aut duas impressiones; unam quæ eum pellit versus  $e$  cum gradu velocitatis uno, & alteram quæ pellit versus  $c$  cum duobus gradibus: necesse tunc est se movere in diagonali  $A (a)$  & ibi ferire corpus  $B$ . Vis autem percussionis solum unius erit gradus: quoniam, ut sæpe dixi, percussio non nisi per impenetrabilitatem duorum corporum fit motus suos impredientium. Sed motus, qui globum pellit versus ( $c a$ ) non impeditur a corpore  $B$ . Non datur nisi motus corpus  $A$  ad  $c$   $B$  trahens, qui impeditur a corpore  $B$  & per

per consequens omnem viam huius percussiois metimur per velocitatem respectivè talem quæ corpus A accedere facit versus lineam  $eB$ : Percussio etiam in hoc casu eadem est ac si corpus A solum de  $e$  in  $(a)$  moveatur cum hoc solo gradu velocitatis: sic in percussione reverti cum eodem velocitatis gradu debet, & progredi versus  $e a$ , uti antea tendebat versus  $eB$ , quamdiu alter motus totus manet versus  $a d$ . Unde sequitur globum recedere per lineam.  $(aa.)$

*Obliquum  
motum e  
duobus mo-  
tibus com-  
poni nobis  
imaginari  
possumus.*

XXV. Hoc quoniam momenti allicujus est, alio adhuc modo ut explicetur intererit. Imaginemur corpus B immobile, & aliud corpus A  $a$  pariter inter linea  $Ae$ ,  $a d$  se movere, & impingere in corpus illud immobile: tunc secundum ea, quæ probavi §. 23. corpus hoc totum reflectetur versus A  $a$  cum eadem velocitate. Imaginemur adhuc nobis corpus



canali globum volvi ab A versus  $a$ , ita ut eodem tempore, quo totum corpus movetur ab A usque ad corpus immobile B. globus in canali suo percurat A c. Quamdiu ergo totum corpus recurret post percussionem, globus perget moveri in canali suo a c versus  $a$  cum eadem sua velocitate. Vera jam via quam globus hic percurrit, erit A a  $a$ , ut angulus reflexionis sit æqualis angulo incidentiæ, quoniam tam lineæ A c, c a quam A e, d a, sunt æquales. Manifestum hinc eandem fore percussionem, & consequenter eandem reflexionem, si globus impegerit immediatè, veniens de A in (a), ac si canalis A a impegisset, dum globus in canali sine ulla interruptione cucurrisset. Unde concludere possumus, quod in omni motu obliquo, cum corpus aliquod ferit aliud oblique, duos quasi motus distinguere possimus, unum quem *Perpendiculararem* appellabimus, qui illud inducit ut feriat corpus, & recipit mutationem in percussione; alterum *Lateralem*, per quem corpus aliquod prolabitur in alterum ita ut id non feriat, & qui consequenter totus manet post percussionem. Hic motus


perpendicularis ille est, qui globum fert versus  $e d$ , cujus velocitas per perpendiculararem  $A e$  mensuranda: & lateralem motum pariter metimur per parallelam  $A c$ , qui post percussionem versus  $e a$  pergit.

*Animad-  
versiones in  
Argumen-  
tum P. Ric-  
cioli.*

XXVI. Non possum non duas animadversiones addere occasione obliquæ percussionis. Una spectat ad argumentum quod unus Magnorum nostri seculi Virorum protulit, ad decidendam quæstionem de motu Terræ. Contendit, si corpora gravia descenderent in linea curva, qualem describit Galilæus, percussiones eorum non fore sicut eas videmus esse. Quanto altius enim corpus cecidit, tanto fortius ferit: ita ut percussio decies aut vicies fortior sit in lapsu centies vel 400ties sublimiori: Interim in hypothese quam Autor, de quo loquor, oppugnat, vis percussionis, ut ipsi viderur, semper eadem esse deberet; ad minimum nulla foret sensibilis differentia, qualis etiam differentia inveniatur in altitudinibus lapsum: quoniam corpus grave incederet in linea hac curva velocitate ubique ferme uniformi & sicut vis percussionum semper velocitati proportionata est; concludit, velo-

cia-

citatibus in omnis generis altitudine æqualibus semper existentibus percussiones æquales quoque fore. Argumentum verò hoc nihil concludit, quoniam velocitate semper eadem manente percussiones diminui possunt, si sunt obliquæ; & si cogitamus globos *a, b, c*, ferire murum in *d*, eadem plane velocitate, sed alterum alterò obliquius; certe percussio ejus qui directè magis ferit, admodum major erit; & vim harum



percussionum obliquarum, uti ostendi, per perpendiculara *ce, bf, ag*, metimur. Sic ut globus adeo obliquè ferire possit, ut tantum leviter attingat murum absque ullo quasi effectui. Licet igitur pondera, quæ in curvi linea decidere supponuntur, moveantur uniformi quasi velocitate, non desinent

*In astrono-  
mia refor-  
mata.*

*Animad-  
versio in  
Castella  
quadam.*

finient tamen fortius ferire, quando altius decidunt, quoniam tunc percussio directa magis erit: & revera, si calculum inire velimus, (quod facile factu per illum quem Autor fecit:) reperiemus obliquitatem hanc motuum semper esse talem quali opus est ad diversitatem illam, quam videmus in percussione corporis cadentis.

XXVII. Altera animadversio concernit id, quod vidi in quibusdam nostrorum castellorum, ubi ædificantes, oblectationem oculorum fortitudini murorum prætulerunt, & cum eos planus & æquos extruere deberent, eosdem multis ornamentis lapidum, præ cæteris prominentium distinxere: imo singulos lapides adamantium instar inciderunt, ad minimum limbum fecerunt eosdem angulatim ponendo ubique, ita ut lapides juncti, inter duos secessum quendam relinquunt ad modum architecturæ rusticæ. Dico si omnis hæc varietas accepta est visui, eandem quoque damnosam admodum esse defensionem. Recessus enim hi & prominentiæ lapidum aggeribus tormentorū obliquis idem præbent commodum, & eandem vim, quam habent aggeres directi. Sic globus, qui per obliquum inci-


dens



deus in murum, cum leviter modo attigisset, si planus omnino fuisset, jam prominentes rangens lapides, eundem effectum habebit, & æque magnum vulnus dabit, ac si prorsus perpendiculariter feriret. Imo plus efficiet, cum lapis per obliquum facilius eruatur, qui se globo exponens non sustinetur a reliquis, uti tunc, si rectâ lineâ peteretur versus crassitiem muri. Sed recedamus in viam.

XXVIII. Hæc distinctione duo- *Generalis*  
rum motuum in motu obliquo fa- *regula o-*  
ctâ, facile est generalem regulam *mniū per-*  
constituere omnes percussio- *cussionum.*  
num effectus explicantem. Ecce propo-  
sitionem cum figurâ omnes casus pos-  
sibiles percussio- obliquarum  
num experimentibus, imo & rectarum,  
dum corpora sunt firma. Moveatur  
corpus A versus (a) cum velocitate  
(Aa) & corpus B cum velocitate  
(Bb) in linea (Bb.) aut sit alterutrum  
immobile, ita ut (Bb) non nisi  
punctum sit. Concursus fiat in  
(ab) Jungamus centra per lineam  
(a b) ab utraque parte continua-  
tam, si opus est. Ducantur perpen-  
diculares, A c, B d. distinguere hic  
duos motus in quovis globo possu-  
mus? unum perpendicularem, ac si  
corpus

corpus A devolutum fit de *c* usque  
ad (*a*) & corpus B de *d* usque ad (*b*.)  
Alter motus



lateralis est, qui corpus A versus e protrudit, & corpus B versus d; lateralis hicce integer manet post percussione in utroque corpore cum contra percussione per motus perpendiculares facta. motus hi perpendiculares mutantur secundum jam demonstrata; h. e. corpus (b) accipiet motum & velocitatem perpendicularem (c a) & corpus (a) accipiet velocitatem & motum (d b.) Ducatur jam linea (a e) aequalis & parallela lineæ A c, & linea e a aequalis & parallela (d b) dico corpus a motum iri post percussione in linea recta (a a) cum velocitate (a a.) Et eodem modo ducatur (b f) aequalis & paralela B d, & linea f b aequalis & paralela linea (c a) dico corpus (b) motum iri in linea (b b); cum velocitate (b b); id quod nova probatione non indiget.

XXIX. Notandum, non verum *Quantitas* esse, semper tantundem motus abso- *motus re-* luti adesse post percussione, quan- *spectibi* tum aut eandem adfuerit. Sed fa- *semper* *a-* cile admodum est demonstratu, mo- *qualis* tum respectivum semper esse eundem; ita ut corpora ab invicem discedant peracta percussione, & æque velociter quidem, ut antea accedebat.

cedebant; ita si duo tempora æqualia ante & post percussione accipiamus. A B distantia semper æqualis est distantiae a b. Imo postquam motus explicavero, qui in spacio pleno contingunt, facile mihi probatu fore credo, in generali respectu ad omnia totius mundi corpora, hodie tantundem motus respectivi esse, non plus nec minus, quantum fuit sub initium creationis Mundi.

*Medium  
inter duo  
corpora,  
semper uniformiter in  
recta linea  
movetur.*

XXX. Notandum adhuc, punctum in medio duorum corporum consistens, semper uniformiter in linea recta moveri, & semper ad eundem tendere locum absque ulla interruptione. Itaque si duo tempora æqualia ante & post percussione accipiamus, & supponamus, (o) esse punctum medium inter duo corpora tempore percussione, & O etiam medium esse duorum corporum ante percussione, sicut o post eam; o o erit in linea recta, & (Oo) æquale (o o: in quo demonstrando non occupabor, licet geometricè fieri possit.

*Omnes hæ  
regule &c.  
sunt, si  
corpora æqualitatis aut inæqualitatis corporum,  
sint æqualia*

XXXI. Mirum absque dubio videbitur, me in omnibus regulis præcedentibus non fecisse mentionem corporum, quorum unum in alterum im-

pin-

pingit. Et primo intuitu videtur me *scilicet non.*  
necessario supponere corpora perfe-  
ctè æqualia ut ea quæ dico vera sint :  
si enim unum unum majus altero, o-  
mnes hæ regulæ diversæ erunt ; & ex-  
perientia docet, corpus magnum, si  
in aliud minus impingat antea im-  
mobile, non amittere motum post  
collisionem, licet lentius pergat : e  
contrario minus illud si impingat in  
aliud, cum parte velocitatis suæ refle-  
cti. Sed quando hic omisi distinguere  
casus æqualitatis aut inæqualitatis  
corporum, hoc destinatō consilio fe-  
ci : semper velocitatem & motum  
confudi. & indicare volui omnes hæ-  
scæ regulas veras esse, siue corpora  
sint æqualia siue non. Et si observare  
volumus vim rationis, quam §. 16.  
attuli, eadem semper est licet corpora  
sint diversarum magnitudinum. Cor-  
pus enim percussum, cum plane in-  
differens existat siue ad manendum  
in quiete in siue ad motum capien-  
dum, & omnis effectus ab impene-  
trabilitate corporum derivetur : si  
supponamus jam corpus percussum  
esse majus, modo omnes ejus partes  
sint benè unitæ. necesse est moveri il-  
lud eadem velocitate ac corpus se-  
riens, per eandem rationem, quæ ob-  
tinent, cum sunt æqualia ; quoniam  
scili-

scilicet impenetrabilia sunt, & corpus feriens non ulterius moveri potest, quin corpus, quod feritur & ante illud est, omnem ejus velocitatem capiat. Et cum alioquin majus æque indifferens ad quietem & ad motum sit ac corpus æquale; certe idem majus non magis resistet ac æquale, quoniam neutrum nullo plane resistet modo ne minimo quidem. Si verò experientia contrarium nos docet, hoc inde venit, quod motus corporum quos videmus, non in vacuo, uti hactenus supposuimus fiant, sed in spatio corpore aliquo fluido pleno, qualis est aer aut alia adhuc subtilior substantia. Considerandus ergo venis motus corporum solidorum in substantia fluida.

*Corpus in*

*pleno æque  
libere se  
moveret ut in  
vacuo.*

XXXII. Si substantia hæc perfectè fluida est, h. e. si omnes ejus partes, tam parvæ quam magnæ flexiles & liquidæ sunt; si præterea hæc substantia perfectè plena est, ita ut nec condensari nec rarefieri possit, sicut sponsia quæ comprimitur aut dilatur propter poros suos suos; si tandem alicui loco inclusa, unde nullatenus exire possit; tunc corpus durum, quod in medio liquoris hujus moveri incepit, æque libere motum

conti-

continuabit, ac in vacuo, & ad extrema usque liquoris tendet, ubi obstaculum immobile reperiens, eadem cum velocitate reflectetur, & ita in æternum movebitur. Ratio hujus rei est, quod dum corpus durum movetur in liquida substantia, reflexio impetus fiat, quæ eodem momento omnibus liquoris partibus communicatur, ita ut corpus movens impellat partes liquoris ante existentes; & ita gradum sistere deberet, si alia res non superveniret, (per §. 18.) sed partes hæ liquoris impulsæ semel, alias quoque impellunt & ita ad extremas usque impulsus defertur: hinc reflexio oritur, per quam partes quæ post corpus durum existunt, eadem vi impelluntur ad insequendum idem corpus. Quoniam liquore inclusus, & condensare se nequit nec vacuum offendit, nullatenus partes anteriores moveri possunt, quin & posteriores s. corpus insequentes eadem quoque vi moveantur. Ita quantum corpus durum impeditur a partibus præcedentibus tantum & propellitur a posterioribus: & per consequens si motus semel incepit, pergere tenetur sicut in vacuo. Hinc videmus eos non congruè argumentari, qui necessitatem

tem vacui per motum demonstrare  
& probare sustinent.

*Motus pe-  
detentim  
diminuun-  
tur in aere.*

XXXIII. Si vero corpora dura in  
liquore spongioso sunt qui possit  
comprimi, aut qui non ita terminis  
inclusus, quin extrema sua cedant  
aliquantum; tunc motus non erit  
perpetuus, sed paulatim desinet &  
tandem plâne evanescet. Corpus  
enim durum plus resistentiæ sentiet  
in partibus anterioribus liquoris,  
quam impulsus à posterioribus reci-  
piet: quoniam sicut liquor anterior  
comprimitur, aut extrema cedunt,  
communicatio impressionis perfectè  
fieri nequit, & sic posteriores liquoris  
partes non tantum pellentur quam  
anteriores, & consequenter non adeo  
corpus durum pellent uti anteriores  
retinent. Hinc est quod omnes mo-  
tus nostri in aere & aqua aut alio li-  
quido cessent, quoniam certum est  
aërem esse spongiosum, & facile  
comprimi, reliquos liquores vero  
non nisi aere terminari quando in  
aperto positi, aut ad minimum limbô  
alicujus vasis, quod cedere & flecti  
potest, quàm parvum etiâsi fuerit.  
Experientia enim nos docet, vasa vi-  
treâ, imo & ferrera vel ærea, flecti  
quando punguntur.

XXXIV.



XXXIV. Percussiones corporum *Percussiones*  
 quæ in liquoribus moventur, disse- *corporum*  
 runt in quibusdam ab iis, quæ in va- *aqualium*  
 cuo fiunt. Hujus rationem ut intelli- *in pleno ita*  
 gamus, notandum, quod dum cor- *ut in vacuo*  
 pus durum in liquore movetur, ei- *fiunt.*  
 dem liquori motum suum communi-  
 et, ita ut ille quoque moveatur, cor-  
 pus durum insequendo, hoc modo,  
 ut ipse dividatur & aperiatur ante, &  
 sequatur claudaturque post corpus,  
 ut si corpus per accidens quoddam  
 motum suum perdat, liquor nihilo-  
 minus ita ad motum determinatus  
 corpori motum suum redderet & se-  
 cum traheret; eò fermè modò, ut rivè  
 & flumina aquis suis innatantia li-  
 ra deportant. Quod si igitur ali-  
 quod corpus feriet aliud sibi æquale,  
 idem ipsi eveniet, quod in vacuo;  
 quoniam si corpora hæc duo æqua-  
 la, æquali liquoris quantitate invol-  
 untur, quantum liquor corporis im-  
 pelli corpus idem impedit, quo mi-  
 nus libere moveatur, tantundem  
 liquoris quantitas circa corpus fe-  
 ns existens, de novo etiam tam im-  
 pellens ferit corpus quam impulsum:  
 motus eorundem post percussio-  
 nem erit ut in vacuo; quoniam re-  
 sistentia liquoris circa corpus impul-  
 sum

Si corpora sunt per impulsus liquoris circa corpus impellens exactè compensatur, qualia, per- XXXV. Si vero corpus impellens cussiones a- majus est, necessarium est non tantum liter inple- percussione effectum recipere quam no quam in alterum quoniam majori violentia vacuo fient. per liquorem circumdatum prefer- tur; videmus enim trabem, per fluminis cursum, deportatum, majorem habere effectum, si in pontem aut molendinum impingit quam baculum per idem flumen deportatum, licet trabs non velocius natet ac baculus: & hoc inde quoniam trabs impingens, adhuc magnâ illâ aquarum quantitate impellitur, quâ circumdatur, cum baculus minus impellatur, ob minorem quem occupat locum & pauciorē aquam quâ circumdatur. Hinc si corpusculum in est & aliud magnum in id impingat, hocce magnum corpus motum suum parvo communicando, non manebit immobile; sicut in vacuo faceret, sed motum continuando alterum inquietur, licet lentius magis. E contrario si magnum quiescit, parvum illud, postquam alterum ferierit, & ipsi partem motus sui communicaverit, reflectetur & partem velocitatis suæ amittere. Ex omnibus hisce si- quet, Aristotelem non adeo repre-

hendum, uti quidam contendunt, dum ad explicandas causas continui motus quem videmus, *medium* adhibuit, h. substantiam liquidam in qua corpora nostra se movent.

XXXVI. Ad determinandum ex-  
 cessum qui in resistentiis aut maximis  
 corporum horum inæqualium im-  
 pressionibus esse potest, non credo  
 quenquam appellere animum suum  
 debere, ad minimum si consideramus  
 corpora talia qualia inter nos habemus,  
 quoniam illud dependet a resistentia,  
 quam corpora liquida causantur,  
 in quibus corpora dura, quæ  
 videmus, moventur; a facilitate se  
 condensandi & rarefieri, quæ gaudent,  
 & multis aliis nobis æque incognitis,  
 ac infinita alia impedimenta, quorum  
 combinatio in infinitum omnes  
 percussionum effectus variare possunt.  
 Hoc solum dicere possum, quod certam  
 hypothesein ponendo, satis naturæ congruam, ostendere  
 possimus per præcedentes regulas percussiones  
 corporum inæqualium eo modo fieri quod Dominus Huygens  
 ult in ultimo suo *Journal des sçavans*,  
 actis eruditorum. Non multum vero  
 hisce insistam forte in sequentibus  
 occasio dabitur plura de illis dicendi.

*Percussiones corporum inæqualium ad certam regulam reduci nequeunt.*

*De refractione.*

XXXVII. Ex dictis patet adhuc ratio refractionum, quæ sunt quando corpus durum ab uno liquore ad alterum diversæ consistentiæ progreditur; si enim corpus durum a liquore liberiori ad minus liberum procedit, in cursu suo aliquid de velocitate sua amittet, dum majorem resistantiam experitur in liquore anteriori, quam impellitur ab insequentibus; hinc refractione fiet recedendo a perpendiculari. E contrario, si corpus a liquore magis impediens ad aliam liberiores decurrit, refractione fiet per accessum ad perpendicularem, corpus velocitatem in cursu auget, quoniam per sequentem liquorem magis pollitur, quam retinetur ab anteriori. De hoc velocitatis augmento neminem adhuc rationem dedisse puto. Non refractionum harum mensuras notabo, quoniam alii hoc fecerunt, & demonstrationes eorum bene iis accommodari possunt quæ supra dixi. Nec magis de refractione luminis hic loquor, quoniam eam multo aliter fieri credo, h. e. per causas & media plane diversa, sicut demonstrare possem, si alium discursum de motu haberem.

XXXVIII.

XXXVIII. Dicendum esset de motu corporum gravium, tam quæ in aëre decidunt vel in eum pelluntur, quam quæ in planis inclinatis currunt aut quæ filo appensa ab utraque parte titubant. Dicendum adhuc de motu liquorum, tam de eorundem casu quam saltu, ut & eorum undulatione, & similibus. Sed hæc totidem requirunt discursus speciales. Et sicuti me invenisse credo aliquid novi in hac materia, non pigebit publico cogitationes meas proponere ut examinetur, si modo viderim primum hunc discursum non indignum judicari, qui legatur ab his, qui hisce delectantur materiis.

## I N D E X.

## PARAGRAPHORUM.

- C**orpus per se indifferens est ad quietem vel motum. pag. 7  
 II. Si Corpus semel fuerit in quiete, semper inibi permanet. 8  
 III. Et si semel in motu est, semper moveri perget. 8  
 V. Quietem non esse puram Negationem. 9

- V. *Tantum actionis positivæ in quiete esse quantum in motu.* 10
- VI. *Objectiones.* 12
- VII. *Causa finita effectum habere potest, qui semper duret.* 13
- VIII. *Qualitas illa quam impetum vocant, semper durat.* 14
- IX. *Corpora quæ movemur, moveri desinunt, quoniam impediuntur.* 16
- X. *Postulatum pro firmitate demonstrationum sequentium.* 16
- XI. *Corpus plures successive determinationes accipiens, ultimâ solum affectum manet.* 18
- XII. *Corpus liberum non potest determinari ut moveatur in curva linea, aut velocitate inæquali.* 19
- XIII. *Omne corpus circa centrum motum, ab eo recedere conatur.* 20
- XIV. *Astra a se ipsis moveri nequeunt.* 21
- XV. *Quomodo corpus circulariter moveri possit.* 21
- XVI. *Corpus quod versus alterum corpus movetur, ipsi omnem suum communicat motum.* 21
- XVII. *In concursu duorum corporum sit percussio mutua, & aqua*

*ter in utroque corpore recipitur.*

24

**XVIII.** Corpus mobile aliud corpus offendens quietum, ei omnem suum communicat motum, & ipsum immobile manet. 26

**XIX.** Quid sit Velocitas absoluta & respectiva talis? 26

**XX.** Percussiones sunt uti Velocitates respectivæ. 27

**XXI.** Duo corpora versus se in eadem mota, recurrunt mutata Velocitate sua. 29

**XXII.** Duo corpora ad eundem locum mota, pergunt post concursum, Velocitatibus suis mutatis. 31

**XXIII.** Corpus durum in aliud immobile corpus impingens, cum omni suo reflectitur. 32

**XXIV.** Angulus reflexionis angulo incidentiæ aequalis est. 34

**XXV.** Motum obliquum duobus motibus constare credendum. 36

**XXVI.** Animadversio in argumentum P. Riccioli. 38

**XXVII.** Animadversio in castella quædam. 40

**XXXVIII.** Generalis regula de omnibus percussionibus. 41

**XXIX.** Datur semper aequalis quantitas motus respectivi. 43

XXX. Medium duorum corporum semper uniformiter movetur, in linea recta.	44
XXXI. Omnes hæc regula vera, si ve corpora sint equalia si ve non.	44
XXXII. Corpus in pleno aquæ libere movetur ac in vacuo.	46
XXXIII. Motus paulatim in aere diminuuntur.	48
XXXIV. Percussiones corporum æ- qualium in pleno ut in vacuo sunt.	49
XXXV. Quando corpora inæqua- lia, percussiones in pleno aliter ac in vacuo sunt.	50
XXXVI. Percussiones corporum in- equalium ad generalem regulam redigi nequeunt.	51
XXXVII. De Refractione.	52
XXXVIII. Conclusio.	53

## AD LECTOREM.

**C**um Autor Tractatus de Motu  
locali ab amico quodam accepe-  
rit, nonnullos pagellas prælo ereptas  
legisse, & publico persuadere illum  
plane doctrinam Cartesii sequi; i-  
mo licet in quibusdam locis eundem  
oppugnare videatur, utut eum non  
nominet, nihilominus nonnisi ipsius  
sensa in hac materia proponere ac  
con-



*confirmare, necessarium sibi credidit, eos per sequentes notas, fini dicti, tractatus superadditas priusquam in lucem prodiret, errore exsolvere qui verbis horum nimiam fidem præberent.*

## NOTÆ:

### in Discursum

#### DE MOTU LOCALI.

**A**utor hujus Discursus probans motum nunquam destrui nisi per determinationem contrariam, de novo supervenientem; sufficienter declaravit quam minus adiectus huic sententiæ sit. Sed cum ii, qui hanc materiam tractarunt in Italia, Anglia, Belgio & Gallia ferme omnes in eo conveniant; non discedendum a tam communi sententia credidit. Galilæus, Gassendus, Hobbesius, Regius, Maignan, Digby, Kircher, Fabri & plures alii omnes quodammodo hanc perpetuitatem motus sustinent; & non nisi in modo probandi differunt. Maxime ficulnea omnium probationum est absque dubio Cartesii. Autor hic contendit, quod si motus aut quies, semel incipientes cessent.

cessent Deus sit causa mutationis ; quod iudicium risum movet iis qui primis Theologiam labiis attingere ; cum nemo sit qui nesciat omnes mutationes creaturarum absque ulla mutatione ex parte Dei accidere. *Apud Deum non est transmutatio*, inquit Augustinus ; *ideoque apud eum cursus temporis , diei noctisque alternatione nequaquam variatur*. Satis visui quoque patet, cessationem motus non magis contrariam immutabilitati divinæ esse, quam creationem Mundi , aut actiones voluntatis nostræ , aut vicissitudinem dierum ac noctium. Si argumentum Cartesii non tam facile resolvi posset , perniciosissimum foret, quoniam probaret etiam, Deum omnem motum jamjam in mundo conspicuum ab æterno fecisse.

Cum plurimi in eligendis opinionibus ad sententiam Veterum & doctorum scholasticorum respiciunt, addere hic possumus quod ultra ea quæ jam dicta sunt à Vasquio , qui in probandâ perpetuitate motus admodum prolixus est , inquit, eum si semel inceperit, nunquam desistere, nisi nova causa formam positivam & huic motui contrariam prodigens superveniat : ultra ea inquam,

trēs magnarū thesū Lugdunen-  
sium diversis temporibus factæ, idem  
volunt. Insuper Aristoteles addi  
potest. En verba ejus Lib. 3. de Me-  
reosis, cap. 2. *Si corpus quoddam  
absque gravitate & levitare exi-  
stens movebatur; necessum est moveri  
per peregrinam quandam vim; &  
semel ita motum, in infinitum mo-  
vebitur.* *ῥίγα δὲ κινούμενον, ἀπει-  
ρον ποιεῖν τὴν κίνησιν.* Et lib. 4.  
Physic. text. 69. loquens de corpore  
moto in vacuo quodam, ubi nul-  
lum genus impimenti adesse præ-  
supponitur, in hæc verba erumpit.  
*Nemo indicare potest quare corpus  
hoc modo in vacuo motum, in ali-  
quâ parte gradum sistat. Quare  
enim potius hic quam illic quiesce-  
ret? hinc aut plane non movebitur,  
aut si moveri incipit, in infinitum  
moveatur necessum est, nisi a for-  
tiori quodam retineatur.* *οὐδεὶς ἂν  
ἔχοι εἰπεῖν, διὰ τὸ κινηθὲν συσ-  
ταίπον; τὸ γὰρ μάλλον ἐνταῦθα  
ἢ ἐνταῦθα; ὥς ἢ κερμήσει, ἢ εἰς  
ἀπειρον ἀνάγκη, φέρεσθαι, εἰ μὴ  
μήτε ἐμποδίστην κρεῖττον.*

Cartesius pessimè utitur princi-  
piò §. 13. explicatò, *Omne corpus,*  
C 6 circa


*quod circa centrum movetur, inde discedere conatur. Ostendere possumus ipsum falli, dum eo ipso gravitatem corporum explicare vult. Nec tam latè hoc principium accipimus sicut Cartesius. Approbamus potius restrictionem Docti illius Viri, docentis, verum illud esse in motibus artificialibus, non vero in naturalibus.*

In §. 16. & sequentibus probata, monstrant Cartesium in sex ex septem regulis de motu falli.

Nullatenus fovemus sententiam de motu terræ, in §. 26. Autor discursus hujus plenissimè persuasus est, quod, licet nulla detur Sacra Scriptura, hypothesis de immobilitate terræ præferenda sit alteri. Tantum monstrare voluit argumentum hoc nihil evincere; meliora enim adsunt, imprimis id, quod de motu tonico magnetis desumptum, in magni momenti occasionibus multum valuit.

§. 29. Cartesio contrarius est, qui motum absolutum, quem ibi vocamus, a respectu tali non distinxit. Et cum dicit semper æqualem esse motum ante & post percussionem, de absoluto motu loquitur; hinc videmus

demus eum hac in re falli. In figura enim sequenti, ante percussionem, motus duorum globorum A & B est A a, B b, & totus motus post percussionem in solo globo (b) collectus saltim est (b b) altero globo immobili manente in a.



Dum in §. 31. mentio fit substantiæ aere subtilioris, non credendum, esse materiam subtilem Cartesii. Quilibet novit corpora dari subtiliora aere, quem respiramus. Et cum Aristoteles in compositione universi sphaeram aeream aquæ superimponeret, etiam ignem aeri superimposuit & *Ætherem* super ignem; quæ omnes diversæ sunt substantiæ tanto subtiliores, quanto magis ele-  
vantur.

Contendimus §. 37. Cartesium refractiones corporum non probasse, & multominus luminis.

## ANNOTATIONES IN EPISTOLAM

## CARTESII

lumen concernentem

Epitome Epistolæ 17. tom.  
2. Cartesii.

*Mi Domine,*

**L**ubens intelligo, te nuperam  
quæstionem inter nos motam,  
reassumisse. Sed quoniam video  
argumentum meum quo tum ute-  
bar, tibi nondum satisfecisse, libere  
tibi dicam, quid de responso tuo  
sen-

sentiam, præmittam tamen brevem descriptionem, ut de statu controversiæ situs certi.

Cum nuper congregati essemus, dixi non revera lucem uno momento moveri, uti tu scribis; sed (quod idem esse credis) a corpore lucente uno momento ad oculos nostros pervenire: Addebam, me credere tam certum esse in hac re, ut si falsi possem convinci, paratus sim confiteri me nihil in tota adhuc scire Philosophia. Tu vero e contrario asserebas lucem in momento non moveri, dicebas quoque te invenisse modum illud experientia demonstrandi, ut facile pateret quis nostrum falleret. Et hæc experientia, purgata, uti jam est, a quam plurimis rebus superfluis, v. g. sono, malleo bicipite, & ejusmodi rebus, h. e. ita, ut jam in literis tuis sine dubio multo melius quam prima vice exponis, talis est.

Si quis noctu facem manu portans, eandem moveat & in speculum oculos convertat, per quadrantem miliaris ab ipso distans, facile animadvertere poterit, num motum in manu sua existentem, prius sentiat, quam mediante speculo videat.

Tam-

Tamque certus de hac experientia eras, ut crederes totam tuam Philosophiam falsam, si non notabile, & sensibile tempus occurrat, inter momentum illud, quo motus hic ope speculi videtur, & illud, quo iste in manu sentitur. Ego regerebam, si minimum intervallum intercederet, paratum me confiteri, totam Philosophiam meam destructam esse. Et tamen (quod notandum) in tota nostra disputatione, non tam de eo agebatur, si lux in momento quodam transmittitur, aut aliquo tempore indigeat, quam de successu experientiae hujus. Sequenti quoque die, ad finiendum certamen nostrum & te inutilis sublevandum laboris, tibi indicabam, aliud adesse experimentum saepius ab aliquot millibus personarum factum, imo ab accuratissimis & attentissimis, per quod manifeste videre possimus, nullum intervallum temporis esse inter momentum quo lumen e corpore lucente exeat, & illud, quo in oculos nostros incurrat.

Antequam tibi illud exponerem, interrogabam an non concederes lunam a Sole illuminari, & eclipses ex interpositione terrae solenniter &

lunam,



lunam, aut per interpositionem lunæ inter solem & terram: quod concedebas facile. Postea rogabam secundum quam lineam supponeres lumen pervenire ab altris ad oculos nostros: & respondebas, *secundum rectam lineam*: ita ut si solem aspiciam, ille non in eo appareat loco ubi revera est, sed ubi eo momento erat, quo lumen ex eo egressum, cujus vi solem videmus. Tandem rogabam, ut determinares quantum ad minimum debeat esse intervallum temporis sensibilē, inter momentum quo fax mota & momentum quo motus ejus ope speculi sentitur, milliariis quadrante distantis. Ad hæc præcedenti die respondebas, ad minimum tantum temporis esse, quantum oportet ad pulsū arteriæ; tunc vero temporis dicebas, me posse accipere tale intervallum temporis quale vellem. Ne vero abuterer venia quam dabas, nonnisi vigesimam quartam partem temporis accipiebam de pulsu arteriæ, dicebamque hoc temporis intervallum, quod pro tua sententia plane insensibile esset in tuo experimento, admodum sensibile esse in meo.

Nam si ponamus lunam a Terra distare quinquaginta semidiametris  
&

& unicum terræ semidiametrum continere sexcenta miliaria (id quod ad minimum supponendum est, aut Astronomia & Geometria fallunt si lumen vigesima quarta parte indiget temporis quod arteriæ adhibent, ut semel pulsent, ad bis quartam milliaris partem percurrentam tum tempore indiget, æquali isti quod arteriæ adhibent ut quinque millies pulsent, i. e. ad minimum hora, ad percurrentum bis spatium quod est terram inter & lunam, uti cuivis apparet qui calculum ducere conabitur. Jam vide quomodo argumentatus sim.

Sit A B C linea

A B C

recta: & ad concludendam eandem rem, vel terram moveri supponamus, vel solem, sint tn. A B C loca ubi sol, Terra & Luna interdum occurrunt sibi invicem; supponamus jam e terra B lunam obscurari in puncto C: eclipsis hæc, secundum supra concessa, præcise nobis apparere debet eodem momento quo lumen e sole ortum, cum in puncto A esset, a luna refractum ad oculos nostros perveniret, si non fuisset impe-

impedita ab interpositione Terræ, i. e. secundum jam concessa, hora post luminis ad terram B. accessam. Et adhuc sicut etiam concessum, sol non potest videri in puncto A, nisi præcise eodem momento sit, quo lumen ejus directe ad terram pervenit: Et tamen luna non poterit esse obscurata in C, nisi una hora post Solem visum in A; si concessa tua vera sunt, hoc est, si vigesima quarta parte pulsus arteriæ, motus facis in speculo quod quarta parte miliaris distat, tardius observatur quam in manu sentitur.

Accurata vero observatio quam de ea Astronomi fecere, confirmata per infinita experimenta, satis docet, quod si luna obscurata terram B in C videamus, sol non videri potest in puncto A per horam, citius, sed eodem momento quo eclipsis appareat. Tempus horæ integræ certe sensibilius in observatione loci solaris respectu terræ & lunæ, quam in experimento tuo vigesima quarta pars unius pulsus arteriarum. Consequenter & experimentum tuum inutile est, meum vero quod omnium est Astro-  
norum, clarissime monstrat, lumen videri absque intervallo tem-  
poris

poris sensibilis, h. e. uti probavi, uno momento. Argumentum hoc demonstrationem esse contendebam; tu vero e contrario dicebas esse paralogismum petitionemque principii. Facile vero e responso tuo patet, nam recte illud hoc nomine indicaveris. Nam &c.

*Nota.*

Non disceptare proposui ea quæ Cartesius de lumine dicit, *illud sc. e corpore lucido uno momento ad oculos nostros pervenire.* Cum ipso consentio in hoc puncto, persuasusque sum effusionem luminis non fieri posse per successivum subtilis cujusdam substantiæ fluxum. Saltim argumentum ejus examinabo, ut quilibet judicare possit, an argumentum ejus allatum, demonstratio sit uti contendit, an tantum paralogismus, sicut ipsius adversarius ei objicit.


Cartesius ab initio ponit lumen horam consumpturum ut a luna ad nos perveneret, si vigesimam quartam partem pulsus arteriarum adhiberet ut venires a speculo, quod quadrante milliaris distat. Supponit eo ipso, tempus motus luminis eadem proportionem tanto majus esse debere, quanto majus spatium est, quod ipsi percurrendum: id quod ipsi optima ratio-

ratione negari potest. Nam licet luna duodecim millies magis distet a nobis, ac speculum istud; inde tamen non sequitur duodecim millies plus temporis lumini deberi ut a luna veniat, quam a speculo: quoniam fieri potest, ut lumen citissime moveatur in magno isto spatio quod est versus cœlum, & tardissime in brevi hoc spatio, quod præpe terram est, quoniam hic inferior aer spissior est, ut motum luminis retardet; cum supra nos, materia, unde Cartesius cœlum componit, ut infinite subtilior, lumini medium concedit, quo moveatur majori velocitate quam concipi potest. Videmus enim globum tormentarium in aerem emissum cum incredibili rapiditate tardissime moveri quando in paludem aut terreum vallum devenit. Et sicut hic inapte satis falleretur, qui, videns globum hunc minutum temporis consumsisse, ut duos aut tres gressus in terra procederet, inde concludere vellet, eundem globum duo aut tria millia minutorum consumere, ut illuc veniat e tormento quod supponimus duobus vel tribus millibus passuum distare: ita dicere possumus Cartesium non bene argumentatum

tum; cum inde quod lunam duodecim millies longius distantem supponit ac speculum, lumen quoque duodecim millies plus temporis consumere vult, h. e. horam integram ut a luna huc veniet; præsupponendo, illud consumere vigesimam quartam partem arteriæ pulsus donec e speculo veniat. Fieri quoque potest, ut cum materia hæc coelestis aerem subtilitate multo magis antecedat ac aer terram, lumen quoque plus temporis consumat percurrendo hoc breve spacium quam consumit donec per magnum illud cœli intervallum ad aerem nostrum perveniat: sicut forte globus plus temporis consumit penetrans duos aut tres passus in vallum, quam veniendo illuc e tormento. Ita ut Cartesius absque ratione horam posuerit pro tempore quod lumen consumat veniendo a luna. Hinc cum tota demonstratio quam deinceps dare vult, huic fundamento superstruatur; necessario tota cadet, fundamentum hoc labefactato.


Sed non in hoc solum diutius Cartesio contrarius sum; certe magis in progressu argumentationis  
sue

suæ falli videtur. Notandum enim eum proposuisse demonstrationem suam, tanquam æque stringentem in hypothese Tychonis, ac Copernici: *ut concludamus*, inquit, *eandem rem, siue terram moveri, statuas siue solem, &c.* Ponamus igitur Solem immobilem esse in centro mundi A; terram reperiri quaque in B



& lunam in C, ita ut ABC, sit linea recta; lumen ab A veniens & per B means, consumere semihoram donec perveniat in C, & aliam semihoram donec ex C regrediatur in B; videbunt tunc ii, qui terram in B. inhabitant, lunam aut potius eclipsim ejus in C. Interim tunc etiam iidem adhuc solem videbunt in A, ubi non solum præcedenti hora fuit,

fuit, sed & ubi semper immobilis permanfit. Quare ergo Cartesius nunc solem in alio loco videri statuit? Concedo solem hora ante apparuisse in A, quam Luna apparuit in C; interim & hoc dico, hora sequenti i. e. cum luna in C, visa fuit, solem adhuc in A visum esse, quoniam locum non mutavit; & tamen solem Terram & Lunam in eclipsi,



apparere in linea recta. Facile determinari jam potest, qui fallatur, cum sit subjectum pure geometricū.

sed tutius adhuc id fiet, si scias, quid Cartesius Adversario suo respondeat. En litteras: *Si enim recurras, uti facis, ad longitudinem aut tarditatem motus annui, in re pla-*

ne




ne a motu luna dependenti, quæ duodecies rapidior est motu annuo, imo in re ubi soliti sumus observare satis commode, non tantum differentiam unius horæ id quod sufficiens esse demonstrarem; sed & dimidii minuti, quis in hoc non agnosceret paralogismum? Fateor me hic paralogismum agnoscere non posse, imo non possum non in hac Cartesii instantia plurimos videre.

• Primo loco dicit, quod totum hoc opus, i. e. defectus lineæ rectæ & oppositionis quæ in eclipsibus apparere posset, omnimode a motu Lunæ dependeat, & tamen certum est motum lunæ nihil magis ad hoc conferre, quam si immobilis esset. Imaginemur nobis, Lunam postquam in umbra fuit, adhuc velocius moveri quam moveri solet, & venire in E, dum lumen (sive potius defectus, idem enim est) e C venerit in terram B: tunc secundum omnes suppositiones super quibus Cartesius argumentatur, Luna apparere debet in C quoniam supponitur, Lunam & astra apparere, non in locis ubi sunt revera, sed in iis, ubi erant eo momento cum lumen, quod facit ut ea videamus, ex iis egrediebatur,

D

Ita


Ita lumen quod jam pervenit



ad nos, procedens e C, ubi luna præcedenti semihora erat, nobis præsentare debet lunam in C, qua-qua etiam mundi parte jam sit, si immobilis manserit, aut transposita fuerit; consequenter motui lunæ hic nihil tribui potest.

Secundo loco Cartesius adversarium suum reprehendit, quod allegaverit tarditatem motus annui; ipse vero contendit motum annum nihil conferre ad rem, *quæ dependet*, inquit, penitus a motu lunæ: Certum interim, quod si quidam defectus oppositionis apparere debet in eclipsi, hunc oriri unice a motu annuo, prout major & sensibilis magis fuerit. Nam si postquam Luna in umbra

umbra terræ in C fuit, terra transla-  
ta fuerit in F, vi motus annui, donec  
radii e C ad terram pervenirent;  
tunc e terra F semper solem in A vi-  
deremus & lunam in C: lineæ vero  
A F F C, non essent amplius eadem  
linea recta, & luna quæ tunc videretur.



in eclipsi, nihilominus soli oppo-  
sita appareret. Sic motus annuus di-  
versitatem & defectum in oppositio-  
ne solis apparente & lunæ obscura-  
tæ efficere posset. Cæterum cum  
motus terræ annuus per horam, ad-  
modum parvus, imo insensibilis;  
clarum est, adversarium Cartesii  
recte recurrisse ad lentitudinem hu-  
jus motus, ut totam ejus demonstra-  
tionem infringat.

Tandem Cartesius ait, quod eo ipso satis commode non solum differentiam horæ, sed & dimidii minuti observare possimus: quod plane falsum est. Nam si agitur solum de motu diurno, verum est discerni posse usque ad minuta, modo adsint bona instrumenta & aptus sis ad tales operationes instituendas. Sed si propius Solis aut terræ motus observandus est, aut oppositio Lunæ præcise determinanda quas non offendes difficultates? & ex observationibus, & ex calculo, & ex reductionibus? exempla sat illustria habemus hujus difficultatis in observationibus quas circa eclipses horizontales instituere voluerunt: notæ sollicitudines astronomorum, ut viderent annon diversitas detegi possit in oppositione Solis & Lunæ orta ex refractione. Quantumcunque vero solliciti fuerint, ut instrumenta sua ampliarent, quam cautos etiam suis in observationibus & calculo se gesserint; vix affirmare poteris, eosdem differentiam quandam distinxisse, non dico minuti horarii; sed tantum minuti gradus. Quomodo ergo Certesius tam commode simili occasione observari vult, differentiam dimidii minuti horarii?

Hactē.

Hactenus solum examinavimus argumenta Cartesii in hypothefi de motu terræ, in qua eandem demonstrationem effe contendebat. Si jam eadem examinare velis secundum hypothefin communem de immobilitate terræ, non credo demonstrationem ipsius meliorem reperiri. Quam diu enim materia celestis omnis, quæ solem & stellas vehit, quotidie circa terram movetur; recte argumentari poteris, lumen, a sole aut luna ut ita loquar sparsum, non linea recta ad terram moveri, sed curva & spirali, semper circulariter sequendo motum fastri unde projectum; & hoc probari poterit præceptis Mechanicæ, & experientia confirmari eorum corporum, quæ e navi ejicimus, & hoc casu sol & astra apparerent semper in eo loco ubi revera sunt, nisi proprii eorum motus quandam afferrent differentiam. Id quod manifeste satis declarari potest exemplo soni, quem successive per certas undulationes, dilatari norunt omnes, quæ in circulo sese extendunt per aërem. Imaginemur enim nobis totum coeleste spatium impletum aëre, sonumque in sole formari;

certe quam diu sol cum toto cœlo  
 se ita moveret circa terram, omnes  
 hæ undulationes circulares aeris  
 eodem quoque tempore transporta-  
 rentur, a motu aliquo cum centro  
 suo, quod est sol, communi; & ita  
 ad terram delatæ, semper solem &  
 centrum suum designarent non eo  
 loco quo formatæ fuere, prima vi-  
 ce; sed eodem, quo sol tunc reperi-  
 retur, semper excepto proprio solis  
 motu, quem ultra motum cum to-  
 to aere communem habere posset.  
 Sed quocunque modo explicetur;  
 aut quæ etiam ratio hujus motus  
 spiralis s. circularis



radiatorum luminis detur ; certum est, quod motu hoc semel supposito, Luna in eclipsi sua directo soli opposita apparere debebat, ac si lumen uno momento expanderetur. Ponamus enim terram esse immobilē in B, & solem existentem in A, radium ad terram mittere ; & dum sol movetur & advenit in (a), radius per spiralem A E vergentem venire in B ; tunc radius hic solem apparere faciet in (a) ubi & revera est. Deinceps radius hic A E B , ulterius progrediens , aut potius defectus ejus, semihoræ spatium per spiralem (B e) ibit ad C, ubi Luna est. Radius denique aut potius ejus defectus reveniens per spiralem C e, per aliam semihoram ad terram B perveniet, quamdiu Luna transportata fuit per materiam coelestem usque in C, & tunc per eundem radium, aut potius ejus defectum, Luna videbitur obscurata in C ; Eodem vero tempore sol etiam apparebit in altero latere e diametro oppositus in a, i. e. in eodem puncto, ubi ante horæ spatium visus est in (a :) Et hoc adeo verum est, ut Cartesius, qui


D 4

ipse

ipse hoc bene advertit, utile duxeris  
adversarium suum ex alio capite ag-  
gredi in hypothefi hac. En verba  
ejus: *Cum postea dicis, radios ex  
Sole manantes & luna, etiam extra  
se moveri circulariter, cum Sole &  
Luna, ita ut astra nobis appareant  
semper in locis iis ubi sunt reuera,  
licet mediante lumine videantur,  
quod ex iis antea promanabat, cum  
in aliis locis erant, (aliter enim quae  
dicis concipi non possunt) manife-  
ste antea concessa negas & unde to-  
ta hac pars demonstrationis mea  
dependet, ante explicata. Non au-  
tem observaste hic cadere in alte-  
ram ejus partem, quae est eclipsis  
solis.*

Non diu hic inquiram quidnam  
concessum vel negatum Cartesio, pro-  
positum mihi tantum est, examinare  
argumentum ejus. Monstravi adver-  
sarium ipsius eum accusare paralo-  
gismi, in prima demonstrationis par-  
te; Videamus jam an accuratior sit  
in secunda? Sit (a), inquit, Sol, c  
Luna & B Terra, omnes tres in ea-  
dem recta linea, secundum calcu-  
lum supra factum, si lumen indiget  
hora, ut veniat a luna C ad terram  
B, duodecim horis indigebit ut a sole  
ad nos veniat, quoniam sol ad mini-  
mum





num vicies quater longius distat a  
 terra quam luna. Jam secundum  
 ultimum tuum concessum, eodem  
 momento, quo Sol est in (a) videtur  
 ab his qui sunt in B, non obstante  
 interpositione luna, quae interim  
 non solum est in c sed quae ibi etiam  
 videretur si lumen proprium habe-  
 ret; Sol enim videtur in loco eo ope  
 luminis, quod duodecim horis ante  
 emanabit ex ea, & quod caelum lu-  
 nare semihora ante percurrentes, non  
 potuit impediri a luna, quoniam  
 nondum tunc interposita erat inter  
 solem & terram: lumen quoque jam  
 ab ea impeditum, non poterit ad ter-  
 ram venire nisi semihora post; hinc  
 D 5                      defe-

*defectus luminis i. e. eclipsis solis, non poterit videri, nisi semihora post momentum, quo Sol, Luna & Terra in eadem linea recta sunt.*

*Experientia vero omnium astronomorum contrarium nobis probat; sc. eclipsin tunc esse, cum Sol, Luna & terra in eadem linea recta sunt; & in hoc non solum error dimidii hora, sed & dimidii minuti non sentietur. Hinc &c.*

*Omnis vis hujus argumenti in eo consistit, quod non obstante interpositione Lunæ cum visa fuerit in (c) sol non desineret videri in a mediante radio, qui ab eo duodecim horis ante emanans, non potuisset impediri quin cælum percurrat lunare semihora ante, cum luna tunc nondum directe interposita inter terram & solem. Ast num Cartesius tam cito oblitus est, quod supponamus radios non ire recta linea? Luna per semihoram ante nondum inter solem & terram posita erat; hoc verissimum est, illa tunc in c est, & sol in a: non autem ideo verum est, lunam eo*  
tem-

tempore non posse retinere radios quos per lineam curvam A E c venire supponimus, uti sola figura



ad oculum monstrat. Nihilominus non tam hoc Cartesio objicio, quin miror potius, cum non observasse, aut minimum dissimulasse, quod, quando in hac hypothese dicimus, astra semper ibi apparere ubi sunt, motus eorum propius sit seponendus, quemadmodum supra annotavi; & hoc in casu, lumen uniformiter motum in linea spirali regulari, necessario apparere

D 6      faci;

faciet res in eclipsibus, ita uti re-  
vera apparent; quod optime de-  
monstrari potest. Si Cartesius ita  
sensui literaliter verborum ex epistola  
ipfius adductorum inhærens, tan-  
quam ab adversario profectorum,  
huic insistat, & supponat, astra ap-  
parere præcise in eodem puncto, ubi  
sunt revera; ultra id, quod dixi, e-  
um falli hoc argumento, ipsi rege-  
ri potest, non opus esse, ut ad se-  
cundam hanc partem recurrat, &  
ipsum per eclipsin lunarem idem  
probare potuisse, quod voluit pro-  
bare per eclipsin solis; non vero ne-  
cessum est hoc ut magis explicetur.

Concludit denique Cartesius e-  
pistolam suam hoc modo: *Non  
addam hic multa alia, qua mon-  
strare possent, hanc ultimam asser-  
tionem aut propositionem absur-  
diorum esse primam. V. g. hoc po-  
sito, semper ad orientem in ho-  
rizonte circulum nigrum conspici  
debere inter terram & cælum; &  
versus occidentem Solem & stellas  
supra montes & multa alia ejus ge-  
neris. Non etiam quero, quam  
si motus hic circularis luminis,*  
quod

quod eodem tempore è diversis astris egreditur, ducatur, ut semper inæqualitatem retineat, quæ est in velocitate astrorum unde egreditur &c. Nam si, quæ scripsi, non sufficiant tibi convincendo, fateor, te planè invincibilem esse. Vale. Hæc non nova absurda sunt, quæ Cartesius objicit, sed novæ difficultates, quibus se ipsam implicat: non sigillatim eas enodabo, quoniam ipse eas modo enarrat. Non satis vero mirari possum, cum video constantiam quâ omnia scribit; imprimis, cum video non esse verba mentem præcurrentia; sed epistolam seriam scriptam in otio, de re, quam longè præmeditatus fuit, & post reiteratas disceptationes. Mihi videtur non in sola hac epistola Cartesium falli; credo me probare posse hoc ipsi in plurimis locis philosophiæ accidisse. Forte & ego fallor, iudices appello eorum quæ scripsi, omnes qui ea legere & examinare voluerint. Cum hæc materia pure geometrica sit, & ego ab omnibus abstinuerim, quæ in Physica disceptari possint, facile determinari poterit, a quo paralogismus

gismus admissus sit, & num ego ipse  
in errorem inciderim, dum ostendere  
volui Cartesium non solidè pro-  
bare quæ demonstrasse  
se contendit.

*Finis Motus Localis.*



STA-

*STATICA*

SIVE

*SCIENTIA*

DE

**VIRIBUS**  
**MOVENTIBUS,**



## PRÆFATIO.



*Tractatus hic est sequela Discursus de Motu Locali, jam ea mente publicati, ut integra haberetur Mechanica, & omnis scientia motus in ordinem redigeretur. Qui modum procedendi modorum norunt, in consideranda natura & artium praxi, etiam commoda norunt, quæ in cognitione legum motus reperimus. Et sicut certum est, nihil in artibus absque usu mechanicæ fieri; ita sciendum etiam nihil in effectibus naturæ particularibus explicari posse, nisi demonstrationes hujus scientiæ ibi adhibeantur. Mechanica regulas præscribit Architecturæ utrique civili inquam, & Militari.*

*Hec*



*Hæc naves exstruit & gubernat. Hæc machinas conficit, ad elevanda absque difficultate gravissima onera. Aquæ ductus normat, cursus ejus & saltus in molendinis & domibus voluptuariis procurat. Organa absque flatu animat, & canere facit solò aquarum casu. In speculuncis artificialibus rupes loqui facit; ubi avium cantus imitatur, & dulcissimos concentus auribus nostris præbet. En partem eorum quæ facit ab arte humanâ in usum iraducta, quid autem non facit a natura industria adhibita? Nonne ipsa terram immobilem firmat sub pedibus nostris, & omnibus corporibus locum præscribit, quem in toto mundo tenere debeant? Imo ipsa hæc est quæ Maris superficiem rotundam efficit, & ejus aquas filtrat (defecat) per ductus subterraneos, ut inde fontes*

tes & rivi oriantur; hæc nubes in medio aeris suspendet, eas in loca diversa detrudit ope ventorum, ex iis pluviæ exprimit, ut agri fertiliores reddantur hæc corpora gravia descendere facit, cum duplici velocitate, & hæc de proportionē quam Philosophi mirari satis nequeunt, hæc cælos circumvolvitur; & eosdem in motu hoc regulari servat; hæc aves in nube volare, pisces in aqua natare, & animalia in terrâ ambulare facit, hujus ope fit cordis pulsus, sanguinis circulatio, spirituum distributio, respiratio; hæc undique lumen & sonos in gyrum agit quæ inflecti facit aut rumpit in echo, speculis & per specillis. Verbo, sine ea neque in arte neque in natura quicquam sit; ita ut impossibile sit, in Naturæ consideratione, aut Artis praxi, sine remora progredi

*gredi, absque cognitione & usu  
Mechanicæ.*

*Estendum nihilominus, hanc  
tam pulchram, tam curiosam,  
tam necessariam scientiam, diu  
admodum neglectam esse. Ari-  
stoteles reverà pulchrè hanc in-  
rem meditatatur; cogitationes ve-  
ro ejusdem limitatæ sunt ad so-  
las vires moventes, quas ad ar-  
tem equestrem, ductum navium,  
consistentiam & motum anima-  
lium applicat. Quod ab Archi-  
mede habemus, propriè nihil  
aliud est, nisi demonstratio ve-  
tis & trutinæ & machinarum  
quarundam inde orientium.  
Hiero artificiales fontes & ar-  
cus sive balistas tractavit. Quod  
Vitruvius fecit, aliquantum la-  
tius patet: Sed præterquam  
quod non nisi minor Mechni-  
cæ pars sit, dicendum, quod si  
volupe fuerit, omnes has parvas  
machinas movere; si etiam com-  
modum*

modum aliquod exin oritur, non magnum tamen inde proveniet adjumentum naturam cognoscendi. Videamus nihilominus, quò redeat omnis Veterum scientia: hoc in statu ad nos usque pervenit, cum non obstantibus tot commentariis & tot compilationibus, nemo per tot secula hunc laborem in se suscepit, ut ad novum eandem eveheret perfectionis gradum: donec ultimis hisce temporibus, tam felicibus in detegendis novis, vidimus quosdam, qui hanc artem excolere conati, vel potius, qui sibi composuere SCIENTIAM plane NOVAM de MOTU. Certè Gallileus rectè Operi suo præmisit titulum SCIENTIÆ NOVÆ, quoniam inibi DE ACCELERATIONE ponderum tractavit, cadentium, DE VELOCITATE corporum in planis inclinatis, De VIBRATIONIBUS pendulorum, & de chordis tensis;

tenfis; de resistentia & fractura corporum, & multis aliis rebus, antea incognitis. Torricellus adhuc splendorem addidit inventionibus Galilæi, novis suis experimentis vacui, & pulchris argumentis de æquilibrio liquorum. Licet vero excellentes hi viri satis ingenii habuerint, ut invenirent novas scientias, non satis tamen felices fuere ultimam imponendi manum; fatendum enim, multa adhuc, deesse huic scientiæ, qualem nobis dedere, ut Mechanica plena inde fiat; non omnes materias tractat; non nisi experimentis multa probat, quæ ex principiis nature probanda; in plures tractatus distincta est, non coherentes; imo defectus quosdam habet, notantur errores, qui certè veniam merentur in materia tam delicata, baud tamen inquietudine officere cessant, summam

*nam exactitudinem in argumentis physicis desiderantibus.*

*Vidimus deinceps Magnos viros feliciter laborasset ut excolerent & perfectam redderent hanc scientiam. Continua experimenta in diversis Europæ locis facta; Tractatus in lucem editi de legibus motus, resistentia corporum, vi percussionum æquilibrio liquorum, duritie, gravitate, & multis aliis rebus, certè opera sunt digna Autorum acumine, & seculi elegantia; Non dum tamen dicere possumus esse Mechanicam. Pulchre partes sunt, non tamen corpus conficiunt, quoniam a diversis Autoribus producta, diversa collimantibus, nec convenientibus, ut ad idem propositum concurrant, & ex diversis argumentantibus principiis.*

*Speravi semper Magnum opus Wallisii, tam diu expectatum*

rum, omnia comprehensurum, quæ de hac re optari possunt; nec de eo amplius dubitabam, cum très magnos Tomos in 4to viderem, cum Titulo, MECHANICÆ ET SCIENTIÆ MOTVS Sed expertus sum, hoc excellens in se & admirandum opus, aptius esse satisfaciendis jam consummatis in hac scientia, quam informandis tyronibus. Præterquam enim quod minime omnia comprehendat, tam doctè & geometricè scriptum, ut à paucis intelligi possit.

Ergo plenum corpus Mechanicum conficere constitui, secundum optimam Pappi ideam, ubi colligere possem omnia quæ diversi Autores in hac materia invenerunt, cum eo quod ipse detegere poteram, si tam felix fuero, ut quicquam novi invenire possim.

Totum opus in sex discursus divido, quorum primus jam apparuit,

*paruit, de Motu in genere tractans, de modô, quô producitur, quo conservatur, & communicari potest; de legibus percussionis, de regulis reflexionis, & plurimis similibus motus proprietatibus, considerati in statu libero ab omni alio impedimento. Secundus discursus est is, qui tractat hujusmodi motus qui cum violentia quadam fiunt, resistantiam aliunde obviam superantes. Prætes demonstrationem omnium machinarum movendarum, quarum vis vi libræ similis, ibi impossibilitatis motus perpetui ratio habetur; tractatur ibi de corporibus suspensis, vel unô vel ambobus terminis allegatis, de modo, quo rumpuntur, de figura, quam capiunt cum incurvantur; in specie vero ostenduntur, casus ubi funes tensi sunt Parabolici, Hyperbolici, Elliptici aut Circulares, Vires Turrium*



Pyramidum examinantur, loca debiliora ostenduntur; figura determinantur, illis adaptanda quo perfectiores fiant, & equaliter violentiæ ventorum resistant, Regulas generales damus resistantiæ corporum; medium indicamus has regulas generales casibus particularibus applicandi, qui Architecturam & reliquos naturæ Artisque effectus concernunt, & exemplo à navis motu petito ujus regularum mechanicarum notatur. In discursu hec propositiones quedam sunt, quæ forsân aliquid negotiifacessent geometricarum demonstrationum non assuetis; præteriri uero possunt, nec sunt absolutè necessariae; nihilominus eas apponere volui, quoniam admodum utiles, & in sequentibus hujus Mechanicæ valde inserviunt rebus, quæ sine illis non resolvi possunt, determinandis.

*Tertius discursus, est de motu corporum gravium; ubi absque novorum suppositione omnes huius motus proprietates demonstrantur; sive proprio pondere descendant corpora, sive moveantur cum violentia propulsa. Ibi ratio ostenditur augmenti & diminutionis miræ velocitatis corporum, ascendendo & descendendo omnes, quos imaginari licet, lenitudinis gradus percurrentium. Galilaus non ostendit has proprietates, nisi supponendo definitionem, ipsi negatam. Balianus aliam progressionem motui horum corporum dare voluit. Hi duo autores suos habuere affectus, & vidimus immensa volumina disputationum, quæ tamdiu fuisse agitata inter Gassendum & Patrem Cazre donec res a tribus magnis geometris confecta videretur; Hugenius & Pat. de Billy demon-*

Prævarunt progressionem Baliani  
esse impossibilem; Fermatus ostendit  
aeternitate opus esse corpori,  
ut descendat in hac velocitatis  
proportione. saltem ab altitudi-  
ne pedis. Omnes docti his de-  
monstrationibus tam regulari-  
bus assentiebantur; Sed Pater  
Lalouvére, illustris ob magna  
invenita Geometrica, superve-  
niens, Baliani progressionem non  
obstantibus demonstrationibus  
his cunctis, maxime possibilem  
et naturalem esse ostendit; mo-  
dus etiam, quò illum defendit,  
tam pulcher visus, ut nec Ferma-  
tus ipse, quid regereret, invenerit.  
Omnia hæc in hoc discursu ex-  
plicata reperientur, monstrabi-  
turque primam hanc gravitatem  
aut gradum istum celeritatis de-  
terminatum, quæ demonstratio  
Lalouveri pro fundamento uti-  
tur, subsistere non posse. Similis  
planè progressio, quam in motu  
bra-

*brachii, pedis aut instrumento-  
rum quæ tenemus, quando quid-  
piam ferimus, observamus, ex-  
plicatur. Aliud adhuc progres-  
sionis genus ostenditur, in globis  
tormentariis obvium, aut sagit-  
tâ ex arcu emissâ; motus in pla-  
nis inclinatis examinatur, & hic  
propositio ista tantoperè prædi-  
cata demonstratur, de motu in  
Cycloide factò, quam & Hüge-  
nium demonstrasse novi.*

*Quartus discursus de motu  
corporum liquidorum agit; ubi  
demonstramus, nihil præsuppo-  
nendo, omnia quæ in velocitate  
liquorum accidere videmus, i-  
tem in vi pressionis ipsorum in  
directione & figura quam in sal-  
tibus, in decursu, & æquilibrio  
suo induunt. Sub nomine cor-  
poris liquidi comprehendimus  
aerem & omnia corpora, quæ  
non sunt dura; ita ut in tracta-  
tu hoc omnia ad PNEUMATI-  
CAM*

CAM spectantia reperiantur, vis elateris, rarefactio & condensatio, vis miranda pulveris compressus omnia denique de vacuo experimenta, & ratio omnium horum mirabilium effectuum ibi reperiuntur, hic videbuntur.

Quintus discursus est de motu VIBRATIONIS, i. e. omnium corporum motum reciprocum eundo & redeundo facientium, uti pendula, chorda tensa, elateres & plura alia corpora. Pendulum hic describitur, cujus vibrationes omnes aequaliter durant; demonstratur etiam omnes vibrationes in chorda tensa aequaliter durare; vibrationes duarum chordarum aequalis magnitudinis, & aequaliter tensionarum, reciprocam rationem longitudinis chordarum habere, eundem in pendulis saltem in proportionem subdupla sint; in aequalibus chordis, vibrationes in pro-

portione subdupla esse respectu virium nūc ponderum tendentium; vibrationes iterum in ratione subdupla esse ad spissitudinem funium ejusdem longitudinis, & æqualiter tensorum. Ita ut per causas omnia ea demonstrantur, quæ experientia nos observare docuit in sonis & harmonia chordarum tensorum.

Sextus Discursus est de motu UNDULATIONIS, ad exemplum circulatorum in superficie aquæ orientium injecto, lapide. Similes Circuli considerantur in aere vel aliis subtilioribus substantiis formandi, quas manifestissima experientia ubique expensas esse docet. Et hic motus ille est, quem MOTUM UNDULATIONIS vocamus, qui lusui & delectationi infantium inferviens, subtilissimis Philosophis subjectum profundissimæ meditationis exhibere potest. Examinamus

namus ergo, quomodi circuli formari possint, & quomodo deinceps motus eorū invicem communicetur, quæ sint lineæ directionis, quali vi prope aut in longinquum agere queant, quomodo reflectantur, quomodo refrangantur; supponentes deinceps, cum omnibus Philosophis, sonum hujusmodi motu aeris pro vehiculo uti, omnia ad sonum spectantia explicamus; & conjecturam facientes de propagatione luminis, examinamus annon etiam supponere possimus lumen simili motu pro vehiculō uti in aere subtiliori? Ostendimus etiam revera in hac hypothesis omnem luminis proprietatem & colorum modo quodam naturæ convenientissimo explicari, quæ absque eâ haud facile explicantur; spero etiam, me lectori satisfacturum, quando iis modum, quō mensura refractionum demonstratur, ostendam.

*En finem & Propositum operis hujus, in quo præter magnum propositiorum geometricarum numerum, quarum novitas doctis forsitan accepta erit, ingens còpia praxium curiosarum & utilium in omnibus artibus, reperitur, ut & multæ demonstrationes, quæ pulcherrimis Physicæ questionibus decidendis inseruiant. Quod artem attinet, gravissimæ ibi positæ observationes aquarum ductum concernentes; Molendina pneumatica describuntur, ad allevandam aquam conducentia, noctu dieque ad omnem ventum agitanda, ita ut tangi non debeant. Proportio ibi datur quantitatis pulveris tormentarii ad cuniculos & tormenta; Regula præscribuntur in jactu certo globorum majorum observanda, quos Galli BOMBES vocant; longitudo determinatur, tormentis attribuenda,*



ut per longissimum spatium vim suam exerant; novæ machine delectationi aptæ describuntur; ut & perpetuum mobile. Quoad Physicam verò medium datur explicandi per leges Mechanicas systema Tychonis Brahe, quod plurimis Mathematicis impossibile visum. Impossibilitas motus atomorum Epicuri ostenditur. Ostenditur etiam motum cælorum non provenire posse ab ipsorum forma, i. e. motum hunc non procedere posse e principio interno & naturali, quemadmodum dicimus, corpora gravia ruere deorsum aut levia ferri sursum per principium internum & naturale. Proponitur Modus mechanicus duritiem corporum explicandi, & resistantiam quam, cum rumpuntur, monstrant; qui labor non adeo levis est, uti fortè imaginantur sibi nonnulli: Fluxus & refluxus maris, origo fontium, & plurima ejus generis, ad leges mechanicas revocantur. Lubens propositum meum articulatim proponere volui, ut judicium doctorum acquirerem, qui non majori beneficio me afficere poterunt, quam si indicaverint, quid corrigendum aut addendum judicent.



# STATICA

VEL

## SCIENTIA

De

VIRIBUS MOVENTIBUS.

I.

*Vires con-  
traria in  
ponderibus*



**C**ecidit sæpe corpo-  
ra ita inter se ligata esse,  
ut unum sine altero  
moveri nequeat; quandoque si unum  
se movere nititur contra alia, se im-  
pediunt invicem, si vires eorum æ-  
quales sunt, sin minus, fortius præva-  
let, & debilius obligat ut moveatur  
contra propriam inclinationem. Ita  
in bilance videmus, pondus unum  
descendere non posse, nisi alterum  
attollatur; & si æque gravia sunt,  
ambo in æquilibrio manent, cum  
utrumque; descendere nititur ob  
gravitatem suam; sin minus, ma-  
jus obligat minus, ut contra na-  
turam & inclinationem corporum  
gravium ascendat.

II. Si

II. Si loco duorum ponderum *Et aliis cor-*  
 æqualium in duabus trutinæ lancibus *poribus.*  
 reponendorum non nisi unum re-  
 ponatur in lance una & alteram ho-  
 mo manu apprehendat deorsumque  
 trahat, fieri posset, ut homo hic ita  
 vim temperet attrahentem, ut  
 pondus oppositum sustineat; nec  
 tamen illud amplius ascendere fa-  
 ciat, aut descendere permittat; hoc  
 casu concipimus vim manus hujus  
 æqualem viribus ponderis esse. Et  
 si jam loco ejusdem ponderis, aliam  
 manum ab altera parte trahere sup-  
 ponamus, eadem vi, qua pondus;  
 tunc speciem æquilibrii inter duas  
 manus concipimus, quæ cum æqua-  
 li vi utrinque trahant, neutra alte-  
 ram superare potest, consequenter  
 immobiles manent ambæ.

III. De his igitur viribus, ad mo- *Subiectum*  
 venda corpora necessariis non ob- *statica*  
 stante resistantiâ virium contraria- *sunt.*  
 rum, quæ ab altera parte motum  
 hunc impedire conantur; de his in-  
 quam viribus jam agendum nobis,  
 hancque scientiam *Staticam* appel-  
 lamus, quæ non solum viribus illis  
 convenit quæ in corporibus gravibus  
 offenduntur, sed & omni nisi quem  
 in quocunque corpore nobis conci-

pere. Verum est, quod cum nulla vis sit, quæ non aliquo modo per vim ponderum explicari possit, ordinarie exemplum corporum gravium adhiberi, ut intelligatur quid in genere omnibus trahentibus aut moventibus conveniat viribus. Et ita leges Staticæ explicamus, ita ut sub vocabulo ponderis, æquilibrii & omnis ejus quod ponderi corporum simile, in genere intelligere possimus corpora quæ pollent vi movendi, quæ se invicem impediunt aut superant.

*Centrum  
gravitatis.*

IV. *Centrum gravitatis* aut ponderis corporis cujusdam est punctum, ex quo si suspendatur corpus, in æquilibrio manet. Si filum extremo baculi cujusdam longi alligetur, isque suspendatur, manifestum satis est, baculum inclinari; at si filum medio baculi alligetur, & suspendatur, facile observabimus baculum non magis in unum quam alterum inclinari latus, sed in æquilibrio manere, si dimidiæ baculi partes æquali gravitate fuerint prædictæ. Et hoc medium gravitatis, unde baculus suspensus in æquilibrio manet, centrum est gravitatis baculi.

*Ubi sit in  
corpore re-  
gulari.*

V. Si baculus plane uniformis esset, & perfectum cylindrum exhiberet, æque


æque spissum in uno extremo ac in altero; & adhuc e materia quadam factus cujus partes æque magnæ sunt æque graves; tunc centrum gravitatis idem cum centro figuræ baculi erit; hoc est, si punctum medium totius baculi capias, in eodem puncto & centrum gravitatis habebis; quoniam patet illud, si in hoc puncto suspendatur, in æquilibrio mansurum, cum æqualis gravitas utrinque sit, eadem ratione applicata, sicut æqualis quantitas adest materiæ.

VI. Si vero baculus e diversa constaret materia, cujus partes æque magnæ non sunt æque graves, v. g. pars dimidia ex ebena, ligno admodum gravi, altera e pino multo leviori; tunc centrum gravitatis non erit in medio baculi, quoniam dimidium ex ebena cum sit gravius multo, superaret alterum e pino, multo levius; ut igitur centrum reperiatur, in dimidium ex ebena progrediendum.

VII. Corpora e tam diversa quoad pondus materia composita, heterogenea appellantur, & quæ uniformem saltem continent, & ubique æque gravem, homogenea dicuntur.

*Linea directionis.*

VIII. *Linea directionis* est linea per quam tractio fit. Uti si pondus *c*, suspensum ope fili *cb*, gravitate sua trahit clavum *b*, cui filum alligatum, linea directionis ea erit quam imaginari nobis possumus, clavum transiensem, & directe deorsum tendentem, qualis est idem filum *bc*, quoniam revera pondus tunc in recta linea deorsum trahit secundum hanc lineam. Si vero filum duceretur



supra trochleam *b*, & clavum attingat, *a* a latere positum; tunc linea directionis respectu clavi *a*, erit linea *ab*, quæ ad latera tendet, non deorsum; quoniam revera clavus ad latus trahitur, non deorsum.

*Centrum  
graviium*

IX. Sicut observamus corpora gravia semper recta linea ad centrum terræ cadere, quando libere cadunt; ita quoque dicimus centrum terræ esse *centrum graviium*, h. e. punctum ad quod omnia gravia,

via tendunt corpora. Ut ita bene distinguendum *centrum* gravitatis a *centro* *gravium* aut corporum *gravium*.

X. Quoniam lineæ directionis diversorum corporum suspensorum directe ad centrum gravium tendunt, *Linea directæ* e. ad medium terræ, omnes hæ *cor- porum su- pensorum* lineæ se intersecant in hoc puncto, *consequenter* nec inter se parallelæ *parallelæ* sunt, rigoroſe loquendo; paradoxon *consentur.* quoque verissimum est, duos muros oppositos conclavis cujusdam spissiores esse & longius a se distare in superiori parte quam in inferiore, si prorsus complanati fuerint, & ad normam regulamque constructi. Hoc in rigore mathematico verum, sed differentia multo minor est, quam ut sensu percipi possit; ita ut respectu ejus, quod sub sensu cadit, dicere possimus muros esse parallelos, & ubique æque spissos. Et ita etiam supponere possumus, omnes lineas directionis corporum suspensorum, parallelas inter se esse.

XI. Regula generalis est, corpora gravia semper in tantum descendere, *Corpora quantum possunt; h. e. semper infimum locum petere, quo pertingere possunt, si non impediuntur ab alio corpore quod se descensui ipsorum oppo-*

opponit. Si igitur globum fastigio recti imponas, deorsum volvetur, si potest, nec obstaculum invenit, quod ipsum retinet; cum enim gravitas ejus semper eum deorsum trahat, ipsum hoc casu eo tendere necesse est.

*Etiam in  
plano in-  
clinato.*

XII. Idem dicendum de corpore æquo & complanato, tecto cuidam imposito, aut plano inclinato; complanatum enim hoc corpus nihil obstaculi inveniens, ad infima decurret, cum uniformitas superficierum nulatenus impediat delapsum.

*Corpus im-  
motum ma-  
net, cum  
moveri ne-  
quit absque  
ascensu  
centri gra-  
vitat. is.*

XIII. Cum dicitur corpus descendere quia magis deorsum ferri potest, hoc intelligendum est respectu centri gravitatis; hoc enim centrum omnino moderatur, cum in hoc puncto principalis descensus vis sita, sit. Ita ut, si corpus moveri debet, centrum gravitatis descendere posse, necessum sit, alias non movebitur. Ita si corpus *g b e d*, primæ figuræ, tabulæ imponatur, imaginari nobis facile possumus






Idem versus D inclinari & prolapsu-  
rum, quoniam vero hoc fieri nequit  
quin centrum gravitatis *a* tollatur ad  
*A*, corpus in hoc situ manere cogitur  
absque motu.

Unde videmus, necesse esse ad im- *Et cum li-*  
mobilitatem corporis tabulæ impo- *nea dire-*  
fiti, aut alii fulcro, ut centrum gra- *tionis ba-*  
vitatatis descendere nequeat; & ad- *sin transi-*  
hoc sufficit, si corpus, quod illud su-  
stinet, non inclinatum est, ut linea di-  
rectionis, h. e. linea e centro grava-  
tis versus centrum graviū tendens, in  
aliquam partem baseos corporis ca-  
dat. Et e contrario, si linea hæc extra  
basin corporis cadit, corpus hoc sine  
dubio titubabit. Sic corpus *a* in se-  
cunda fig. cadat necesse est, quoni-  
am cum centrum gravitatis in *a* ex-  
istat & linea directionis *dc* cadat ex-  
tra basin *e b*, totum corpus *a* ver-  
sus *A* inclinari potest, ita ut, dum  
angulo *e* semper insistit,

2




cen-

centrum  $a$  moveatur versus  $A$ , circuli partem describens, cujus centrum  $e$ ; & sicut facile videmus, centrum gravitatis  $a$  depressius fore in  $A$ , ut demonstratione ulteriori non indigeat; ita dicendum est etiam totum corpus titubaturum. In prima vero figura manebit immotum, quoniam linea directionis  $a c$  intra basin corporis hujus  $b e$  cadente, idem corpus titubare nequit, neque ex una, neque ex altera parte, v. g. versus  $D$ , quin & centrum  $a$  moveatur in  $A$ .

*Quanam  
corpora re-  
pant, qua-  
nam roten-  
tur, in pla-  
no inclina-  
to?*

XV. Videmus adhuc, si tabula corpus sustinens, inclinatur, corpora hæc rotari quandoque descendendo, & quandoque repere.



Si enim linea directionis  $a c$  extra basin  $e b$  cadit, (in prima figura) corpus rotabitur; si vero intra eam, uti

uti in secunda figura, corpus re-  
pet; id quod ad oculum patet.

XVI. Hac ratione globus plano *Globulus*  
cuidam impositus, semper rotari de-*super pla-*  
bet, donec ad certum pervenerit *no.*  
punctum ubi quietus esse possit.



Imaginetur nobis planum *bg*, su-  
pra terram *d*, & ducatur a centro  
gravium *d* perpendicularis *dca*,  
versus planum *bg*; & videbimus glo-  
bum ibi bene consistere posse, quo-  
niam linea directionis *acd* per-  
curret punctum *c*, cui globus inni-  
titur. In quovis vero alio loco  
uti in *e* vel in *f*, globus descen-  
dere & versus *a* rotari poterit,  
quoniam tunc linea directionis *e*  
*d* aut *f d*, extra punctum fulci-  
ens *g* aut *b* cadet. Ita videmus  
veritatem paradoxorum, neminem  
in plano ambulare posse, quin vel  
ascendat vel descendat; hominem  
semper ad eundem locum meantem  
in

in ambulacro plano, quandoque descendere, quandoque ascendere; & in tantum procedere posse, ut tandem repere cogatur, nec amplius stare possit.

*Corpus  
tanto fir-  
mius sus-  
tinetur, quā-  
to basis est  
est latior.*

XVII. Videmus præterea, quanto latior basis corporis, tanto firmitus ipsum corpus fore, & immotum persistiturum. Ut enim corpora cadant, movenda sunt, ita ut linea directionis extra basin cadat, & tunc proprio pondere cadent. Patet autem plus laboris requiri, ut demoveatur linea hæc extra basin, si lata admodum, quam si angusta admodum.

*Acus in cu-  
spide sua  
stare ne-  
quit.*

XVIII. Licet ergo strictè loquendo, acus erecta stare possit, posita in cusptide supra tabulam marmoream, nihilominus impossibile est eam ibi manere immotam, quoniam cusptide solum quæ ferme invisibilis, insitens, minima vi dimoveri potest linea directionis extra basin tam exiguam, si semel inibi existeret.

*Ob perpetu-  
am aeris a-  
gitationem.*

XIX. Et quoniam aer perpetuo agitatur, agitatio hæc plus satis sufficiet ad movendam & deficiendam acum.

*Quædam  
corpora  
grandia*

XX. Non ergo mirum videatur, turres quosdam per aliquot secula con-

consistere, licet inclinati sint versus non corru-  
 alterum latus, & ruinam minentur; *unt, licet*  
 quoniam turres isti hoc artificio ex- *inclinantur*  
 structi esse poterunt, aut hoc forte *aut super*  
 fortuna venire potuit, ut centrum *exigua ba-*  
 totius operis magnorum horum cor- *si existant.*  
 porum directe a basi sua sustentetur.  
 Nec mirum prodigiosum Obeliscum  
 Romæ immotum manere in basi sua,  
 licet non nisi proprio pondere par-  
 tes cohæreant, quamvis enim basis  
 admodum parva est ad altitudinem  
 relata, massa tamen hæc tam ine-  
 pta, & tam enormis ponderis est,  
 ut nulla vis venti tam fortis sit,  
 quæ sufficienter eam movere, aut  
 lineam directionis extra basin di-  
 movere possit.


XXI Lex hæc mechanica jam ex- *Leges Me-*  
 plicata, exacte observatur in omni- *chanice ab*  
 bus Naturæ effectibus; aliquid ve- *animalibus*  
 ro mirandi inest modo, quo anima *& pictori-*  
 ha utuntur, ut se sustineant & a *bus obser-*  
 lapsu conservent, de quo alibi dice- *vata.*  
 mum. Interim in genere notan-  
 dum, omne animal, in quocunque  
 situ fuerit, ita dispositum, esse, ut li-  
 nea directionis intra pedes aut ma-  
 nus constituatur, quibus sustinetur; &  
 si Pictores & sculptores hanc regulam  
 non curant, ridendos se præbent, &  
 ani-

animalibus situm dant quem habere nequeunt.

*Quando*

*corpora suspenda in quiete manent.*

XXII. Corpora suspenda, quiescunt, dum linea directionis transit punctum cui appensa; & si inde dimoveantur, ipsa illuc per pondus proprium reducuntur. V. g. si corpus *a* suspendum ex clavo *c*, manebit in *e a* quoniam linea directionis est *c a*; si vero versus *e* aut versus *b* trahatur, descendere poterit in *a*; quoniam patet, in arcu *e a b*, in quo



corpus suspendum moveretur, punctum infimum esse *a*, & consequenter corpus descendere versus punctum hoc,

XXIII.


XXIII. Cogitandum, corpus per se *Corpus gra-*  
non mutare gravitatem, dum mutat *vitatem*  
figuram aut situm, Ita massa plumbi *non mutat,*  
pondo æquans, cum rotunda est et *licet situm*  
iam pondo æquabit, licet quadrata *aut figu-*  
sit & vel in meridiem vel orientem *ram mutet.*  
vergat; sique massa hæc plumbi sta-  
teri imponatur, semper idem reperi-  
etur pondus. Imo, vis quam adhi-  
beret libere suspensa ex clavo quo-  
dam ope fili, eadem semper foret,  
quæcunque figuram & situm ha-  
beret.

XXIV. Postquam pondus ex cla- *Corpus ope*  
vo ope fili suspensum & quietum *fili vel vir-*  
vidimus, concipiamus jam filum *ga rigida*  
hoc rigescere & unum inflexile cor- *suspensum*  
pus cum pondere constituere, vis, *æqualiter*  
qua clavus trahitur, propterea nequa- *trahit.*  
quam mutabitur; quoniam manife-  
stum est, flexibilitatem vel rigorem  
fili nihil hic conferre.

*En jam maxime arduam Staticæ  
propositionem*

XXV. Pondera duo suspensa e du- *Propositio*  
bus extremis libræ, in æquilibrio *Statica*  
manent, dummodo brachia Libræ, *fundamen-*  
quibus pondera appensa, in ratione *talis.*  
reciproca ponderum fuerint. Men-  
tem meam clarius aperiā. Imagine-  
mur, nobis baculum *b c* (1. fig.  
pag. seq.) qui ansam aut filum in me-  
dio

dio  $a$  habeat quo teneri & instar libræ suspendi possit; sint præterea duo pondera,  $d$  &  $e$  appensa per puncta  $b$  &  $c$ , ita ut pondus  $d$ , ad pondus  $e$  sit reciproce, ut longitudo  $ac$  ad longitudinem  $ab$ ; h. e. si pondus  $d$  est duplum ponderis  $e$ , longitudo  $ac$  fit etiam dupla longitu-




dinis  $ab$ ; aut si pondus  $d$  est triplum ponderis  $e$  longitudo  $ac$ , fit etiam tripla longitudinis  $ab$ ; aut denique, ut, quancunque pondus  $d$  habeat rationem ad  $e$ , eandem longitudo  $ac$ , habeat ad longitudinem  $ab$ ; dico pondera  $d$  &  $e$  in æquilibrio fore.



XXVI. Ad demonstrandam hanc *Demon-*  
 propositionem imaginari nobis pos-*stratio.*  
 sumus, pondera  $d$  &  $e$ , mutare fi-  
 guram, & ambo oblonga evadere,  
 ita ut totum pondus  $d$  sit extensum in  
 figura  $o f$  (fig. 2.) duplo longiori  
 quam  $a c$ , quo semper in  $b$  suspensum  
 maneat & dimidium ipsius  $d f$ , sit æ-  
 quale  $a c$ . Eadem ratione pondus  $e$   
 longius reddatur in figura  $g f$ , duplo  
 longiori, quam  $a b$ , ita ut semper in  
 eodem puncto  $c$  suspensum maneat,  
 & dimidium  $e f$  sit æquale  $a b$ . Hæc  
 duo pondera sic longiora reddita se  
 tangent in  $f$ , quoniam dimidia  $e f$  &  
 $d f$  simul sunt æqualia ambobus bra-  
 chiis Libræ  $a b$ ,  $a c$ ; h. e. toti longi-  
 tudini  $b c$ , aut  $d e$ , quæ est æqualis i-  
 pfi  $b c$ , quoniam hic suppono  $d e$  pa-  
 rallelam esse  $b c$ ; & alioquin lineas  $b$   
 $d$  &  $c e$  etiam parallelas haberi (10).

XXVII. Cæterum, sicut suppone. *Demon-*  
 re possumus duo hæc pondera con-*stratio.*  
 stare ex materia homogenea cujus  
 partes æque magnæ sunt æque gra-  
 ves, necesse est, ut ita longiora reddi-  
 ta, sint ejusdem spissitudinis, & am-  
 bo prisma constituent, vel baculum  
 prorsus uniformem. Quoniam enim  
 omne pondus  $o f$ , est ad omne pon-  
 dus  $f g$ . uti  $a c$  ad  $a b$  per hypothesin,  
 aut uti longitudo  $c f$ ; (dupla ipsius  
 F  $a c$ )

*ac*) ad longitudinem *fg*, (duplam ipsius *ab*;) sequitur secundum regulas geometricas de solidis, spissitudinem duorum prismatum istorum æqualem esse; quoniam regula generalis est, prismata ejusdem crassitie, inter se esse uti eorum longitudines.



item prismata, quæ inter se sunt uti longitudines eorum, esse ejusdem crassitie. Igitur duo prismata *ef*, *fg*, cum sint inter se sicut longitudines *of*, *fg*; necessario ejusdem sunt crassitie, & ita prisma totale vel baculum uniformem faciunt.

*Demon-  
stratio.*

XXVIII. Considerando jam prisma hoc totale, ut pondus unicum & con-

continuum, reperiemus, ipsius centrum gravitatis debere esse in  $h$ , quod suppono punctum medium totius corporis,  $og$  (5) Jam punctum hoc  $h$ , perpendiculariter imminet puncto  $a$ , quoniam enim tota longitudo  $og$ , dupla ipsius  $bc$ , dimidiū ejus  $ob$  erit æquale eidem  $bc$ , & quoniam  $od$ , æqualis ipsi  $ac$  necesse etiam  $dh$ , esse æqualem ipsi  $ab$ , ita cum  $d$  cadat sub  $b$   $h$  cadet etiam sub  $a$ .

*Demonstratio.*

XXIX. Imaginemur jam nobis omnne filum rigescere, & consideremus  $odbcog$  ut corpus unicum & inflexile, ita tamen ut tota Libra  $bc$  & fila rigida sine omni gravitate considerentur; videbimus totum hoc corpus suspensum ex  $a$  in quiete manere, quoniam linea directionis  $a$   $h$  per centrum gravitatis  $b$  & punctum suspensionis  $a$  transit. (22) Filis ergo mollioribus factis & flexilibus, totum in quiete manebit ut ante; (24) immo tunc adhuc quiescet, si concipiamus corpus divisum in  $f$ , quia tum pondus  $fg$ , in eodem situ manebit, utpote suspensum in medio sui & centro gravitatis  $e$ , tum corpus  $of$ , ceu semper in centro gravitatis  $d$  suspensum. Ergo si tandem imaginemur nobis pondera hæc  $of$ ,  $fg$  abbreviari


& ad priorem figuram redire (fig. 1.) etiam tum in quiete manebunt, quoniam quodlibet eorum semper eodem puncto Libræ *b*, aut *c* appensum, a suo latere eodem modo trahit, qualicunque figura fuerit præditum; (23) Et consequenter hæc duo corpora ita in quiete posita, sunt in æquilibrio, quod E. D.

*Nota ad demonstrationem Archimedis.*

*Longitudo filorum, e quibus*

XXX. Qui norunt quid in hac materia dicant interpretes & Commentatores Archimedis, animadvertent, in adducta demonstratione omnes difficultates evitari, quibus subjacet ordinaria demonstratio.

XXXI. Plura adhuc circa eandem notari possunt, quale est illud, nihil referre, num pondera appendantur filis longioribus, num bre-




pondera de-vioribus; manifestum enim, si pondus *e* appensum filo *cc*, est in æquilibrio

librio cum pondere  $d$ , idem quoque *hil refert*, illi æquilibre futurum, si sit appensum filo  $cE$ . Licet enim quædam dubitandi ansa adsit, num corpora graviora sint, si propinquiora terræ; nihilominus, præterquam quod differentia hæc, quæ invenitur in parvis hisce filis, est insensibilis, supponimus idem pondus (& non solum idem corpus) applicatum antea in  $e$ , jam applicari in  $E$ ; & in hoc casu patet, quod eadem vi tracturum sit punctum  $c$ .

XXXII. Notandum adhuc, bra- *Quomodo*-  
chium Libræ, unde pondus suspendi *longitudo*  
censemur, ad perpendiculum infi- *brachiorum*  
tere debere lineæ directionis. V. *libra deter-*  
g. si brachium Libræ  $b a$  retractum *minanda?*  
est, concipienda venit linea hori-  
zontalis  $aB$ , quæ perpendicularis  
cadit in lineam directionis  $b d$  in  $B$ ,  
& tunc pondus  $d$  censebitur su-  
spectrum in puncto  $B$ , & brachium  
solummodo erit  $B a$ . Similiter si pon-  
dus  $e$  paululum ad latus trahit ope  
trochleæ  $f$ , continuatur linea  $f c C$ , &  
ducitur  $a C$  perpendicularis, brachi-  
umque Libræ erit  $a C$ , & non  $a c$ .  
Ita ut longitudo brachii sumenda  
a centro bilancis usque ad locum  
ubi perpendicularis lineam dire-  
ctionis ponderis secat. V. gr. hic

longitudines brachiorum sunt  $aB$  &




$aC$ . & non  $ab$  &  $ac$ ; sic pondera  $d$  &  $e$  erunt uti  $aC$  &  $aB$ .

*Casus ubi  
libra ipsa  
æquilibrio  
se se restituit.*

XXXIII. Notandum præterea, quod si pondera Libræ imposita in æquilibrio sunt; quamprimum paululum Libram versus alterum latus inclinaveris, pondus ejusdem lateris prævaliturum & effecturum sit, ut statera plane vacillet; quoniam in situ obliquo Libræ, linea directionis  $B$  longius ab  $a$  recedet, & linea  $C$ . propius ad idem  $a$  accedit. E contrario si pondera inferne affixa; licet libram aliquantum inclines, statim tamen in situm horizontalem revertetur, quoniam in situ obliquo Libræ, linea directionis  $B$  propius ad  $a$  accedit, & linea  $C$ . longius recedit; sic  $C$ , prævalet.

XXXIV.



XXXIV. Videmus quoque Libras *Librae fallaces.*  
 fallaces variis modis construi posse.  
 Si enim brachia earum inæqualis  
 longitudinis sunt, duæ lances, quæ in  
 æquilibrio sunt vacuæ, etiam in æ-  
 quilibrio manere possunt, positis in  
 iis ponderibus inæqualibus. Sic si  
 ducatum iusto leviolem lanci impo-  
 nas, longiori brachio appensæ, cre-  
 des iusti ponderis eam esse; sed falla-  
 cia hæc evitatur, si situs immutatur  
 & ducatus in altera lance, in qua

antea reponebatur pondus, & deponitur pondus in ea, in qua antea erat ducatus. Item si lances filamentis alligentur, quorum extrema aliquantum infra centrum lances sunt, in æquilibrio manere videbuntur, licet plus ponderis ab uno quam altero latere esse possit.

*Leges æquilibræ ob-  
servata in  
animali-  
bus.*

XXXV. Notanda denique miranda Naturæ industria, & usus regulæ æquilibræ, qui est in compositione corporis animalium, in eorum consistentia & motu; ita enim corpora animalium composuit, ut, cum pedes centri Libræ vices gerant, aut fulcri vectis, ab omni latere pondus adsit æquale. Hinc omnium partium geminarum una ab uno latere, altera ab altero æqualiter a medio distat, sicut brachia, aures, oculi renes; & partes simplices sunt in medio, sicut nares, os, mentum; si vero non sunt in medio, alia ab altero latere pars adest, contrarium pondus addens, sicut fel & lien, cor & pulmones. Sic quoque si ab anteriori parte partes adsunt extreme graves etiam a posteriori aderunt contrapondium sistentes; De qua materia Galenus pulchram animadversionem habet. Præterea Natura animalia ita fecit, ut in omni-



ominibus sitibus æquilibrium habeant, semper æqualiter distributo utrinque pondere corporis. Sic magno ventre præditi retrorsum inclinantur; contra gibbosi aut sarcinam dorso impositam gestantes, antrorsum incurvantur. Si quid a terra sublaturi inclinamur, reponimus pedem, aut ad minimum pedicem totum; nam alias caderemus, cum plus ponderis in anterioribus adesset. Inde est ut nihil e terra tollere possimus, quod ante nos positum, si calces conjunctim uno apponantur. Sic si titubamus & lapsuri versus alterum latus inclinamur, statim brachium aut tibiam ex altero latere extendimus, ut, pes aut brachium a basi s. linea directionis hac ratione recedens, plus valeat ad retinendum reliquum corporis in æquilibrio. Hoc æquilibrium etiam in avibus apparet volantibus, alæ enim eorum, quæ sunt instar fulcri & centri, ab utroque latere æquale semper addunt pondus. Sic Aves longo collo gaudentes, etiam longos habent pedes, quos volando retrorsum extendunt, sicut Ciconiæ. Si aves in altum se levare volunt, alas protrahunt versus caput, eum in finem, ut cum

F S plus


plus ponderis adfit versus caudam, caput paululum eleuetur, & in altum dirigatur, quo motus fieri debet. Contra si descendere volunt, retrahunt alas retrorsum, ut, capite inclinato deorsum, omnis motus eo tendat. Multæ aliæ ejus generis reflexiones adsunt, quas quilibet sibi facile facere potest, non sine delectatione, modo paululum attentus sit.

*Vectis sive*

*libra fulci-*

*ta.*

XXXVI. Idem appareret effectus in libra, si non suspenderetur,



sed fulciretur in cuspide quadam, ubi




libere

libere titubare potest, & tunc rectius  
veētis vocaretur, quam Libra.

XXXVII. Inde ratio dari potest *Vires forsi-*  
de vi forficum, forcipum & simili- *cum & for-*  
um machinarum. Sunt enim totidem *cupum.*  
veētes, vel potius in unoquoque in-  
strumentorum istorum adest par ve-  
ctium, cujus centrum est clavus *a*,  
eosdem conjungens, & sicut brachia  
quæ manu tenemus, h. e. *a c*, *a c* lon-  
giores sunt falculis *ab*, *ab*, ita vis  
brachii applicata, magni est effectus.

XXXVIII. Veētis fulcrum suum *Veētis in*  
in extremitate habere potest, v g. i- *extrema-*  
maginemur nobis perticam *ca* ful- *te fulcrum*  
citam extremo suo, *a*, ab altero ex- *habens.*  
tremo pendeat funis qui trochileam  
transiens, *f*, sit alligatus ponderi *e*,  
quod punctum *c* perticæ, attollere  
nitetur; in alio puncto *b* ejusdem  
perticæ, sit suspensum pondus *d*



quod idem punctum *b* in perticæ  
destrudere nitetur. En duos con-  
tra-

trarios nifus. Si duo hi nifus in æquilibrio manent, ita ut unus non superet alterum, erunt in ratione reciproca distantiarum, i. e. sicut longitudo  $c$  a se habet ad longitudinem  $b$   $a$ , ita erit pondus  $d$  ad pondus  $e$ . Si enim imaginemur perticam in  $C$  productam, ita ut  $a$   $C$  sit æqualis  $a$   $c$ ; & supponamus pondus  $E$  æquale ponderi  $e$ , sit suspensum in  $C$ ; pondus hoc  $E$  tantundem allaborabit, ut dejiciat punctum  $C$  & consequenter ad attollendum punctum  $c$ , quantum pondus  $e$ , ad attollendum punctum  $c$ . Ita loco applicationis ponderis  $e$  in  $c$ , applicari potest in  $C$ , ubi manebit in æquilibrio cum pondere  $d$ ; & consequenter (25.) cum eo erit in proportionem reciprocam distantiarum,  $a$   $C$ ,  $a$   $b$ .

*His certis*


*generis cult-*  
*rio*

XXXIX. Sic videmus vim hujusmodi cultrorum, qui ab uno termino sunt alligati, ut in fig. seq. Frustrum enim si applicatum in  $b$  prope terminum  $a$ , vis manus in  $c$  tanto majoris erit effe-



Etus, quanto longius distabit ab *a*,  
quàm *b*. Eodem modo videmus ja-  
nuam premere magna vi illud quod  
propè cardines; & si duo homines  
connitantur, alter ut aperiat, alter ut  
claudat januam, habilitas eorum in  
eo consistet, ut tantum a cardine di-  
stent, quantum poterunt. Videmus  
insuper fortius nos mordere dentibus  
interioribus maxillæ, quam antero-  
ribus; quoniam maxillæ moventur  
quasi circa centrum quoddam, quod  
est versus fundum maxillarum.

XL. Alligetur funis clavo fixo *g*, *De Troch-*  
& transeat supra trochleam *a c*, dein- *leis.*  
ceps iterum supra trochleam fixam  
*f b*; sintque duo pondera *d* & *e* ap-  
penisa, unum in centro trochleæ, *b*,




alterum in extremitate funis; hæc duo pondera nituntur contra se invicem; & si sunt in æquilibrio, pondus *d* erit duplum ponderis *e*. Consideranda enim trochlea *a c*, instar vectis fulciti in extremo *a*; & revera, loco trochleæ imaginemur perticam *a c*, alligatam extremitate sua *a* funi *g a*; deinceps alius funis alligetur alteri extremo, *c*, quo attrahamus in altum, sive immediate per manum, sive ope trochleæ *f b*, & ponderis *e* si jam pondus *d* appendatur medio perticæ, liquet, (38.) vim applicatam in *c* adæquantem vim applicatam in *b* non nisi dimidium esse ipsius *d*. Nihil jam refert, num vectis *a c* sit perticæ lata an arcta, rotunda an quadrata, potest ergo instrumentum esse rotundum instar trochleæ; Nihil quoque refert, num funis sit alligatus in *a*, aut replicatus inferne, ut assurgat per *c* versus *f*; ita trochlea hæc est vectis, cujus fulcrum in latere *a*. Quod trochleam *f*, attinet ea nec auget nec diminuit vim; quoniam supponimus eam esse alligatam per centrum suum *i*, circa quod volvitur. Ita est ergo libra duo brachia æqualia habens, *i f*, & *i b*, ita ut vis applicata in

in *b* per pondus *e* ut trahat deorsum punctum *b*, eundem habitura sit effectum ac si in *f*, applicaretur ad attollendum punctum *f*.

XLI. Sic funis alligatus una ex-


*Æquilibrium in trochlea.*



terminata clavo *g*; & altera clavo *2*, transiens tres trochleas *a, f, m*. quarum *f* habeat claviculum fixum; reliquæ duæ fulciantur fune. Sint porro duo pondera *d* & *l* æqualia, suspensa per duas trochleas *a* & *m*; dico hæc duo pondera fore in æquilibrio, & minimam vim sufficere ad alterum attollendum trahendo alterum deorsum, id quod oppido liquet. Idem accideret, si major numerus trochlearum adesset, *a, m, n, o, &c.* suspensarum eodem fune, qui recurreret per totidem trochleas *f, f 2, f 3, f 4, &c.* quæ claviculos fixos haberent; tunc enim omnia pondera *d, l, k, i, &c.* sibi invicem æqualia, in æquilibrio erunt,

erunt & minima vis ea ascendere aut descendere faciet.

*De trochleis* XLII. Si in extremo funis alligetur pondus *e*, quod tantum dimidium  
vis.



fit unius ponderum *l*, *k*, &c. hoc pondus *e* solum tenebit in æquilibrio omnia reliqua pondera *l*, *k*, *i*, *d*, quantus etiam eorum numerus. Si enim funis firmiter alligatus in *f* 3, esset in æquilibrio cum *l*; (40) sed *k* & *l* secundum prædicta in æquilibrio existentia, æqualiter trahunt utrinque ut vertant trochleam *f*, quodlibet in suam partem. Hinc cum vis eorum æqualis est, trochlea immobilis manet, ac si firmiter alligata esset; Ita ut funis *o*, *f* 3, possit putari firmiter alligatus in *f* 3, vera enim reliqua pondera *k*, *i*, *d*, non magis eam agitant trahendo, ac si troch-



trochleæ earum planè immobiles  
essent, & funes in  $f_3, f_2$ . &c. alliga-  
ti. Jam si funes isti ita alligati essent,  
pondus  $e$ , esset in æquilibrio cum  
pondere  $l$ , (40) sicut est, licet fu-  
nis liberè transeat super trochleas  
 $f_3, f_2$ . &c. sic minima vis detru-  
dens  $e$  deorsum, sufficeret ad  $l$  attol-  
lendum.


XLIII. Cogitemus jam omnia *Vis troch-*  
hæc pondera  $l, k, i, d$ , tam inter se *levarum se-*  
connexa esse, ut, quamprimum unum *parata-*  
attollitur, reliqua quoque attollan-  
tur; quod intelligi potest si imagina-  
mur nobis, trochleas esse ligatas ope  
perticæ transversæ; aut capsulæ in-  
clusas. Tunc enim non majori labo-  
re opus erit ad levanda omnia hæc  
pondera, quam ad levandum pri-  
mum, quoniam omnia in æquilibrio  
existentia nec ascensui nec descensui  
resistunt, uti monstravimus (41).  
Ita si supponimus,  $e$  habere vim at-  
tollendi primum pondus  $l$ , eo in ca-  
su quo hoc pondus  $l$ , solum fit, aut  
omnes hæc trochleæ  $f$  immobiles  
eandem etiam haberet ad attollenda  
omnia reliqua pondera  $k, i, d$ , quo-  
niam hæc pro nihilo putantur utpote  
nullâ ratione resistantia; ita ut  
omnes hæc trochleæ,  $o, n, m, a$ ,  
capsulæ

capsulæ inclusæ, absque resistantia ascensuræ sint, quamprimum trochlea  $o$  ascendet, & per consequens futurum, ut pondera alligata attollant.

*Vires trochlearum in vicem junctarum.* XLIV. Si denique imaginemur nobis, omnia hæc pondera  $l, k, i, d$  in unum pondus coæcervata, videmus sanè non amplius resistere ita unita; & hac ratione parvum pondus  $e$  poterit adæquare in finitis modis majus quod à pluribus trochleis secundum præscriptum modum, dispositis suspenditur.


*Vis est sicut unitas ad duplum numeri trochlearum.* XLV. Facile notandum, proportionem virium quæ tenent æquilibrium ope trochleatum, esse uti unitatem ad duplum numeri trochlearum suspensarum; sicut igitur hic quatuor trochleæ sunt,  $a, m, n, o$ , pondus  $e$  unius libræ, adæquabitur pondus totale  $d, i, k, l$ , octo librarum, & unicus vir trahens funem in  $e$ ; resistet octo aliis capsulam trochlearum  $a o$  trabentibus.

*De axi rotæ.* XLVI. Sit rota  $AC$ , axis ejus  $A d$  circa quem convolvatur funis sustinens pondus  $d$ . Manus applicetur manubrio  $C$ , ad volvendam rotam, & attollendum pondus  $d$ . Cum igitur manus applicata sit in magna distantia à centro  $A$ , videlicet  $C A$  & pondus



dus e contrario applicatum in parva  
 a centro  $a$ , videlicet  $ba$ ; parva vis  
 in  $e$  adæquabit magnam in  $b$ ; & am-  
 bæ vires in æquilibrio existentes,  
 erunt sicut  $CA$  ad  $ba$ ; i. e. sicut  
 magnitudo five diameter rotæ ad ma-  
 gnitudinem five diametrum axis.

XLVII. Ope rotarum dentatarum, *De rotis*  
 mirè vis augetur; si enim prima ro- *dentatis.*  
 ta Diametro constat sexies, aut decu-  
 plo majori quam axis  $ac$ , vis libræ  
 unius applicata in  $c$ , æquabit pondus  
 $D$  sex aut decem librarum. Si vero  
 primæ hujus rotæ dentes incidant  
 dentibus axeos ( $a$ ) secundæ rotæ, ita  
 ut hæc secunda rota etiam sex, aut de-  
 decies major sit axe suo vis unius  
 libræ



libræ applicata in *C*, peripheriæ secundæ rotæ, idem efficiet quod sex vel decem libræ applicatæ axi (*a*) & eadem hæc vis sex vel decem librarum in axi (*a*) applicata peripheriæ primæ rotæ *C*, idem efficiet quod vis sexies vel decies major applicata in *b*. Ita unica libra in *C* adæquabit triginta sex vel centum libras in *b*. Si jam tertiam, aut quartam rotam addas, etiam diametris sexies vel decies maioribus constantes quam axes, vis semper multiplicabitur per sex vel decem; ita ut unica libra applicata peripheriæ quartæ rotæ, adæquaret mille ducenta nonaginta sex, vel duo millia applicata in *b*.

*Macbina  
ad terram*


XLVIII. Patet admodum, multiplicando rotas, attolli posse pondus æque

æque grave ac Terra tota, modo ma- loco suo di-  
china certo loco stare possit. & restes *movendam.*  
fortes satis adsint. Hinc non inanis  
nec absurda propositio illa Archi-  
medes, quem dicunt punctum extra  
terram petiisse, ut hanc totam e loco  
suo moveret.

XLIX. Ut rotæ agere possint, ne- *Vis rota-*  
cesse est dentes cujuslibet axeos esse *rum multi-*  
æquales dentibus rotæ itsdem occur- *plicatur si-*  
rentis; intervalla dentium etiam æ- *cut earum*  
qualia sint oportet; similiter na- *peripheria.*  
merus dentium axium & rotarum,  
semper proportionatus erit eorum  
magnitudini; si ergo rota decies  
axem superat, etiam decies majore-  
m numerum dentium habebit &  
per consequens decuplo citius cir-  
cumvolvatur axis quàm rota ipsa.  
Ita ut ad mensurandam vim rotæ,  
solum numerus dentium notandus  
sit, & videndum quoties axis cir-  
cumvolvatur, eo temporis spatio, quo  
rota semel circumvolvitur. V. g. si  
hic reperiatur axem tertiæ rotæ tricies  
sexies circumvolvi, dum axis *a b* pri-  
mæ rotæ semel circumvit, concluden-  
dum, libram applicatam axi tertiæ  
rotæ adæquare triginta sex libris ap-  
plicatis axi *b*, & si unica libra appli-  
catur peripheriæ tertiæ rotæ, quam  
suppo-

supponimus adhuc sexies maiorem  
axe suo, habebit adhuc sexies ma-  
iorem vim, & adæquabit ducentas &  
sedecim libras appensas in *b*.

*De Plano* L. Sit *planum horizontale b. g.*  
*inclinato.* hoc est tabula ad normam posita,  
nullatenus inclinans. Sit adhuc *Pla-*  
*num inclinatum b, f,* hoc, tabula  
inclinans ad alterum latus. Globus  
positus in plano hoc, retineatur ope  
funis *i*, qui parallelus plano incli-  
nato & transiens trochleam *f*. susti-  
net pondus *e*; ita ut dum pondus *e*  
trahit ex sua parte in altum evecturū  
globum, & globus ex sua parte resi-  
stet pondere suo, æquilibrium existat;



Dico pondus ita suffulcitum plano  
inclinato, plus ponderare quàm pon-  
dus in aere suspensum, & sint juxta li-  
neam perpendicularem, ad horizon-  
tem, *f g*, trahit, pondus *c* fore ad  
pondus *e* uti *b f*, ad *f g*. LI.

*Vis ponderis in plano inclinati.*

LI. Imaginemur enim nobis, totum pondus globi istius coacervari in lineam vel baculum,  $a c$ , perpendicularem plano  $b f$ , qui centrum gravitatis in  $c$  habeat sicut & globus, & etiam uti globus plano inclinato insistat in  $a$ . Patet funem  $i c$ , trahi a pondere hujus baculi, sicut antea a globo. Imaginemur adhuc baculum hunc non solum impositum termino  $a$ , sed ibi quasi alligatum, ita tamen, ut ibi volvi possit, tanquam circa punctum fixum, ut inclinet in  $b$ , aut elevetur versus  $i$ . Ducatur horizontalis  $a b$ , & perpendicularis  $c b$ . Considerare possumus  $c a b$  instar trutinæ cujus centrum est  $a$ , brachium alterum  $a c$ , ita ut pondus  $e$  sit applicatum in  $c$ ; & perpendiculariter trahat versus  $i$ ; alterum brachium est  $a b$ , ita ut baculus  $a c$ , applicetur puncto  $b$ , (32) Jam cum pondus  $e$  trahat ab una parte & baculus ab altera, & hæc duo corpora maneant in æquilibrio, necesse est pondus baculi  $a c$ , esse ad pondus  $e$  uti distantia  $a c$  ad distantiam  $a b$ , (25 vel 31.) Sed  $a c$  est ad  $a b$  uti  $b f$  ad  $f g$ , quoniam hæc duo triangula  $a b c$ , &  $f g b$  sunt similia; primò enim angulum rectum habent,  $b$  &  $g$ , & cum præterea  $b a b$ , æquetur ipsi

ipſi  $ahg$ , (geomet. I. ; I.) neceſſe eſt  
& horum complementa  $bac$ , &  $qfg$ ,  
eſſe æqualia. Ulterius liquet, globum  
idem efficere quod baculum ita appli-  
catum. Hinc & pondus globi eſt ad  
pondus  $e$ , uti  $h$  fa ad  $fg$ ; Q. E. D.

*Animad-*

*verſio in*

*quandã le-*

*gem motus*

*propoſitum*

*in Diſcurſu*

*de Motu lo-*

*cali*

LII. Antequam ulterius progre-  
diamur, utile eſt, hic reflexionem  
quandã addere, quæ lumen afferet ad  
rectius intelligendam legem quan-  
dam motus, quæ peregrina viſa plu-  
rimis eorum, qui eam in diſcurſu de  
motu locali legerunt. Poſtquam in  
hoc tractatu id adduximus, quod ac-  
cidere poſſe credidimus corporibus  
in percuſſionibus, diximus §. 32.  
omnia iſta obſervatum iri ſi corpora  
ſibi mutuo occurrentia inæqualia fo-  
rent, licet experientia, uti eodem lo-  
co notavimus, contrarium doceat,  
quonium videmus, parvum globum  
impingendo in majorem, in ipſum  
non omnem ſuam effundere veloci-  
tatem. Hinc evenit, ut plurimi eo-  
rum, qui de his regulis percuſſionis  
egerunt, velocitatem a motu diſtin-  
xerint, & crediderint æqualem mo-  
tum communicatum corpori his ma-  
jori, non niſi his minorem veloci-  
tatem efficere debere. Sicut enim cer-  
ta ſalis quantitas injecta cyathis ad  
dimi-



dimidiâ usque partem aquâ repleto, salsedinem efficit duplo majorem, quam si eadem quantitas injecta sit cyatho pleno; ita hi Viri credunt eandem quantitatem motus distributam in duplo plures partes, & corpus bis majus debere duplo minori velocitate gaudere; & quod ita corpus parvum cum corpori magno, quod offendit, nil amplius quam motum suum omnem communicare possit, non possit ipsi velocitatem suam communicare, quoniam motus hic debeat agere velocitate proportionaliter minori prout in plures partes distributus est, & majori corpori communicatus.

LIII. Ignoro qualem ideam de *Motus non* motu habeamus, dum eundem instar *distribui-*alis consideramus, & ponimus, quod, *tur parti-*si distribuatur in plures partes unius *by corporis,* corporis, ibi aut majorem aut minorem *uti sal par-*velocitatem acquirat instar *tibus aqua* salsedinis, pro ratione multitudinis partium hujus corporis, per quod distribuitur. Non concipio quomodo motus communicari dicetur vel distribuatur, nisi id fiat hac ratione, quod corpus quoddam & omnes ejus partes movemus: Parvus globus non transfundit motum in alterum globum, quem ferit, sed feriendo eum

G

movet.

movet. Id jam in quaestione est, an magno & parvo motum æque velocem imprimere possit; & mihi quoque videtur in suppositione, quam fecimus, & in qua convenimus omnes, corpora tanquam in vacuo absque gravitate, levitate, & alio quocunque impedimento considerari debere; Mihi, inquam, videtur manifestum satis esse, in hoc casu non majori opus esse vi, ad corpus magnum quam ad parvum movendum; nec majorem requiri laborem ad movendas decem partes, quam ad movendas quinque, quoniam nec quinque nec decem ullatenus resistunt. Et certe, quoniam globus feriens alium sibi æqualem, eum movere potest, & dum movet, eidem omnem velocitatem suam communicare: uti omnes in eo conveniunt; si secundum hunc globum consideramus junctum tertio qui nullam novam resistantiam addit, nonne manifestum est, eandem vim quæ sufficit ad movendum secundum globum, si solus esset, sufficere etiam ad movendum eadem velocitate, si juncta sit huic tertio, qui nullam novam addit difficultatem? Verum equidem est, in statu eo, in quo nos sumus, plus laboris nobis esse in movendo lapide magno quam parvo;

parvo; nemo vero ignorat, hoc tribuendum resistantiæ, quam gravitas horum lapidum parit. Si enim magnus lapis non esset gravior parvo, non dubitandum eundem eadem facilitate moveri posse.

LIV. Cartesius affirmat, corpora absq; gravitate a se ipsis hanc habere vim, ut ei loco affixa maneant ubi quiescunt, ita ut non sine labore inde moveri possint; hoc autem concipi nequit. Quomodo enim concipi potest, corpus affigi posse in vacuo ei loco, ubi nihil adest, aut certe nihil firmi & solidi. Ut corpus adhæreat alicubi certe corpus quoddam solidum reperiat necesse est & immobile, cui inhærere possit, sicut anchora navis rupi inhærens. Sed quale medium, quo navis immota adhæreat & figatur in medio maris, in fluiditate aquæ, cui innatat? Quo vinculo corpus, in medio aeris suspensum, ubi ita affigi poterit, ut immotum maneat, & resistat omni isti, quod ipsum loco movere annitatur? Et quod manus est, quomodo nobis imaginari poterimus, corpus adhærescere vacuo, ut immotum reddatur, & resistat omni isti quod id inde trahere allaboraret? Sani vix mihi persuadere possum, hos viros clare concipere, quod

*Quæ Cartesius de resistantia corporum quiescentium habet, rationi contrariantur.*

hic dicunt ii ipsi, qui nihil a se admitti profitentur, quod non possit facile concipi. Sed ne moras diuturniores necesse est, evidenter demonstraturus quam difficilis intellectu sit hæc sententia Cartesii; spero in sequentibus discursus huius de Mechanica evidens fore, plane naturæ contrariam eam esse. In corporibus nullam resistenciam imaginari poterimus, ex eorum parte fortiolem & efficaciorē hac, quam ab ipsorum gravitate proficisci experimur; Interim annitor demonstrare in discursu de motu corporum gravium, quod parvum granum arenæ, dum cadit in lancem trutinæ unam, attollat alteram, ubi sit aliud pondus æque grave, si placet, ac tota Terra, ipsique communicet omnem velocitatem, quam habebat dum descendit; & hæc omnia adeo plausibilia reddam, tot etiam experimentis confirmabo, ut sperem non aliena videri

*Quod par-* quæ in §. 31. præmisi.

*bum corpus* LV. Interim, ut eo utar, quod probavi in hoc discursu de planis inclinatis, considerare possumus pondera homogenea *e* & *c* (fig. aph. L) quæ cum in æquilibrio sint, nihilominus admodum inæqualia sunt, ita ut *c* decies vel centies majus esse possit quam

quam *e*. In hoc casu, si quid licet minimum, addamus ponderi *e*, hoc pondus vincet & descendendo attollet eadem velocitate alterum pondus *c*. Patet ergo corpus hoc parvum *e* non solum movere posse corpus decies & centies majus ipso, sed insuper ei communicare velocitatem suam; id quod sufficit ad demonstranda quæ volui.

LVI. Si loco globi nobis *imagi-* *Corpus pla-*  
nemur corpus planum & superficiem *num super*  
hujus corpus & plani inclinati adeo *plano incli-*  
politam, ut corpus hoc delabatur *nato.*  
absque ulla resistentia; concipere-  
mus, hoc corpus eundem habere  
aisum descendendi, quem habet glo-  
bus; tota quoque differentia, quam  
observamus jam, dum videmus glo-  
bum descendere facilius ac corpus  
planum, inde est, quod superficies  
nunquam adeo politæ sint, quin as-  
peritas quædam remaneat, quæ facit,  
ut unum in alterum impingat, & eo  
ipso aliquantum impediatur in motu.

LVII. Sic in genere ponere possu- *Proportio*  
mus, conatum corporis descensuri *etis descen-*  
in plano inclinato *fb*, (fig aph L.) *dendi in*  
esse ad totam gravitatem, uti per- *plano in-*  
pendicularis *fg* ad planum incli- *clinato.*  
natum; vel sicut sinus anguli incli-  
nationis *fbg* ad sinum totum.


## De Cuneo.

Fig. apb.  
L.

LVIII. Hinc cognoscimus vim cunei; si enim concipiamus totum corpus  $f b g$ , instar cunei, &, cum antea nobis imaginaremur, pondus  $c$  trahi in altum versus  $f$ , nunc supponamus, cuneum trudi versus  $l$ , dum corpus  $c$  inclusum est clatro  $n o$ , in quo ascendere vel descendere potest; evidens est, corpus  $c$  sua gravitate resistiturum & annisurum, ut impediat motum cunei. Hic conatus idem est cum eo quo impedire nitebatur, ne versus  $f$  truderetur, in præcedentibus propositionibus. Patet enim, eandem semper fore resistantiam, siue cuneo immoto corpus  $c$  ascendat in  $f$ , siue corpore  $c$  incluso clatro  $n o$ , cuneus trudatur versus  $l$ . Ita vis sufficiens corpori attollendo versus  $f$ , sufficiet etiam cuneo tradendo versus  $l$ . Ita ut cuneus tanto facilius trudatur, quanto acutior & facies  $b f$  longior in ratione ad basin  $f g$ .

## De Cochlea.

LIX. Vis cochleæ insuper hinc cognoscitur, quoniam cochlea nihil aliud est, quam superficies inclinata, convoluta circa arborem siue axin. Ita imaginemur, corpus, motui superne resistens, applicatum esse in  $h$ , sub primam helicem cochleæ, si tunc  
saltim



faltim cochleam vertamus per dimidiam helicem, faciemus hoc corpus ascendere usque in  $f$ , vis quoque hic adhibenda erit ad resistentiam, uti altitudo  $gf$ , ad longitudinem dimidiæ helicis  $hf$ ; vel, uti tota altitudo cochletæ  $gi$ , ad totam longitudinem spirarum convolutarum cochleæ. Si cochleæ huic vectem transversum  $c$ , jungamus; vim cochleæ augebimus, eo magis, quanto longior hic Vectis, & quanto manus longius ab axe applicatur.

LX. Cochlea etiam paratur, quæ occurrit rotæ dentatæ, eamque vocamus *Cochleam infinitam*. Si enim manubrio quodam vertatur, ipsa rotam maxima vi volvit.

*De cochlea infinita.*

LXI. In omnibus hisce viribus In omni moventibus observandum, motum *machina* perpendicularem, quem ponde- *motus* ra eodem tempore adhibent aut ada-

Si propor- scendendum aut descendendum,  
portionalis semper reciproce proportionalem ef-  
est. se iisdem ponderibus. V. g. in Libra



*bac*, si pondus minus, *c*, descendit per arcum *cC*, eodem tempore quo majus pondus *b* ascendit per arcum *bB*, videmus altitudinem perpendicularem *CF*, esse ad altitudinem *BE* sicut brachium *ac*, ad brachium *ab*; h. e. (supponendo hæc duo pondera esse in æquilibrio) sicut pondus *b* ad pondus *c*; id quod facile introchleis & omnibus reliquis machinis demonstrari potest.

*Principium  
mechanicum de-  
sumptum  
a tempore  
& motu.*

LXII. Quidam etiam exin fecere principium ad demonstrandam rationem omnium virium moventium; & evidens satis videtur, nec plus nec minus virium requiri ad tollendum pondus centum librarum per altitudinem



itudinem pedis, quam unius libræ pondus per altitudinem centum pedum; ita ut pondus unius libræ descendens centum pedes, adæquet ponderi centum librarum emetiens altitudinem pedis unius. Principium hoc quædam continet, quæ menti non adeo perfecte satisfaciunt, ut demonstrationes inde fieri possint. Verissimum nihilominus est, & post demonstrationes datas de viribus momentibus, audacter pro indubitato haberi potest.

LXIII. Hinc ostendi potest, illos *Perpetuum* operam perdere, qui media inquit *mobile im-* runt, perpetuum mobile ope *Stati-* possibile est *ca* conficiendi. Ad hoc certe ne *per Mecha-* cessario requireretur, ut certa corpo- *nicam.* ra descenderent, aliaque ascenderent, ita ut eadem, quæ semel ascendere, etiam deinceps descendant, ac ita motum continuent, successionem & circulationem continua. Manifestum vero est, in ejusmodi casibus id, quod descendit, etiam ascendere debere. Si id, quod ascendere debet, est æquale ei, quod descendere cogitur eodem tempore, impossibile est, motum a se ipso fieri, quoniam pondus æquale hoc modo non potest superare aliud æquale. Si descendens majus est quam ascendens, necesse est velocitatem

citatem descendantium certa ratione minorem esse; ita ut sicut pondus descendens est ad ascendens, ita velocitas ascendentis sit ad velocitatem descendantis; alias successio non poterit esse perpetua, & plus corporis ascenderet quam descendit, vel contra, plus descenderet quam ascendat; & ita machina mox evacuetur. Si vero velocitas descendantis est ad velocitatem ascendentis, in ratione reciproca ponderum vel corporum, æquilibrium existet & nullum commovebitur.

*Exemplum  
demon-  
strans im-  
possibilitatem perpe-  
tui mobilis.*

LXIV. Consultum est adducere aliquod exemplum; Vidi quendam qui hoc modo perpetuum mobile reperisse se credebat. Sit rota quæ libere volvi possit circa axem fixum *a*. In hac rota parvus sit canalis per modum volutæ factus, oriens a centro *a*, & plurimos gyros faciens usque ad peripheriam; postea hic canalis regreditur in semicirculo per *f* *g* usque ad centrum *a*, ubi se iterum oculo volutæ jungit. Cogitemus jam globum plumbeum, vel guttam argenti viri, esse in principio volutæ *b*; hæc gutta sive hic globus sequens inclinationem volutæ, descendet ad inf.






infimum locum, & volvet totam rotam. Postquam rota gyrum egit, & globus descendit in *c*; adhuc alium globum pone in *b*, tunc ambo hi globi adhuc velocius agitantur rotam; & postquam finito gyro secundo ambo globi reperientur in *d* & *c*, pone adhuc tertium in *b*, & deinceps tertium quartum peracto gyro tertio, & quintum peracto quarto. Cum quintus gyros incipit, globus primum immixtus delatus erit in *f*, & si rota continuet motum suum, idem cadet per *g*, & ita ad initium volutæ vel *b*, reveniet & iterum incipiet descendere, & rotam volvere. Homo sic credidit, rotam cogi ut continuet motum suum, quoniam, inquit, adstant quatuor globi, *b, c, d, e* qui nituntur descendere, & rotam volvere cum non nisi unus sit in *f* vel *g* ascendens & resistens motui rotæ. Jam, inquit, quatuor globi facile superabunt unicum. Satis interim liquet, unicum nunc globum ascendentem quater citius ascendere, quam reliqui quatuor descendunt & eandem viam, quam globus emetitur per quatuor circuitos descendendo, confici deinceps ascendendo, per unicum gyrum. Ita quilibet globorum descendantium, tantum quartam partem vis istius adhibe-

hibebit, quam adhibet ascendens, & consequentes hic adæquabit omnes quatuor.

*Hæc demonstratio ad omnia alia exempla applicanda.*

LXV. Exemplum hoc commodissimum est ut intelligamus impossibilitatem motus perpetui; discursus enim iste ad omnia possibilia exempla applicari potest, ubi ascendere faciemus liquorem, aut aliud corpus per gravitatem aliorum ponderum, aut aliarum particularum liquoris descendentes, & qui deinceps iterum ascendere debet a se ipso, ut motum continua quadam circulatione continuet.




*De ponderibus appensis medio funis, aliquati terminis ambo-*

LXVI. Imaginemur nobis funem super duas trochleas *a* & *A* decurrentem, & suis extremis duo pondera *d* & *D* sustentem. Sit adhuc tertium pondus *e*, appensum puncto *B* ejusdē funis inter duas istas trochleas,

omnia

omniaq; ista maneant in æquilibrio, ita ut funis incurvetur in B, faciatque angulum  $\angle B A$ . Ut jam proportionem ponderum metiamur, continue- tur linea directionis  $e B$ , usque ad F. Ducantur F G, F g, parallelæ funibus duobus  $a B$  & A B. Dico pondus  $e$  esse ad pondus D, uti linea B F, ad li- neam B G; idemque pondus  $e$  esse ad pondus D, ut linea B F est ad li- neam B g, & consequenter D.  $a$ ; B G. B g.




LXVII. Ut hoc probemus, imagi- *Demon-*  
nemur lineas A C,  $a c$  perpeadiculari- *stratio* *Si-*  
riter in funes  $a B G$ , A B, cadere pro- *rium* *co-*  
longatas si opus sit. Porro nobis ima- *rum.*  
ginemur unum horum funium. v. gr.  
A B, rigidum instar perticæ ferreæ,  
ita tamen, ut in puncto A volvi pos-

fit, quò eleuetur versus  $AF$ , vel depri-  
 matur versus  $AC$ . Pondus  $e$  appen-  
 sum in  $B$ , deorsum trahet istam per-  
 ticam, & vim ejus metietur linea  $AF$ ,  
 (quam perpendicularem suppono  
 ipsi  $BF$ ) ac si appensum esset ex  $F$ .  
 (32.) Pondus vero  $d$ , alligatum etiam  
 in  $B$  per funem  $Bd$ , elevabit perti-  
 cam, & vim ejus metietur linea  $AC$ ,  
 ac si alligata sit in  $C$ . (32.) Ita duo-  
 bus ponderibus  $e$  &  $d$  manentibus in  
 æquilibrio,  $e$  erit ad  $d$ , uti  $AC$  ad  
 $AF$  (25 vel 32) h. e. uti sinus anguli  
 $ABC$  ab sinum anguli  $ABF$ . Si e-  
 nim  $e$  puncto  $B$  quasi e centro, ducatur  
 circulus per  $A$ ;  $BA$  esset radius  
 s. sinus totus, &  $AC$  sinus anguli  $ABC$ ,  
 &  $AF$  sinus anguli  $ABF$  (Geom. 4. 9.)  
 Cæterum cum  $Fg$  sit pa-  
 rallela  $AB$ , angulus  $FgB$  est æqua-  
 lis angulo  $ABC$ , & angulus  $Bfg$   
 angulo  $ABF$  (Geom. 1. 31.) Jam  
 (geom. 9. 38.)  $FB$  est ad  $Bg$  uti sinus  
 anguli  $FgB$  ad sinum anguli  $Bfg$  h.  
 e. uti  $C.A$  est ad  $F.A$  vel sicut  $e$  ad  $d$ .  
 Eadem ratione probabitur, quod  $e$ .  
 $D::ac.F::BF.BG$ . Q.E.D. No-  
 tandum tamen in fig. seqv. angulum  
 $aBA$ , qui est acutus, æqualem esse an-  
 gulo  $agF$ :  $FB$  vero semper esse ad  
 $Bg$ , uti sinum anguli  $FgB$  h. e. an-  
 guli



guli contigui  $Fg$   $a$ ) ad sinum anguli  $B Fg$ , hoc est, uti  $A C$  ad  $A F$ . Notandum ulterius, nihil referre, an puncta  $a$  &  $A$  æqualiter eleventur; nam ducta  $a F$  vel  $A F$  perpendiculariter in lineam directionis  $B e$ , idem




est quodnam sumas punctum  $F$  vel  $F$ , & quamnam parallelam ducas  $Fg$ ,  $FG$ , vel  $Fg$ ,  $Fg$ . Videmus enim quod, cum parallelogrammata,  $g F G B$  &  $g F G B$ , sint æqualia, latera eorum & diametri semper easdem habeant proportionem, ita punctum  $F$  indifferenter sumi potest, ubicunque velis, in linea directionis, etiam extra perpendicularem ductam ab  $a$  aut  $A$ .

Quam

*Vis hac pro.* LXVIII. Quam magna etiam sint  
*digiosa est.* pondera  $d, D$ , & quam parvum pon-  
*Vide etiam* duse vel  $E$ , hocce tamen sufficiet ad  
*fig. apb. L.* deprimendum funem ab  $a A$ , & ele-  
 vandum pondera  $d, D$ . Semper  
 enim linea  $ae$  tam brevis sumi pote-  
 rit, ut sit ad  $a F$ , uti  $E$  ad  $D$ ; tuncque  
 constructo triangulo rectangulo  $ac$   
 $A$ , pondus deprimet funem usque  
 in  $b$ .

*Impossibile* LXIX. Hinc aliquid notatu dignif-  
*est bene ex.* simum consequitur, nullam sc. con-  
*tendere fu-* cipi posse vim, quæ ita funem trahat,  
*nem.* ut perfecte rectus maneat. Quam  
 enormis enim hæc sit vis, exprimi





poterit magnis istis ponderibus  $d D$ ,  
 funem trahentibus; sed sicut funis  
 ipse pondus quoddam habet, hæc gra-  
 vitas sufficiet, ut incurvetur aliquan-  
 tum funis  $ab A$  & eleventur pondera  
 $d, D$ .

*Situs.*

LXX. Dum corpus  $o n$ , cujus cen-

trum





trum gravitatis est  $e$ , suspenditur per duos funes  $o A n a$ , hi funes ita inclinantur, ut si continuarentur, se intersectarent decussatim in linea directionis  $e B$ . Si enim in prima figura funis  $o A$  producaturs usque in  $B$ , & ibi figatur, patet corpus in eodem situ manere, quoniam directiones nullatenus mutantur. Si quoque funis  $n a$  producaturs usque in  $B$ , & ibi figatur, ille corpus in eodem, ut antea, situ sustinebit. Itaque si funes non duobus punctis  $a$  &  $A$  alligarentur, sed puncto unico  $B$ ; corpus maneret suspensum uti antea, & consequenter centrum  $e$  foret perpendiculariter, sub  $B$ . (22.) Sed in sec. fig. concipere debemus funes productos usque ad commune punctum  $B$ , & rigidos instar perficarum ferrearum, ut sustineant corpus  $o n$ ; corpus enim hoc ita suffulcitum super  $o B, n B$ , maneret, æque ac si sustineretur per funes  $A n, a n$ , ita centrum  $e$  perpendiculariter super puncto  $B$  reperietur; (14) Non immoror probationi, quod funes hi, (dum non paralleli sunt) se decussatim secare debeant in puncto quodam; satis enim liquet, puncta  $a A, o n$ , in eodem esse plano.


*corporum  
appenso-  
rum duobus  
funibus.*

*Vis tractio-  
nis eorun-  
dem.*

LXXI. Corpora hæc suspensa si inclinentur, diversimode funes trahent, a quibus sustinentur; & vim tractionis hujus metimur uti in aphor. 67. sumendo punctum *F* in linea directionis, & ducendo parallelas *FG*, *Fg*. Vis enim ponderis *on*, si exprimatur per lineam *FB*, linea *BG* exprimet vim, à qua funis *oA* trahitur, & linea *Bg* vim funis *na*. Id quod adhuc exprimi potest duobus ponderibus *D* & *d*, quæ erunt ad corpus *no*, uti lineæ *BG*, *Bg* ad lineam *BF*. Præterea considerari possent hæc corpora sustentata tribus funibus, vel pluribus; sed, ut taceam, quod hoc diutius nos remoretur, quilibet ipse omnes hæc reflexiones instituere poterit.

*Funes sus-  
pensi duo-  
bus extre-  
mis ubique  
incurban-  
tur.*

LXXII. Si pondus longum & flexile, (sicut funis) alligatur duobus terminis, incurvabitur iu lineam curvam, modo aliquantulum laxum sit;



Cum enim duo extrema sint *A*,  
gravitas deprimet punctum *b*, sub li-  
neam rectam *Aa*, ut & punctum *c*  
depri-

deprimetur sub lineam rectam  $ab$ , punctum  $d$  sub rectam  $ae$ ; & id de omnibus reliquis punctis imagibinalibus tenendum: id quod efficiet lineam  $adcbA$ .

LXXIII. Hoc pondus  $a b A$  ita *Proprietas tangentium*  
terminis extremis  $a A$  fixis alliga-*hujus in-*  
tum, in eodem situ maneret, si tan-*curvationis.*  
gentes  $ae$ ,  $AE$  ducantur & ipsum  
suspendatur per puncta  $e, E$ . (conci-  
piendæ sunt hæ tangentes gravitatis  
expertes) Funis enim  $ab A$  maneret  
in eodem situ, si imaginaremur par-  
tem  $a C$  esse rigidam, solamque par-  
tem  $C b A$  esse flexilem; licet suppo-  
namus hanc partem  $a C$  ita rigidam *fig. seq.*  
se posse vertere circa  $a$ , ut elevetur  
versus  $a A$ , aut inclinetur versus  $a B$ .  
Si loco partis curvæ & rigidæ  $a DC$ ,  
virga recta ponatur  $a C$ ; totum resi-  
duum  $C b A$  iterum in eodem situ ma-  
nebit, modo interim nobis imagine-  
mur, totam vim, cujus pars  $a DC$  de-  
primit punctum  $C$ , coacervatam esse  
in eodem puncto  $C$ , ope ponderis su-  
spensi per  $C$ , quod deorsum trahit, si-  
cut tota curvam pars  $a DC$  trahe-  
bant: Nihil enim refert an virga su-  
stinens per extrema sua,  $a$  &  $C$ , sit re-  
cta vel curva, vel alterius naturæ,  
modo vis extremitatis  $C$  sit semper  
eadem, uti hic esse supponimus. Pro-  
duca.





tibus, lineæ quoque duæ  $ad$  &  $ac$  concurrant in eadem linea  $ae$ . Sic si suspendatur funis  $ab$  A per tangentem  $e$  a altero extremo affixo in A, omnis dispositio funis eadem erit ac si suspenderetur per extrema  $a$  & A. Ob eandem quoque rationem, situs non mutabitur, si puncto E alligetur per tangentem A E. Sic probavimus, quod erat probandum.

LXXIV. Tangentes continuatæ *Centrum*  
decussatim se secant, in linea dire- *gravitatis*  
ctionis continuata  $Fb$  B 70. & 73.) *corporum*  
ita ut si eleveretur perpendicularis *curborum.*  
puncti communis B offendetur cen-  
trum gravitatis  $b$  funis  $Aba$  (Fig.  
aph. 73. 75.)

LXXV. Putarunt nonnulli funes & *Catena* &  
catenas si alligentur, duobus termi- *funes non*  
nis incurvari in lineam parabolicam. *incurban-*



tur para-  
bolicè.

Hoc vero falsum in catenis, & in funibus, qui haut facile producuntur. Si enim catena composita ex parvis annulis iisque subtilissimis, efficeret figuram  $a b A$ , & ducerentur tangentes per  $b$ , videlicet  $b D$ , & per  $a$ , scilicet  $a D$ , hæ duæ tangentes se secarent in  $D$  in linea directionis  $DC$  catenæ  $a C b$  (per proposit. præced.) Concipere enim possumus, esse catenam fixam in  $a$  &  $b$ : & tunc pars ista  $a C b$  in eodem maneret situ, quo fuit alligata liberè solis extremis  $a$  &  $A$ . Ita centrum gravitatis in catena  $a b$ , erit  $C$ . Si jam linea  $a C b$  parabolica esset, linea  $D C E$  divideret  $a F$  in duas partes æquales, pars vero parabolæ  $a C$  major esset ac  $C b$ : facile ergo demonstratu est, centrum gravitatis in parabola  $a b$  non posse esse in  $C$ .

Quo casu  
filum incur-  
saretur pa-  
rabolicè-

LXXVI. Si vero concipiamus filum absque gravitate, cui infinitæ lineæ parallelæ æquè graves imponantur,  $E C, e c$ ; tunc filum  $a C b A$  perfectè parabolicum esset; centrum enim cunctarum istarum linearum gravium esset in linea  $F b B$  h. e. in medio  $a A$ . Ita tangentes  $a B$ , &  $B$ , se intersecarent in linea  $F b B$ . Centrum quoque linearum inter  $a$  &  $F$  est in linea  $E C$  h. e. in medio  $a$

&  $F$

& *Fc*. Sic tangentes *bD*, *aD* se secabunt in linea hac *ECd*. Imo tangentes *b d*, *c d* se secabunt in linea *ec d*, h. e. in puncto medio inter *E* & *F*. &c. Sed hæc proprietas parabolæ est, geometrisque notum, nullam dari aliam lineam, ubi ea occurrat.


LXXVII. Jam ponamus gravitatem cunctarum linearum parallelarum æqualiter distributam per funem *bolicè* in-rectum *a A*, alligatum duobus extre-*curvari possis*; posseque funem produci tra-*sint*. hendo, & omnes partes deorsum tendere per lineas lineæ directionis parallelas: tunc funis productus revera incurvabitur parabolicè; omne enim pondus quod in *e* *F* erat, erit in *cb*: pondus *Ee*, in *Cc*; *e E*, in *c C*; & *ae*. &c. Sic pars funis *ac* erit longior quam *cb*; quoniam supponimus omnes has partes descendere per lineas parallelas, & consequenter partem & pondus *ae* æquare parti & ponderi *ac*, sicuti etiam pondus *e F* ponderi *cb*.

LXXVIII. Si funis fortiter ex-*Casus par-* pandatur per extrema *a A*, fulciendo *ticularis*, ubique infernè, ita ut gravitas ejus in quo ipsum non possit deprimere, & sic in *nes parabo-* recta linea extendatur; Si deinceps *licè curvan-* fulcra auferantur, gravitasque liberè *tur, & casus*, agere sinatur, funis iste producet *ubi secus*  
ali. *curvantur*.

aliquantum & incurvetur; & curvatura illa erit parabolica. Hoc ex præcedentibus propositionibus sequitur, partes enim fuais hujus non descendentes, nisi vi gravitatis, quæ eas producit, descendere quoque debent juxta lineas directionis, quæ censentur parallelæ, quoniam non producuntur, nisi in quantum eas gravitas trahit.

Casus quo  
funes cur  
vantur Hy

*Casus quo* LXXIX. Si supponamus lineas di-  
*funes cur-* rectionis non esse parallelas, *F*, *E*, *C*,  
*stantur Hy-* *e*, *c*, sed concurrere inferius in puncto



*perbolice* & B, funis productus incurvaretur hyperbo-

hyperbolicè. Si verò lineæ directionis *eclipticæ*, uti  
concurrunt sursum in puncto B funis *in fig. sequ.*  
curvabitur ellipticè, vel circulariter.

LXXX. Ratio est, quoniam *Demon.*  
dividamus æqualiter angulum *ratio.*  
B A per lineam B F, angulum  
B F per lineam B E, & angu-  
lum B E per lineam B c &c. & sup-  
ponamus portiones linearum c c, E c,  
c, F b, &c, utpote æquè graves ful-



iri filo indivisibili; oppido liquet,  
centrum gravitatis omnium linea-  
um, quæ inter a & A sunt, reperiri in  
medio, videlicet in linea F b prolon-  
gata, si opus sit; & centrum earum,  
quæ inter a & F sunt, itidem reperiri  
in linea media, videlicet in E C, &c.

H

Ita

Ita si ducas tangentes per  $a$  & per  $b$ , se intersecantes in  $D$ . punctum  $D$  reperietur in linea  $E$  prolongata versus  $B$ ; Similiter si ducatur tangens per  $C$  intersecans  $bD$  in  $d$ , &  $aD$  in  $d$ , puncta  $d$  &  $d$  reperientur in lineis  $ec$  &  $ec$ , prolongatis versus  $B$ . Jam isti, quibus sectiones conicæ notæ, facile demonstrabunt, has esse proprietates essentielles sectionum istarum; & in genere in omni sectione conica (Parabola, Hyperbole, Ellipsi vel circulo) duas tangentes qualescunque ( $aD$ ,  $bD$ ) se secare in uno puncto ( $D$ ) ita ut ducendo per punctum ( $D$ ) lineam versus focum oppositum  $B$ , æqualiter hanc lineam ( $BD$ ) dividatur angulus ( $aBb$ ) comprehensus inter duas lineas directionis, per duo puncta ( $a$  &  $b$ ) transeuntes, unde tangentes ducebantur. Notandum, in parabola, cum focus oppositus in infinitum distet, h. e. lineæ directionis nullæ

*Fig. apb. 75.* latenus concurrant, sed parallele sint; linea directionis transiens per punctum ( $D$ ) ubi tangentes se intersecant, censebitur dividere angulum in duas partes æquales, eò ipsò, quo æqualiter totum spatium dividet.

*Funes ex-* LXXXI Dicendum ergo funes ben  
*tensi sunt* extensos, & propria gravitate se in  
*revera hy-* curvantes paululum elongando, in  
*perbolici.* curvati

curvari revera Hyperbolicè, & non parabolicè, quoniam revera lineæ directionis non sunt parallelæ sed omnes ad terræ centrum concurrunt.

LXXXII. Hoc superficiebus applicari posset; & facile intelligimus velum superius & inferius alligatum duabus antennis parallelis, vel per latera duobus malis etiam parallelis, si infletur per ventum, incurvari in prisma parabolicum. Videmus quoque linteolum expansum per quatuor angulos, curvari deorsum proprio pondere, & capere figuram convexam. Quod si loco linteoli, imaginemur laminam materiæ cujusdam quæ facilè extenditur, ut ceræ, vel vitri liquefacti, hancque horizontaliter ponamus, super magnum rotundumque foramen, tunc lamina extenderetur in figuram fermè parabolicam.

*Superficies  
extensa, et-  
iam incur-  
vantur &  
convexa  
fiunt deor-  
sum.*

LXXXIII. Forsan hæc usum haberent in opticis quoad specula & per-  
spicilla: hoc enim modo specula vi-  
treæ elliptica, hyperbolica & para-  
bolica confici possent, absque dubio  
facilius. & forsan exactius quam per  
reliquas hæctenus probatas inventio-  
nes. Si enim vitrum bene polium  
& satis gracile, super laminam ferri  
rotundè perforatam poneretur repe-

*Ufus hinc  
derivandus  
applicando  
hæctenus  
dicta optica  
ad confici-  
enda vi-  
tra elipti-  
ca, hyperbo-  
lica & pa-  
rabolica.*

riretur medium sufflandi superne violenter, ita ut afflatus e foramine parvo supernè veniret, (ut è puncto B. fig. aph. 86,) dum flamma vitrum liquefaceret subtus figura ferme elliptica conciliaretur vitro, speculum mirandum in usum microscopii exhibituro. Si loco sufflatus superni, medium reperiretur, attrahendi violenter satis inferne, (ut in puncto B. fig. aph. 79.) vitrum figuram haberet ferme hyperbolicam. Novi difficultates mihi opponi solitas hac de re, sed nihil amplius de iis dicam. Fieri hoc poterit, Deo volente, in Optica, quam publicaturus sum.

*Quadam  
corpora  
rumpuntur  
cum tra-  
hantur,  
quadam  
frangun-  
tur, dum  
flectuntur.*

LXXXIV. Funes, metalla & reliqua, de quibus sermo fuit, corpora, non rumpuntur cum flectuntur, sed solum, si violenter trahuntur. Alia e contrario dantur corpora, quæ dum dura sunt, resistunt tractioni & facile franguntur, si annitemur ea flectere, sicut vitra, lapides & ligna sicca. Ita baculum non franges trahendo in duobus ipsius terminis, franges verò flectendo supra genu. Non prolixè examinabo, unde hoc vinculum, s. combinatio partium sese tam fortiter invicem tenentium, oriatur; Non tam facilis hujus rei demonstratio est, ac credi posset, & licet hæc qua-  
stio




ratio solvenda per Mechanicam nihil  
lofecius de eadem hic non loquar  
quoniam dabitur locus alius, in hoc  
discursu de motu, isque commodior.

LXXXV. Notandum interim nul- *Nullum*  
lum corpus absolutè rumpi unquam, *corpus rum-*  
nisi partes ejus nimis trahantur; si *pitur, nisi*  
jam vitrum resistens tractioni, fran- *violenta*  
gitur, dum illud flectere volumus, in- *tractione.*  
de venit, quod ope hujus inflexionis  
partes convexas majori vi trahamus,  
quam si directè vitrum per duo ex-  
trema trahimus, uti ex sequentibus  
patebit in hoc discursu.

LXXXVI. Hinc reperimus tam pro- *Difficultas*  
digiosam resistantiam in ovo, quod *frangendi*  
frangere cupimus premendo duo ex- *ovum pre-*  
trema manibus ambabus: Quod ad- *mendo per*  
modum mirum videtur rationis igna- *ambo ex-*  
tis, cum testa ovorum tam fragilis, & *crema.*  
facile admodum frangi possit, dum  
alio modo premitur. Ratio hæc est,  
quod cum testa dura sit, non possit  
frangi, nisi flectatur; si jam extrema  
vi premis, testa non flectitur: Ima-  
ginemur enim nobis ovum A B, &  
premiatur, ut duo extrema propius  
ad se invicem accedant: Ut extre-  
num A accedat ad B, & sit v. g. in *a*,  
necesse est duo latera C, D, magis à  
se invicem discedere, uti videmus  
in *c, d*, ita ut totus ambitus, *c d*  
H 3 major


major sit ipso C D, id quod fieri nequit, quoniam testa ovi non potest



diduci, & quam fragilis etiam sit, satis tamen resistere violentiæ trahenti valet. Ita ambitus ovi C D cum dilatari non possit, superficies A C B, A D B, incurvari nequeunt, nec per consequens rumpuntur. Aliter se res habet, si ovum per latera premas, quoniam circuitus ovi ita acceptus, cum non rotundus, sed ovalis existat, figuram mutare potest sine diductione, & ita testa flecti potest, & consequenter frangi


*Vis Columnarum.*

LXXXVII. Ita columnæ fieri possunt ex asseribus ligneis, qui admodum fortes erunt. Si enim conjungantur, instar assularum doliolorum, eosdem




eosdem aliquantulum incurvando, & circulis ferreis circumdando, hæ columnæ cavæ sufficient gravissimo oneri. Videtur Architectos antiquos, aliquantum huc collimasse in compositione columnarum rotundarum & aliquantum tumentium.

LXXXVIII. Concipiamus baculum *Baculus*  
 B Calligatum per terminum superiorem tabulæ immobili, & altero *magis resist-*  
 termino tenentem pondus D. *stis trahentem* Bacu- *ti quam fle-*  
 lus hic magnam habebit vim, & for- *acienti.*  
 san sustinere posset majus onus quam magnus quisque rudens. Nihilominus vis hujus baculi non est infinita, poteritque in D pondus tam enorme poni, ut eandem baculus non amplius resistere possit, & frangatur vi tractionis, sicut rudens. Suppono



pondus D esse maximum, quod baculus sustinere possit, ne frangatur; ita ut si quicquam adjungatur in D, baculus rumpatur. Jam imaginemur eundem baculum esse horizontaliter affixum uno termino muro A immobili, & alteri termino alligari



idem

idem pondus  $d$ ; tunc baculus hic resistere non poterit, sed infallibiliter frangetur. Hoc ut ostendamus, imaginemur baculum hunc affigi in  $A$  vel  $a$  extremo suo  $B$  vel  $b$  ope funis  $AB$  vel  $ab$ , & hunc funem solum esse, qui resistat, vel sustineat totum corpus  $BCD$  vel  $bcd$ : certè dus  $d$  magis funem trahet, si baculus horizontalis, quam si verticalis. Dum enim horizontalis est, libram exhibet, cujus centrum est  $e$ , brachium unum  $eb$  & alterum  $ec$ . Pondus  $d$  dum trahit  $c$ , tanto magis & fortius funem in  $b$  trahit, quanto linea  $ce$  longior est quam  $eb$ . Ita si fiat  $d$  ad  $f$ , sicut  $ce$  ad  $eb$ , pondus  $f$  erit maximum, quod baculus horizontalis ferre potest, ita alligatus, uti supposuimus. Jam facile concipimus combinationem partium baculi ligni inde oriri, quod hæ partes revera colliguntur, non unico fune, sed infinitis parvis filamentis, quæ frangantur oportet, si baculus frangi debet.

LXXXIX. Animadvertendum nihilo- *Quanam*  
minus proportionem dictam, non *proportio*  
posse esse illam, quæ revera in ligno *resistentia*  
reperitur. Positò enim baculum ligne- *baculi in*

*bis duobus  
statibus.*

um horizontalem digitum latitudinis  
& 20. longitudine adæquantem fran-  
gi à pondere decem librarum, rum-  
petur (secundum proportionem da-  
tam) si verticalis, à pondere 400. li-  
brarum. Certum interim, quod, si ba-  
culus horizontalis decem ferre libras  
potest, verticalem posse ferre ultra  
mille & decem millia. Sed in propor-  
tione data, supposui baculum alliga-  
tum ope funis cujusdam, omnemque  
vim solum in extremo *b* vel *B* fa-  
ctam; cum tamen infinita filamenta  
sint, quæ baculum permeant, & ubi-  
que omnes partes vinciunt; ita ut vis  
tractionis non solum sentiatur in ex-  
tremirate *b* vel *B*. sed per totum ba-  
culum distribuatur. Concipiendus  
ergo baculus, non ut solidum quid,  
solummodo affixum in *A* vel in *A*  
per funem *AB*, vel *Ab*, sed ut series  
particularum, 1, 2, 3, 4. similibus fu-  
nibus contexarum, qui funes etiam  
trahuntur à pondere *D* vel *d*; & hoc  
modo funis conferens longè magis  
trahetur, in proportionem, si baculus  
horizontalis; quod non satis consi-  
derasse videntur ii, qui hoc argumen-  
tum pertractarunt;

*Prima hy-  
pothesis, pro  
mensuran-*

XC. Ut adhuc magis intelligantur  
hæ proportionem, cogitemus bacu-  
lum

lum constare ex quatuor parvis æ- *da si bacu-*  
qualibus quadratis, quæ dum ipsa *li trahit in*  
gravia sunt, funem trahunt, qui eadem *longum.*  
ita transfigit, ut alligetur centris ho-  
rum 4. quadratorum, ac si quatuor  
funes diversi essent. Primum & infi-  
mum quadratum dum funem suum 1,  
2, uno gradu virium pro gravitate sua  
trahit; secundum suum trahet 2, 3,  
duobus gradibus, quoniam non so-  
lum sua gravitate eum trahit, sed ad-  
huc primi, quia duo hæc quadrata  
non nisi unum pondus constituunt  
respectu funis 2, 3, quia eadem su-  
stinet. Ita funis hic 2, 3, trahetur  
duobus gradibus. Tertium quoque  
quadratum suum funem tribus &  
quartum quatuor gradibus trahet. Si  
jam cogitemus non esse amplius fu-  
nes distinctos, sed unicum funem, o-  
mnia transfigentē, non nisi extremis  
A & C alligatum; tunc omnes gradus  
tractionis omnibus partibus totius  
funis communicabuntur; ita ut gra-  
dus, quō primum quadratum trahit,  
pandatur per totam longitudinem  
funis totius, duo etiam gradus se-  
cundi quadrati, & tres tertii, & qua-  
tuor quarti. Ita omnes hi gradus  
invicem conjuncti sunt numero de-  
cem in toto fune, qui hinc trahitur  
decem gradibus. H 6 XCI.

*Et ejus, qui  
ad latus  
trahitur;*

*Fig. apb. 78.*

*Progressio  
arithmeti-  
ca, & Pro-  
gressio qua-  
dratorum  
hic occur-  
rentes.*

*Hypothesis  
secunda.*

XCI. Si vero Quadrata hæc po-  
nantur horizontaliter, tunc conjun-  
ctim funem *b c* trahent, ac si suspen-  
sa essent in medio *n*, ubi centrum  
gravitatis est; & sicuti linea hæc a *b*  
usque ad centrum quater major est  
ac *e b*, funis in *b* trahetur ab his qua-  
dratis, vi, quæ erit ad illam in ratio-  
ne quadrupla, qua trahitur in prima  
figura, ubi quadrata verticalia. Ita  
funis quarti quadrati cum trahatur  
quatuor gradibus in prima figura in  
secunda trahetur 16. gradibus. Eo-  
dem modo quadrati tertii funis no-  
vem, secundi 4. & primi uno gradu  
trahetur; omnes hi gradus sibi additi  
faciunt 30. gradus, quibus funis tra-  
hetur.

XCII. Hinc videmus gradus tra-  
hendi crescere arithmetice in parti-  
bus verticalibus, sicut numeri earun-  
dum partium; in horizontalibus  
vero crescere uti quadrata ejusdem  
numeri.


XCIII. Si non in 4. amplius, sed  
in octo partes baculum divisum  
concipiamus tunc cum omnes gra-  
dus tractionis in fune verticali  
sint 36. (id quod est summa nu-  
merorum horum arithmetico-  
rum, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.) gradus  
funis



Funis horizontalis erunt 204. (id quod provenit e summa omnium octo quadratorum, 1. 4. 9. 16. 25. 36. 49. 64.) Unde liquet vim tractionis crescere posse infinite magis in baculo horizontali, ultra terminum, quem regula aph. 88. data constituit, quæ tamen unica quam hætenus Auctores edere.

XCIV. Si ad hæc paulum attendimus, videbimus certe, tam parvam baculi sumi posse partem, ut tantum trahat (imo magis) dum verticalis, quam cum horizontalis. Concipiamus jam partem B 4 vel b 4 (in iisdem fig aph. 88.) eam esse, quæ æqualiter trahatur in utroque positu. Si deinceps baculus prolongetur, usque in C, & c, (iisdem figuris) examinandum erit, quantum trahatur, si horizontalis, & quantum, si verticalis fuerit. Imaginemur nobis baculum constare ex infinite multis partibus, quarum filamenta pergant ab uno extremo ad alterum; ducatur parabola ADG, & tangens AE, parallela axi BD, ita ut AB sit æqualis longitudini partis baculi B 4 vel b 4. Ducatur insuper linea recta ACF, ita ut triangulum rectilineum ACB sit æquale spatio parabolico ADB. Postea sumatur AE æqualis longitudini

*Geometrica  
expressio de  
si baculo-  
rum horum.*



totius baculi  $BC$  vel  $bc$ , & ducatur parallela  $EFG$ : dico triangulo  $AEF$  vim tractionis baculi verticalis representante, ( sicut triangulum  $ABC$  tractionem solius partis  $B$  representat, spatium parabolicum  $AGE$  representaturum tractionem baculi horizontalis.

*Resistentia* XCV. Effectus semper idem erit, eadem, sive sive vis in unico fane coacervata, qui unico fila- omnes particulas baculi contextit, sive per plures funiculos distributa fundunita, sive erit. Facile enim patet, quod si vis s. refi-

resistentia quæ in solo funiculo medio *ab* erat, distribuere per duos *inter plures* funiculos extremitatum *oe*, æqualiter a medio *b* distantes, vel per tres *o*, *b*, *e*, vel per quot libuerit qui tamen æqualiter locentur utrinque supra & infra medium; facile, inquam, patet, pondus *d* superaturum æqualiter omnem resistentiam in medio coadunatam, vel divisam circa medium. Quam enim vim in funiculis superioribus lucramur, recedendo a puncto fulcri *e*, hanc perdimus in funiculis inferioribus, accedentibus eidem puncto fulcimenti *e*.

XCVI. In omnibus præterea sup- *Regula ge-*  
posuimus id, quod vinculum parti- *neralis de*  
cularum hujus baculi constituit, esse *resistentia*  
instar funiculorum qui omnes parti- *omnium*  
culas baculi transfigunt, ita ut funi- *corporum*  
culi hi tracti ab uno extremo, tra- *dari ne-*  
hantur quoque ab altero. Hoc vero *quit.*  
non ita est, & sine dubio filamenta li-  
gantia partes ligni, l. aliorum cor-  
porum frangibilium non procedunt  
libere ab uno termino ad alterum;  
econtrario vero certum est, admo-  
dum breves esse, in quibusdam ma-  
gis, in reliquis minus, prout corpora  
magis aspera, vel minus. Et sicut  
impossibile est hanc longitudinem  
nosse, cujus diversitas infinite mu-  
tat

tat proportiones virium & resistentiæ; haud possibile credo, regulam generalem dare, ut determinentur hæc proportiones in corporibus particularibus.

*Funis distractus  
rumpitur  
in medio.*

XCVII. Nihilominus reflexiones quædam fieri possunt, ut videantur loca, ubi corpora rumpi debent si flectuntur aut trahuntur. Primo, funis distractus vi quadam aliena rumpi debet præcise in medio, quoniam distractione ubique æquali existente, fractio in loco funis debiliori fiat oportet. Locus vero iste est directe in medio; quoniam versus extrema, filamenta alligantur locis istis, ubi termini baculi existunt: ita magis resistere possunt, & fortius insequentia filamenta tenere quæ cum istis primis connectuntur: ita ut hæc secunda filamenta melius vim sustineant tertiis, & hæc melius quartis & ita de reliquis, usque ad media.


*Ubi reliqua  
corpora  
frangantur.*

XCVIII. Eadem ratione, si filamenta partes corporum ligantia illigata sint uti in funiculis, & libere ab uno extremo ad aliud vergerent, hæc corpora distracta etiam in medio frangerentur; quoniam vero hæc filamenta non ita ab extremis ad extrema procedunt, necesse est, corpo-

ra hæc frangi eo loco, ubi violentior tractio, fit, ergo jam inquirendum ubi talis tractio fiat.

XCIX. Si capias baculum in duobus extremis, & flectas, ponens genu inter ambas manus, maxima tractio in medio genu fiet: Manifeste enim admodum, partes illas, quæ in medio sunt genu, in latere convexo, in oppositas partes trahi, alteras dextrorsum, sinistrorsum alteras, cum partes dimidii baculi, ad dextram vergentis, non trahantur proprie nisi uno modo: ita divisio vel fractio super genu fieri debet; cum præterea ibi sit locus, ubi vectis longior existens, majus etiam commodum præbebit.

C. Sic si trabs vel longus lapis *Trabes. Vel*



fulciatur duobus muris B, C, & in medio *lapides ful-*  
*dio*

*citi duo-  
bus extre-  
mis,*

dio A grave onus ponatur, quod tra-  
bem vel lapidem incurvari faciat,  
fractio fiet in medio A. Est enim hic  
libra inversa; & sicut in secunda  
fig. si baculus impositus esset car-  
dini A, & in duobus extremis duo  
pondera æqualia essent B, C, bacu-  
lus hic incurvaretur eodem modo,  
ac si per sua extrema traheretur ma-  
nibus, super genu, & fractio in me-  
dio fieret; ita in prima fig. cum pon-  
dus premat in A, & duo extrema B  
& C immobilia mancant, idem effe-  
ctus sequi debet & fractio in A fieri.

*Trabes l.  
lapides  
pressi extra  
medium.*

Cl. Si jam non in medio A pondus  
(in prima fig.) vel genu (in secunda)  
ponatur, sed in D, majores vires ad  
frangendum corpus C B requirun-  
tur. Nam ut in secunda fig. filamen-  
ta in D jam eadem vi trahantur, ac fi-  
lamenta in A, tunc, cum fulcrum ibi  
erat, oportet vim (punctatam) appli-  
catam supra C tanto majorem esse,  
quanto distantia CD minor est, ita ut  
sicut CD est ad CA, ita sit vis trahens  
cum fulcrum est in A, ad vim (pun-  
ctatam) quæ trahit, cum fulcrum est  
in D. Verum etiam est, tunc vim ap-  
plicatam in B tanto magis diminui  
debere, quanto magis distantia BD  
augeatur; Videmus vero hanc distan-  
tiam

tiam B D augeri non posse ultra duplum, & ita vim applicatam in B nunquam ultra dimidium decrefcere debere, ut æqualiter in D trahat : cum contra distantia CD diminui possit in infinitum, duplo, centuplo & omnibus aliis proportionibus, quacunque volueris; augeri etiam duplo, triplo, centuplo & in infinitum, debet vis in C, ita ut vim applicatam in B adæquaret, & trahat partem D eadem vi qua primum pondus C partes A trahebat, cum fulcrum ibi esset. Unde etiam videmus plus virium adhibendum ad frangendum baculum, cum genu non est in medio duarum manuum, quam cum ibi est. Idem de prima fig. dicendum. Virium harum proportio, ita eundem effectum procurantium, hac ratione exprimitur; Vires C & B (dum fulcrum est in D) sunt ad vires C & B (dum fulcrum est in A) uti rectangulum C A B ad rectangulum C D B.

CII. Si vero baculus, vel trabs, vel *Vis trahi-* aliud corpus, affigatur muro uno suo *um & la-* extremo A, & in altero extremo B *pidum.* prematur, sive imposito onere, sive manu; fractio continget in medio C inter A & B; posito quod filamenta vinculum constituentia illigentur invicem, uti in funibus, alioquin ve-



ro libere ab uno extremo ad alterum tendant, Quoniam vero filamenta hæc non ita ab uno extremo ad alterum tendunt, fractio fiet in medio ultimæ partis versus A, cum ibi maxima sit tractio, tant propter onus maximum ibi agens, cum totum corpus A B ponderosum sit, quam quod vectis ibi longior.

*Corpora  
hæc incur-  
vantur  
parabolice.*

CIII. Pondus vel vis applicata in B, deorsum trahet omnes partes corporis A B, ac si appensa esset cuilibet parti I C D; & cum totum corpus A B, secundum supposita, ubique flecti possit, hic inverso modo fit, id quod in funibus extensis contingit, vel potius in filis alligatis duobus extremis, quibus fulciantur lineæ parallelæ æque ponderosæ, & æque ab invicem distantes, quæ cogant filamenta incurvari parabolice, uti demonstravimus aph. 76. Ita in hoc casu corpus A B incurvatur parabolice, dispositum præpostere ad



ad aliud, uti satis facile probari potest, applicando hīc demonstrationes aph. 76. seqq. & ostendendo, tangentes A F, B F, vel alias quas-  
cunque interfecare sese medio inter  
duo puncta A & B, vel alia, per quæ  
hæ tangentes ducuntur.

CIV. Vide jam propositiones *Regula ge-  
quasdam generales de resistantia nerales de  
solidorum*, quarum demonstratio *resistentia  
geometricæ fieri potest, secundum solidorum.*  
dicta, & unde quilibet infinite  
multa problemata utilia & jucunda  
deducere possit. Supponimus hic,  
majoris facilitatis causa, corpora,  
de quibus sermo, & quæ inter se  
comparamus, esse prismata, quo-  
rum sectiones vel bases sunt similes  
figuræ, nisi in singulari casu aperte  
aliud dicamus. Supponimus etiam,  
nisi in casibus singularibus aliter  
nos explicemus, omnia hæc corpo-  
ra esse ita unita, ut solum in eo ex-  
tremo frangantur quo alligantur, ac  
si retinerentur funibus, qui rumpe-  
rentur vi, qua hæc corpora trahunt.

CV. 1. Si corpora per extremum *Corpora af-  
alterum affixa sunt aque magna, fixa hori-  
nisus, quem adhibent ut frangan- zontaliter  
tur proprio pondere, est in ratione uni termi-  
dupla ipsorum longitudinis. Nam no.*  
si in fig. aph. 88. capiamus totum  
corpus

corpus  $A c$  ab una, & tantum  $A s$  ab altera parte, cujus longitudo e. gr. non sit nisi quarta pars longitudinis  $A c$ ; corpus  $A c$  ager contra  $b$ , ut id frangat, ac si suspensum esset e medio  $n$ ; ubi centrum gravitatis est; & corpus  $A s$  ager, ac si suspensum esset in puncto  $q$ . ubi ipsius medium & centrum gravitatis est. Jam  $A n$ ,  $A 4 :: A c A s$ . Sic igitur corpus  $A c$  fortius ager solum idcirco, quod longius applicatur quam  $A s$ ; & hæc augmentatio actionis s. vis acceptæ ex hoc solo capite, erit uti longitudo  $A c$ , ad longitudinem  $A s$ , h. e. quadruplo major. Cum interim corpus  $A c$  ponderosius sit, videlicet, quadruplo ponderosius corpore  $A s$ , uti longitudo  $A c$  est quadruplo major longitudine  $A s$ ; corpus hoc  $A c$  adhuc majori vi ager, ex hoc capite, secundum eandem rationem longitudinis  $A c$  ad longitudinem  $A s$ , h. e. quadruplo fortius. Sic totum corpus  $A c$  ubique secundum rationem ager bis sumtam, (h. e. rationem duplam) longitudinis  $A c$  ad ad longitudinem  $A s$ , h. e.  $A c$  ager 16. cies magis quam  $A s$ . Et si id, quod corpus hoc in  $b$  tenet, constaret ex funibus, necesse foret funes corpus  $A c$  sustinentes sedecies fortiores esse.

*II. Si*

*II. Si corpora ejusdem sint crassicie, tunc vis sustinens onera, praecidens ea qua propria causari potest gravitas, est simpliciter in ratione reciproca longitudinum, si sumamus longitudinem a loco, ubi affixa, ad locum, ubi onus fulcitur. Si corpus A c sustinere potest in c millenarium pondus, sustinere potest in c quatuor millia citra rupturam; Idem enim onus d positum primo in c, & deinceps in s fortius in c quam in s ager, secundum rationem longitudinis A c ad longitudinem A s h. e. quadruplo magis.*

*III. Si sunt ejusdem longitudinis, vis absoluta ad sustinendum onus citra rupturam ea praecidens, qua proprium pondus causari potest, est in ratione triplicati latitudinis. Uti si corpus A c primum habeat totam longitudinem e o, & deinceps dividatur, nec retineatur nisi latitudo e b, v. g. dimidium; liquet, non adeo fortiter vim sustinere in superficie non nisi hac parva latitudine e b gaudente, quam in superficie, quæ latitudinem duplo majorem habet e o; & differentiam fore sicut superficies istas, five in ratione duplicata latitudinis e b, e o, h. e. quadrupla. Nam sicut quodlibet punctum harum super-*

superficierum  $eo$  vel  $eb$  coadunatum totidem punctis corporis  $A$  ope fibrarum, quasi totidem funiculis tenentibus ibi, major jam superficies ista,  $eo$ , respectu superficiei  $eb$ , tanto etiam fortius affigetur, quoniam pluribus fibris vel funibus alligabitur. Insuper respiciendum ad rationem vectis, cujus centrum est  $e$ , brachium alterum est  $eb$ , alterum, in corpore  $coe$ , est,  $eb$ ; unde sequitur corpus  $coe$ , minus concedere & majus commodum habere, in eadem ratione  $eb$  ad  $eo$  h. e. dupla; Ita tota totius corporis  $coe$  vis ad vim corporis  $cbe$ , erit in ratione duplicata  $eo$  ad  $eb$ , i. e. octuplo major.

*IV. Si sunt ejusdem longitudinis, nisus quem adhibent, ut rumpantur proprio pondere, est in simplici ratione latitudinum.* Si corpora  $eo$ ,  $cbe$  solummodo alligarentur funibus in  $o$  & in  $b$ , necesse esset, funes in  $o$  esse duplo fortiores quam funes in  $b$ . Revera enim totum corpus  $coe$  plus ponderis habet quam corpus  $cbe$ , in ratione dupla latitudinum  $oe$ ,  $be$ , h. e. quadruplo majus. Exemplo vero vectis, cujus centrum est  $e$ , brachium unum  $ce$ , brachium alterum in corpore  $cbe$ , fit  $eb$ ; & nisus corporis  $coe$  minor fit nisu corporis  $cbe$ .

*c b e* in ratione *e o* ad *e b*, h. e. dupla: ita omnis nifus corporis *c o e* erit ad nifum corporis *c b e* simpliciter in ratione *e o* ad *e b*, dupla.

V. In corporibus ejusdem longitudinis, rumpi conantibus proprio pondere, *bis* respectiva, h. e. resistentia, quam præbent, ne frangantur, respectu nifus a gravitate ipsorum prævenientis: vel potius nifus, quem præbet gravitas respectu *bis* resistentis, est in ratione duplicata latitudinum. Absolute enim loquendo corpus *c o e* fortius est corpore *c b e*, in ratione triplicata *e o* ad *b e*, per tertiam propos. hujus aph. nifus vero etiam ponderis *c o e*, adversus *e e*, major est in ratione simplici *e o*, ad *b e*, per quartam propos. Ita vis totius corporis *c o e* comparata cum nifu gravitatis ipsius, est ad vim corporis *c b e* etiam cum nifu gravitatis comparatam, in ratione duplicata *e o* ad *b e*.

VI. In omnibus istis longitudo brachii verticalis veltis sumenda ab hypomochlii puncto extremo (*e*) usque ad altitudinem centri gravitatis superficiem (*e b o*) Ut enim quodlibet punctum hujus superficiem, *e b o*, tenet certa vi, & resistit nifu quem alterum brachium exercet,

imaginari nobis possumus hanc vim cujusque puncti instar ponderis, quod eam trudit versus corpus A tanquam suum horizontem; Ita centrum hujusmodi ponderis esset in eodem puncto, ubi revera verum centrum gravitatis hujus superficiei. Cum vero hoc centrum gravitatis semper reperitur in figuris similibus in distantia quadam puncti e proportionata altitudinibus  $e b, e o$ , indifferenter pro brachiis trutinarum, vel altitudines superficierum, vel distantias a centro gravitatis assumere licet.

VII. In omnibus corporibus, cujuscunque longitudinis, vel latitudinis sint, vis absoluta est in ratione composita triplicata rationis latitudinum, (si sectiones sunt similium figurarum, vel, ubi hoc non obtinet, in ratione superficierum, & in ratione altitudinum usque ad centrum gravitatis) & reciproca longitudinum.

Corpora  
suffulcita  
horizontaliter in duobus extremis.

VIII Corpora suffulcita in duobus extremis, duplo majorem vim habent, ac ista quae affiguntur uno solum termino, licet alias aquae crassa sint & aequae longa.

IX, Regulae praecedentes verae sunt in corporibus suffulcitis, in duobus extremis, respectu vis istius quam

quam habent, quæ portant in medio citra periculum fractionis.

X. In corporibus ejusdem longi. aph. 100.  
tudinis & ejusdem crassitie, quorum quadam portant onus in puncto medietatis A, & reliqua in puncto D, extra medietatem proprio uni extremorum quam alteri; vires ita portandi citra periculum fractionis si a proprio ipsorum pondere abstrahamus, sunt reciproce sicut rectangula segmentorum CAB, CDB (101.)

XI. Unde sequitur, quod si corpus ejusmodi esset figura; ut sectio ab uno extremo ad alterum usque continuata, esset circularis vel elliptica, & sectiones transversæ earundem essent figurarum, ubique æque forte foret. Sectiones enim transversæ semper æquales sunt, vel proportionales rectangulis CDB.

CVII. XII. In corporibus incli- Corpora inclinatis, affixis uno extremorum, vel clinata, suffulcitis utrisque, vires absoluta extremitatum ipsorum sunt uti in corporibus ejusdem longitudinis horizontalis (h. e. terminatis inter duo plana verticalia & parallela,) & quorum sectiones factæ per idem planum verticale, æquales forent.






terioris, ad punctum  $g$  superficiei inferioris, ubi linea directionis totius corporis, ducatur linea recta  $og$ , super ea sit perpendicularis  $ob$ ; dico corpus debere frangi in  $ob$ . Si enim punctum  $b$  imaginemur nobis esse centrum cujusdam vectis, cujus brachium unum  $bp$ , cui insistit totum pondus corporis ( $ac$ ), alterum  $bo$  resistens divisioni; Si quoque aliud nobis imaginemur punctum, qualecunque illud fuerit,  $i$ , sive superius aliquantum s. inferius in eadem superfacie, veluti centrum alterius vectis  $ki$ , si tum semper accidat,  $pb$  majorem habere rationem ad  $bo$ , quam  $ki$  ad  $io$ , h. e. brachium  $i$  majus esse respectu brachii  $ik$ , quam  $bo$  respectu  $pb$ ; verum etiam erit, pondus ( $ac$ ) acturum fortius in vecte  $pb$  quam in vecte  $ki$ . Hoc experimur reipsa; si enim  $in$  ducatur parallela  $bo$ , vel perpendicularis ad  $go$ , semper verum erit quod  $pbbo$  :  $ki.in$ , quoniam tam  $pb$ ,  $Ki$  quam  $bo$ ,  $in$  sunt, uti  $gb$ ,  $gi$  (Geom. 6. 42.) Jam  $io$  est semper major ipsa  $in$ , (Geom. 2. 19) quoniam per hypothesin  $in$ , est perpendicularis: ita  $io$  erit semper major respectu  $ki$ , quam  $bo$  respectu  $pb$ ; & consequenter su-


perficies in  $io$  fortior est, & magis resistit brachio  $ik$ , quam superficies  $b$  o brachio  $pb$ ; ratio ergo in  $bo$  est, quod corpus hoc debilius sit, & inde etiam frangi cogatur.

*Telamo s. Mutulus parabolicus aequae fortis per omnes partes suas.*

CVIII. Ponamus porro omnes corporis partes esse aequae fortes, & aequae divisibiles, in proportionem magnitudinum; jam imaginemur Telamonem, cujus superficies superior sit parallelogrammum  $oC$ , superficies parallela amborum laterum sint parabolicae  $obce$ , quarum axis est  $oc$ , vel  $O$   $C$ , supremum  $c$ , vel  $C$ , applicatae verticales  $oe$ ,  $ab$ ; Hic Telamo aequae fortis erit per cunctas partes, ad portandum onus in extremitate  $cC$ , ut praescindamus id, quod proprium pondus causari potest. Nam si sumas superficiem  $bad$ , brachium  $ba$  in trutina  $abg$  majus erit respectu brachii  $bg$  quam brachium  $eo$  respectu brachii  $eG$  trutinæ  $oeG$ ; & hæc differentia est in ratione subduplicata longitudinum  $ca$ ,  $co$ , h. e. in ratione  $ba$ ,  $eo$ , secundum naturam parabolæ. Cæterum superficies  $bad$  debilior est superficie  $coO$ , in eadem ratione  $eo$ ,  $ba$ . Ita debilitas superficiei  $bad$  cum sit compensata magnitudine brachii  $ba$ , hæc superficies  $bad$ , resistere debet ponderi, quod

Fig. I.






quod ageret per brachium  $bg$ , quantum superficies  $eoO$  resistit eidem ponderi, quod agit per brachium  $eG$ .

CIX. Sic si alius Telamo ambas *Telamo triangularis aequae fortis ubique.* superficies, superiorem & inferiorem habeat, æquales, parallelas & triangulares, superficiesque laterum parallelogrammas,  $oeic$ , ita ut  $oei$  *Fig. 2.*  $c$ , sint verticales; hic telamo etiam ubique æque fortis erit ad ferendum onus in  $c$ . Onus enim ageret contra superficiem  $bad$  debilius multo quam contra superficiem  $eoO$ , sicut  $bi$  est brevior  $ei$ ; sed & superficies  $bad$  minus sustineret, quam superficies  $eoO$ , sicut  $ad$  est brevior quam  $oO$ , h. e. uti *ib. i. e.*

CX. Ita si superficies superior est *Telamo Hyperboli-* planum terminatum per duas Hy-



*cus ubique  
aque fortis.* perbolæ asymptotas  $oaa$ ,  $O dd$  &  
rectam asymptotam,  $ik$ , superficies  
inferior planum,  $eik$ , superficies la-  
terum curvæ factæ per verticales  $a$   
 $b$ ,  $ab$ , &  $d$ ,  $d$ ; hic Telamo etiam æ-  
que fortis erit ubique, ac ferendum  
onus in puncto  $c$  f. tota linea  $ik$ , mo-  
do hoc onus æqualiter extendatur  
ultra citraque punctum  $c$ . Nam se-  
cundum naturam Hyperbolæ omnes  
superficies  $ba d$  parallelæ superficiẽ  
 $eo O$ , semper æquales sunt, & truti-  
næ  $oe$ ,  $G ab g$ , semper similes.

*Pyramis  
horizontalis  
aque  
fortis ubi-  
que.*

CXI. Si vero in fig. 2. aph. 108.  
imaginemur genus pyramidum  $cne$   
cujus sectiones  $nan$ , parallelæ basi  
 $eo O$ , sint similes & sectio verticalis  
 $cne$  sit Parabola, cujus axis est  $c$ ;  
hæc pyramis horizontaliter posita u-  
bique æque robusta erit, respectu ni-  
fus, quem adhibet proprium pon-  
dus. Nifus enim partis  $c an$ , ad ni-  
fum totius corporis  $coe$ , si respicia-  
mus solam gravitatem, est in ratione  
composita longitudinum  $ca$ ,  $co$ , &  
superficierum  $nan$ ,  $eo O$ ; (corpora  
enim hæc  $coe$ ,  $c an$ , semper sunt  
quinta pars prismatum quæ eandem  
basin agnoscunt,  $eo O$  vel  $nan$ , &  
eandem longitudinem  $oc$ , vel  $ac$  &  
consequenter sunt veluti hæc pris-  
mata in ratione composita longitu-  
dinum

dinum  $oc$ ,  $ac$  & superficierum  $eo$   
 $O, nan$ ) Respectu vero vectis, cu-  
 jus centra essent  $n$  vel  $e$ , brachium  
 unum  $na$  vel  $eo$ , alterum æquale di-  
 stantiæ  $ac$  vel  $oc$ , (sive sextæ parti  
 hujus distantiæ, ubi demonstrari pot-  
 est, quod, centrum gravitatis corpo-  
 rum  $c an, coe$  reperiatur nifus par-  
 tis  $c an$  est ad nifum totius corporis  
 $coe$  reciproce uti  $ca, co$ ; Ita. omnis  
 nifus corporum horum tam rationem  
 gravitatis, quam ratione vectis, est  
 in ratine superficierum  $nan, eoO$ :  
 imo & vis, sive resistentia superfi-  
 erum  $nan, eoO$ , est ut superficies  
 ipsæ  $nan, eoO$ .

CXII. Considerare jam possumus *Pyramides*  
 pyramidem verticaliter positam uti *verticales*  
 fastigia turrium, & examinare vim *æque fortes*  
 qua pollent resistendi ventis, & sub- *ubique.*  
 sistendi. Si pyramis quædam est, *F. 2. apb.*  
 cujus sectio per axin sit rectilinea, 100.  
 uti  $ecco$  & abstrahamus a gravitate  
 solummodo vinculum consideran-  
 tes, quod est inter partes, æque ro-  
 busta erit ubiq; ut vento resistat, qui  
 eam dejicere annititur. Vis  $n$ . venti  
 qui afflat totam superficiem,  $oes c$ , est  
 ad vim venti afflantis partem  $asc$ ,  
 sicut tota superficies  $oes c$ , ad par-  
 tem  $asc$ , h. e. in ratione duplicata  
 $oc, ac$ , vis vero etiam tenens su-

perficies  $eo$   $O$ ,  $s$   $a$   $d$ , est uti superficies ipsa, h. e. in ratione duplicata  $eo$ ,  $s$   $a$ , vel  $oc$ ,  $ac$ ; ceteroquin trutinæ  $ceo$ ,  $csa$ , similes sunt, sumamus pro uno brachiorum  $ce$  &  $cs$ , vel tertiam partem eorum, ubi reperitur centrum gravitatis superficierum  $ceo$ ,  $csa$  contra quas ventus fiat.

*Turris parabolica ubique æque fortis.*

CXIII. Si sectio pyramidis per axin est parabola  $cbe$ , cujus axis  $ce$ , hæc pyramis ubique æque fortis erit ad resistendum vento, respectu vis ponderis partium resistentium propriis gravitatibus. Vis enim venti qui totam parabolicam superficiem  $oebc$  afflat, est ad vim venti afflantis parte  $abc$  uti tota superficies ad hanc partem, vel in ratione composita  $eo$ ,  $ca$ , &  $oc$ ,  $ab$ ; Respectu vero ventis, cujus brachium unum esset altitudo  $oc$ , vel  $ac$ , (vel distantia, semper huic altitudini proportionalis usque ad centrum gravitatis superficierum parabolicarum, & consequenter viribus venti,) alterum vero brachium  $oe$ , vel  $ab$ ; nisus venti major esset contra  $oe$ , quam contra  $ab$ , in ratione  $oe$ ,  $ab$ ; ita ut omnis nisus venti, tam ratione magnitudinis superficierum, quas afflat, quam ratio-



ratione vectis, semper sit in ratione composita  $oe$ ,  $ac$  & rationis duplicata  $oe$ ,  $ab$ . Resistentia vero etiam vel vis superficierum,  $eoO$ ,  $b$   $ad$ , est uti gravitas corporum  $boc$ ,  $bac$  h. e. in ratione composita  $oe$ ,  $ac$ , & rationis duplicata  $oe$ ,  $ab$ .

CXIV. Hinc videmus pyramidem  $oe se$ , fortio rem esse inferne versus  $oe$ , quam superne in  $as$  vel  $(as)$  respectu habito ad resistantiam, quam revera causatur gravitas; Si vero pyramis secatur versus cuspidem in  $(as)$  fortior erit versus inferiora & superiora quam versus ullum locum intermedium; & hoc problema sapulchrum est determinare locum pyramidis debiliorem, & ubi ventum eam frangere & deicere possit. Et problema; *Pyramis acuta* ( $aseo$ ) si detur, invenire sectionem ( $sas$ ) parallelam basi  $eoO$ , qua talis sit, ut trapezium ( $as sa$ ) multiplicatum per lineam ductam per centrum gravitatis, perpendiculariter super basi ( $sa$ ) majorem rationem habeat ad segmentum pyramidale ( $as sa$  multiplicatum per basin trapezii, ( $sa$ ) quam omnia alia trapezia facta per aliam sectionem, & multiplicata itidem per lineam


*Locus debili-  
or pyra-  
midis acu-  
ta.*

ductam per centrum gravitatis in basin, ad segmentum pyramidale ortum per hanc novam sectionem, & multiplicatum per basin hujus nobis trapezii. Hoc problema non tam difficile, quam prolixum.

*Applicatio  
regularum  
Staticæ, ad  
motum na-  
vis.*

CXV. Omnes hæc cognitiones, admodum utiles esse possunt in Architectura & reliquis artibus; & si opifices ope diuturnæ experientiæ & boni judicii judicare possunt firmitatem & fragilitatem ædificii & similium rerum: Non dubitandum, si hoc judicium & diuturna experientia juvetur cognitionibus Mechanicæ, quin multo admodum tutius judicare possint; melius remedia incommodis obortis sint reperturi; majori securitate cautelas sument, & sine dubio inutilibus sumtibus parcent. Discursus hic, qui non nisi generales regulas continere debet, non videtur permittere ut hæc ad casus singulares applicemus; ast non ingratum puto, si exemplo quodam ostendatur usus Mechanicæ in natura explicanda & artibus perficiendis. Subjecti ergo loco motum Navis assumo quæ sine dubio pulcherrimum artis opus. & ubi industria humana videtur optime

Optimè observare præcepta mechanice naturalis.



CXVI. Consideremus ergo navim *Demonstra-*  
*ti* *o* *e*, cujus major antenna *b c* susti- *tio* *sic* *na-*  
 neat velum in eodem situ, dum ventus *sic*, *propulsa*  
 fiat a latere, *n b, z a*. Ducamus per- *benio* *late-*  
 pendicularem in antennam, scilicet *rati*,  
*af &*

$af$  & lineam aliam  $adg$  secundum  
 carinam navis, tertiam  $fg$  parallelam  
 antennæ vel velo. Secundum de-  
 monstrata in discursu de motu locali  
 §. 28. nisus venti pelleret antennam  
 versus  $af$ ; & si navis rotunda instar  
 globi esset, ut indifferenter eadem fa-  
 cilitate in omne latus moveri possit,  
 moveretur hoc casu versus  $al$ , quo-  
 niam ab hoc latere impellitur a ven-  
 to. Sed cum navis longitudo ma-  
 jor sit, quàm latitudo, & facilius mo-  
 veatur in longum carinæ versus  $ag$ ,  
 quam ad latus versus  $al$ , magis  
 decurret versus  $g$  ac versus  $l$ , prout  
 hæc facilitas major erit. Ponamus  
 ergo centies citius moveri in longum  
 juxta carinam, quam ad latus, & cen-  
 ties majori vi opus esse, ut pellatur ad  
 latus ab  $a$  versus  $l$ , quam ut pellatur  
 per puppim  $c$  versus proram  $d$ : confi-  
 ciatur rectangulum  $fñal$ ; sumatur  
 $bi$  centesima pars ipsius  $hf$ ; dico  
 navim ituram in linea  $ai$ . Impressio  
 enim eam versus  $af$  protrudens,  
 concipi potest e duabus composita,  
 quarum una fert in longum carinæ  
 versus lineam  $hf$ , & altera ad latus  
 versus  $lf$  (Mot. local. §. 25.) Cum  
 vero impressio hæc lateralis non  
 nisi centesima parte agere possit,  
 patet

patet eò tempore, quo Navis perveniet ad lineam  $bf$ , non percursum a latere nisi spatium  $bi$ , nempe centesimam partem ex  $bf$ , quam percurrit, si ita liberè excurrisset in hoc latere.

CXVII. Concepere adhuc possumus navem moveri in linea  $ag$ , sicut in plano inclinato; nam in triangulo  $afg$ , navis directè pelletur versus  $af$ , sicut pondus versus horizontem; ponamus non posse moveri ad latus, sed solum in longum carinæ, impulsus eam pellet versus  $g$ , sed cum gradu diminuto, ita ut si vis venti repræsentaretur lineam  $af$ , impulsus non versus  $ag$  ageret, nisi vi, quam exprimit linea  $ab$ , secundum aphor. 51.

Quoniam hic  $ab$  est ad  $af$  uti  $af$  ad  $ag$ ; ita navis iret usque in  $b$  per hanc vim venti  $af$ . Cum interim navis non plane incapax motus lateralis sit, sed suscipere possit centesimam partem istius motus, sumenda esset  $ak$  centesima pars ipsius  $af$ , & ducenda parallela  $ki$ ; nam sic habebimus  $ai$  viam Navis, eòdemque tempore cognoscemus devenisse illuc è spatio  $bi$ .

In hisce non attendimus ad id, quod tota massa Navis, sese exponentis vento, contribuere potest, ut citius

*citius debehatur; ponimus quoque gubernaculum (e) esse prorsus rectum secundum carinam.*

*Mutatio  
obliquita-  
tis anten-  
narum &  
velorum.*

CXVIII. Consideremus deinceps navis & vento in eadem dispositione manentibus, obliquitatem antennæ mutari, & jam esse in  $am$ , acutiorisque angulum cum vento facere. Ducamus  $au$  perpendiculararum antennæ; tunc secundum lineam hanc  $au$ , navis à vento pelletur, (Mot. loc. §. 28.) Ducamus adhuc  $mp, bq$ , perpendiculares vento  $ap$ ; sumaturque longitudo  $au$ , ita ut  $af$  sit ad  $au$ , in ratione duplicatâ ipsius  $bo$  ad  $mp$  denique ducamus  $u d$  perpendicularem carinæ  $ad$ , in qua sumatur centesima pars  $dt$ . Dico navim ituram per lineam  $at$ , eò tempore quò ivisset per  $ai$ , si antenna mansisset in  $ab$ . Si enim ex centro  $a$  circulum ducamus  $bm q$ , perpendiculares  $qs, qr$ , (æquales  $mp, bo$ ) metientur vim ejusdem venti,  $qa$ , qui impetum facit in duas antennas (Mot. loc. §. 24. 25. 26.) & sicut  $qs$ , vel  $mp$  minor est quam  $qr$ , vel  $bo$ , etiam vis venti diminuitur ex hoc solo capite, ea proportionem, qua linea  $mp$  est minor ipsa  $bo$ : Caterum vis venti adhuc diminuitur in eadem proportionem ex alio capite. Si enim antenna est in  $ab$ , pel-

litur

litur per totum ventum qui est inter  $b n$  &  $a z$ ; cum contra, dum est in  $a m$ , non pellatur nisi ventô qui est inter  $m x$  &  $a z$ ; ita hæ duæ vires in eadem diminuuntur proportionè lineæ  $b o$  ad  $m p$ , h. e. in ratione  $f u$  ad  $u a$  quæ sumtæ sunt in ratione duplicatâ ipsius  $b o$  ad  $m p$ . Vi ventijam expressa per  $a f$ , dum antenna est in  $a b$ , vis hæc exprimeretur per  $a u$ , si æqualiter totum motum suscipere posset; sed cum centies facilius secundum carinam moveatur  $a d$ , quam ad latera, movebitur versus  $t$ , secundum antea demonstrata.


CXIX. Hisce considerationibus de *Alia maria* terminari potest obliquitas antenna- *na conside-* rum, ad properandum aptissima; quo *rationes.* obliquior enim antenna versus ventum, eo minus deflectit navis, sed etiam minus properat; contra, quo rectior antenna est ad ventum, citius navis deflectit, ita, ut antenna hac ratione disponi possit, ut tam cito deflectat, quam procedat: imo postquam ad certum angulum deventum noxi-um est, eum magis augere, quia tunc navis minus procederet; hique anguli ope Mechanicæ & Geometriæ perfectè determinari possunt, æque

ac infinita alia problemata magni momenti, marina concernentia : uti, v. gr. Duæ naves si dentur, & ventus flans, determinare tunc Rhombum & obliquitatem aptiorem altera, ad alteram sequendum vel fugiendum. Si incedendum turmatim, determinare obliquitatem, quæ sumenda, & magnitudinem turmarum. Determinare optimam figuram navis, ut velocius incedat vel fortior sit. Id quod inclinatio gubernaculi efficere potest, ad vertendas naves, impediendas ne declinent, & cogendas ut magis contra-ventum incedant. Quare Navis contra ventum incedere possit; licet vela rigida sint uti Chinensia quæ mattis vel floreis constant. Ad quem usque Rhombum venti contrarii progredi possimus sine declinatione. Quale commodum a velis flexibilibus, si inflectantur, (Parabolicè,) existat. Cui usui sint vela latina, demonstrarique potest, vela latina, hyperbolicè conjuncta, quorum malum & Horizontæ asymptota, æqualem vim habere superne & inferne, ut Navis ad latera inclinetur, licet malum infinitè elevetur, vel velum infinitè extendatur undiquaque. Omnia hæc resolvi possunt



sunt hisce regulis Mechanicis; sed explicata sufficere credo proposito meo.

Cum pagina quadam adsint vacuae, & in praefatione mentionem fecerim motus uniformis in Cycloide; motum indicabo quo utor, ut hanc uniformitatem demonstrem; quò videre possim, si Huygenius suam publicaverit demonstrationem, num satis felix fuerim ut consentiam cum tam magno Viro.



# PENDULUM

IN CYCLOIDE.

**E** Circulo *ac b* fit cycloides *d e e*  
*b, w o* est tangens, *d g, e o, co*  
*e w,*

$e o$ , sunt tangentes diversæ. Dico motum ponderis semper eodem tempore per omnes tangentes  $d g, e o$ ,  $e o$  &c. fieri. Nam si parallelis  $d a$ ,  $f e, c p, f m, c p, \Phi m, e n p$  &c. ducantur tangentes  $d g, e o, e o$  &c. erunt æquales & æqualiter inclinatæ ad funes  $b p a, b p$ ,  $b p c$ . &c. in quibus funibus tempus semper æquale est.

Linæ  $g d, g f, g f g \Phi$  &c. continuo parallelæ sunt. Dico motum eodem tempore fieri, per omnes tangentes  $d f, e m, e m, e \mu$  &c. sicut enim tempus totius  $d g$ , ad tempus partis  $d f$ ; ita tempus totius  $e o$ , ad tempus similis partis  $e m$ . Sumamus quamcunq; progressionem harum tangentium, uti  $d f, e m, e m$ , &c. ab una parte; &  $e m, e m, e \mu$  &c. ab altera imaginemur corpus incipiens descendere de  $d$ , moveri per  $d f$ , & deinceps per  $e m, e m$  &c. & aliud corpus primo æquale, incipiens per  $e$ , descendere per  $e m, e m, e \mu$ . &c. Dico hæc corpora mota iri eodem tempore in tangentibus, quæ consistunt ordine progressioni ipsarum simili, v. gr. per 3 ( $e m$ ) progressionis  $d f, e m, e m$  &c. & per 3 am  $e \mu$  progressionis  $e m, e m, e \mu$  &c. Nam propor-

tio

tiones cordarum æquales & æquè inclinatas,  $aP, c p, c p, \pi$  &c. sumamus, & continuemus 3tiam  $c p$  (æqualem ipsi  $e m$ ) donec concurrat cum  $a d$ , in puncto  $C$ . Per punctum  $C$  ducatur circulus  $b C A$ . Si pondus descenderet per  $C c p$ , incipiendo per  $C$ , veniret in  $(c)$  eodem tempore quò perveniret iu  $a$ , si descenderet per  $A a$ , incipiendo ab  $A$ ; & motum continuans versus  $c p b$ , percurreret lineam  $c p$ , eodem tempore ac lineam  $a P$  (facile enim videmus  $p P$  esse parallelam ipsi  $c a$ . Jam notum, pondus viam  $(c p)$  percurrere eodem tempore, siue incipiat moveri per lineam  $C c$ , siue venerit per duas  $a P, c p$ ; ita tempus quod pondus impellit ut percurrat hanc 3tiam,  $c p$ , descendendo per tres  $a P, c p, c p$  idem est cum illo, quò pondus deferretur, in  $a P$ , descendendo per  $A P$ , & incipiendo per  $A$ . Idem vero pondus utitur eodem tempore ad percurrendam 3am  $\pi \pi$  (secundæ progressionis) si incipit descendere per  $c p$ , & motum continuat deinceps per  $c p, \pi \pi$ ; producendo enim  $\pi \pi$ , offendet circumulum  $A C K$ , in linea  $P c K$ , quod facile demonstratu. Ita tempus per  $K \pi$ , est æquale tempori per  $A a$ , & tempus per  $\pi \pi$  tempori per  $a P$ .

Inde


Inde sequitur, si sumatur progressio terminorum infinitorum  $df, em$ ,  $em, en$ , &c. procedens versus inferiora cycloidis  $b$ ; motus ibi fiet semper eodem tempore, quo etiam tempore corpus incipiat descendere. Et sicut termini hujus progressionis tam parvæ esse possunt ac velis, ita ut primus  $aP$  vel  $df$  modo millesima pars sit, vel centesima millesima, vel centum myriodena pars diametri  $ab$ ; patet omnes hosce terminos progressionis, cum sint tangentes infinite minores cycloide, haberi posse pro ipsa Cycloide, & ita motum per cycloidem semper eodem fieri tempore, a qualicunque puncto corpus descendere incipiat. Si velimus, hæc ad demonstrationem veterum reduci possunt; nam motus qui fit in hisce tangentibus quæ ita inferne tendunt,  $df, em, en$  &c. semper brevior est isto, qui fieret per Cycloidem  $deee$  &c. licet multiplicando terminos progressionis, infinite accedamus æqualitati; sed &, si tangentes, sint ductæ sursum  $en, em$ , &c. motus ibi erit majori tempore quam in Cycloide.


Pondus suspensum in puncto  $d$ , per funem duplicem diametri  $ab$ .

truti-

trutinas inter duas cycloides similes  
*de e e*, & *d E E*, infra describet &  
cycloidem totam, æqualem & si-  
milem superioribus, & omnes vi-  
brationes tempore fierent æquali.  
Nam semper *e o*, *e o* (vel *e b*,  
*c b*) est dimidium residui  
Cycloidis *e b*, *e b*.

*Finis de Viribus  
Moventibus.*





DUÆ  
MACHINÆ

*ad facillimè conficienda*

HOROLOGIA

GALLICO IDIOMATE

DESCRIPTÆ ET EXPLICATÆ

*per*

P. IGNATIUM GASTONEM

PARDIES, SOCIETATIS JESU;

In

LATINAM LINGUAM

TRANSLATÆ.



## PRÆFATIO.



*D*ifficultas, quam  
experimur in  
conficiendis ho-  
rologiis Solari-  
bus, & in tediosa diversarum  
operationum prolixitate, quæ in-  
stituenda sunt communem me-  
thodum adhibenti, delectamen-  
tum nobis ordinariè adimit,  
quod aliàs ex studio tam curio-  
so tamque utili proveniret. Hinc  
non satis aestimari possunt inven-  
tiones praxès hæc faciliores  
reddentes. Duas en Machinas  
ad hoc propositum admodum  
commodas, quoniam iis median-  
tibus unius hore spatio ratio  
quævis horologia conficiendi di-  
sci potest, ea quoque, quæ didi-  
cimus ludendo quasi exercere;  
Et fa-



Et facillimè omnis generis horologia in muris Et in conclavibus describere possumus.

Non cogitandum autem, usum instrumentorum horum operationem mechanicam esse, ubi cæco impetu agamus, quid agamus nescientes. Quantum ad operationem, praxis simplicissima Et certissima pro doctissima Et omnium maximè geometricâ tenenda est; Et puto admodum difficile esse, cum minore labore aut majori certitudine, sine harum machinarum ope quicquam in hoc negotio efficere. Sed si de Theoria addiscenda agitur horologiorum, eandem melius, quam ope harum duarum machinarum addisci posse non credo, utpote quibus faciliè monstratur ratio omnium operationum, proportio linearum horariarum, Solis cursus, sectiones

*arcuum signorum, verbô tota  
scientia gnomonica,*

*Descriptio harum Machina-  
rum è libro quodam latino, cui  
Titulus: Horologium Thau-  
manticum, desumpta. Est Ho-  
rologii genus, quod ideo Thau-  
manticum appellatum, propter  
Iridem artificialem, aut arcum  
cœlestem, quæ in conclavi expan-  
sa, diversas ibi horas designat,  
signa idem zodiaci, gradus alti-  
tudinis & omnia quæ notare in  
Horologiis possumus, cum aliis  
particularitatibus tantò curio-  
sioribus, quanto magis huic ho-  
rologiorum generi peculiares  
sunt, cum nihil adhuc iis simi-  
le in lucem ediderint vel exa-  
ctissimè has res pertrahentes.  
Quôvis momentô cognoscuntur  
in iisdem loca terræ solis lucem  
habentia vel noctis tenebris im-  
mersa. Uno statim intuitu ocu-  
li loca illa videntur ubi Sol actu  
oritur*

*oriatur vel occidit. Regiones inibi  
notantur longissimâ die & etiam  
noctē longissimâ gaudentes; loca  
ista ubi perpetua nox aut dies  
continuus, secundum Polos di-  
stinguuntur; horæ item Italica  
& Babylonica, magnitudo cre-  
pusculorum, longitudo diei vel  
noctis. Nova hæ horæ tam inge-  
niose Lugduni inventæ unicâ li-  
nea ibi representantur. Signa  
ascendentia & descendentia, Vo-  
mus cœlestes & reliqua adeo  
quæ turbarent communia horo-  
logia, hic absque confusione &  
tanto ordine videntur, ut adspe-  
ctus ipse satis jucundus.*

*Occasionē hujus horologii,  
quod antea nondum apparue-  
rat, aliud describitur, affinitatem  
magnam cum hocce habens, &  
quod in globo describitur, ubi  
absque stylo ullo umbra globi  
ipsa omnia ista notat, quæ in hoc  
horologia ita antiquo viden-*

tur: ita ut quicquid per confine umbra & lucis sit, totum globum dividens; hoc in altero per arcum cœlestem conclave intrantem & illud dividentem efficitur.

Quoniam talis artificialis arcus cœlestis quadam admiranda habeat, in id incubuimus in hoc libro, ut daremus media aliquot eum conficiendi; Forte & isti qui Dioptricam amant hic quadam offendent, quæ erunt ipsorum palati, aut ad minimum eosdem excitabunt, ut inquirent in ea, quæ jam deteguntur, quo ea, quæ hic inchoantur quæque magni sunt usus, magis magisque perficiant. Tandem in hoc libro medium proponitur focos sectionum conicarum inveniendo, describendis arcubus signorum in horologiis interveniens. Dudum jam has lineas ope certe fidei describendi inven-

tio cognita; sed inventum hoc  
 in describendis horologiis admo-  
 dum utile, inutile hactenus in  
 praxi fuit, ob permagnam dif-  
 ficultatem focos inveniendi, b. e.  
 puncta ubi filum alligandum:  
 sic ut signa citius methodo or-  
 dinariâ describi possent, licet  
 longâ quam vel calculo, vel alia  
 operatione punctum horum fo-  
 corum inveniri. Propositio ergo  
 generalis hic datur, & geome-  
 trica demonstratio, quâ mo-  
 diante facillimè foci hi in qua-  
 vis sectione reperiuntur, cum non  
 nisi due lineæ parallele ad duas  
 alias jam datas ducende,  
 veniant.



## Machinae duae ad conficienda horologia facilimo negotio.

### *Descriptio prima Machinae.*

I.


*Vide Fig. primam.*

**P**rima haec machina ex ligno conficitur, licet melius ex orichalco aut aliò molliori metallò conficiatur. Tres habet partes principales. Prima est pene quadrata tabula satis spissa & bene complanata; *planum horizontale* appellamus, quoniam in praxi horizontaliter sive ad regulam ponendum.

2. Ad angulum hujus *Plani* datur fibula quaedam benè tornata, in qua secunda pars, quam *Planum Meridionale* vocamus, quod in fibula sicut axi verti debet, ita ut semper cum horizontali plano ad angulum rectum consistat.


3. In latere hujus *Plani* plumbum, regulæ vicem subiens.


4. Planum hoc idem duabus constat partibus; ultima *Quadrans* vocatur











catur, quoniam quarta pars circuli in nonaginta gradus divisa; Altera *semicirculus* est, ita quadranti applicatus, ut inclinando verti possit, quo velis. Diameter hujus semicirculi vocatur *Axi*; & centrum simpliciter instrumenti *centrum*, sicut filum inde oriens vocatur *filum centri*.

5. Tertia pars circulus est viginti quatuor æqualibus constans partibus, quarum quævis in duas vel quatuor alias dividi potest. Circulus hic ita plano meridionali jungitur, ut semper cum eo angulos rectos constituat, licet locum mutare & diversas situationes recipere possit; Una facies circuli *superior* dicitur, *inferior* altera.

6. In semicirculo videntur menses certo modo notati. Qui non nisi praxin observant. non multum laboris impendant, ut noscant, quomodo signa hæc aut menses notaverim, quoniam instrumenta perfecta invenientes & signata, iis uti possunt ad facienda horologia, secundum usum in sequentibus explicandum.


7. Qui vero adhuc instrumenta ipsi signare cupiunt, hoc uti possunt modo. In axem *a b* ducitur perpendicularis *a c* æqualis semidiametro circuli, Fig. 2.

K 5 culi,

culi. Ex  $b$  tanquam centro circulus fiat  $ac$ . Ab utraque parte ex  $a$  ad  $c$  viginti tres gradus  $30$ . sumantur. Duc jam rectas lineas  $be, ce$ , axem secantes in  $f, f$ , & habebis in duobus hisce punctis  $f, f$ , loca duorum tropicorum, ubi notes signa *canceri* & *capricorni*. Posthac ex centro  $a$  ducatur circulus  $af$ , qui dividatur in duodecim aequales partes, & ducantur lineae parallelae per divisiones oppositas, quibus reliqua zodiaci signa notantur in axe, uti videmus in figura. Utilius autem videtur menses inscribere axi sicut signis respondent. Sex ex iisdem lateri orientali & occidentali totidem inscribenda. Signa ipsa inferius aliquantum in semicirculi facie poni possunt.

8. Supra axem, gradus notantur servientes ad describenda almicantarrata in Quadrante, eaque ita notantur. Circulus  $ac$  in gradus suos dividitur, per singulos, aut decimum saltem quemcunque lineae ex  $b$  ducuntur, quae axem in  $bb$  dividunt; ita ut distantis  $ab, ab$ , paulo inferius transportatis gradus descripti sint usque ad  $44$ . aut  $45$ . cum semicirculus non plures continere possit. Sed si  $ik$  axi parallela ducatur, ita ut  $ib$  sit quarta pars

3





*Fig. 4.*

pars lineæ *ab*, distantia *ik*, *ik* in lineam *ll* transferri possunt, per parallelas *kl*, *kl*; & ita gradus habebis 70. & amplius. Commodum est ponere gradus minores in orientalem partem semicirculi & majores in occidentalem.

*Uſus prima Machine*

PROBLEMA I.

*Horologium ſolare in quavis ſuperficie deſcribere.*

I.

**P**ONE tabulam firmam & immobilem ad murum, aut aliam superficiem, cui horologium inscribendum, ita ut spatium aliquod superſit inter superficiem hanc & tabulam, fermè magnitudinem ſtyli futuri æquans. In limbo tabulæ *Planum horizontale* instrumenti perpendiculariter ponatur, quod ope plumbi in *plano meridionali* efficitur. Nam ſi plumbum ſemper ad normam deſcendere vides in linea tergo plani meridionalis inſcripta, dum planum hoc quaqua verſum voveris, planum horizontale perpendicularare eſſe, certus eſſe poteſ. Sed ſi plum-

bum lineam transgreditur, id indicio est, planum in illam partem vergere, itaque levare illud & probe firmare oportet, quando ad normam componitur.

2. Pone Semicirculum super quadrante suo, ita ut parvus index qui est in medio peripheriæ, respondeat gradui elevationis poli sicuti gradus in Quadrante notati sunt. Postea pone Circulum super Plano meridionali, ita ut una superficierum suarum centrum tangat, attamen non tegat. Observandum autem in sex mensibus brevium dierum, Superficiem superiorem tangere debere centrum, in reliquis autem inferiorem; insuper circulus hic ita ponendus, ut cum axe rectum constituat angulum; quod fiet, si circuli superficies in eadem linea cum linea *Arietis* & *Libra* est in semicirculo.

3. Sole splendente, verte in fibula sua Plenum meridionale cum Circulo suo, ita ut membra circuli præcisè cadat in axe super gradum signi aut super diem mensis in quo sumus illo ipso die, quo operatio instituitur; & si ponatur instrumentum, uti debet poni, tunc Planum Meridionale respondebit meridiano celesti




coelestis, *Axis* axi, *Circulus* æquatori.

4. Extende per totum axem *filum centri* donec murum attingat recta linea, sive superne versus polum arcticum, sive inferne ad Antarcticum. Punctum muri, quod filum ita extensum attinget, erit centrum horologii, in illudque omnes horarum lineæ definient, sive id in ipsa figura sit, qua horologium sit circumscriptum, aut longius ab ea recedat. Insuper, filum hoc ita extensum situm styli denotabit, aut acus horologii. Si enim virgam ferream muri eodem loco applicas & eodem situ, ubi est filum hoc, virga hæc inserviet loco styli & umbra sua denotabit horas. Si stylus iste longiori intervallo vergat in murum sicut sæpius accidit, nimis difficile imo impossibile erit tam longam affingere virgam; & in hoc casu sufficit alium adhibere stylum, cujus finis s. extremum tangat axem aut filum per axem extensum, in aliquo saltim loco. Huic etiam stylo figura quævis dari potest, e. gr. *Serpentis*, *Avis* &c. Modo enim rostrum aut extremum ejus tangat filum, umbra ejus extremitate sua denotabit horam.

5. Horæ diversimode notantur. Prima hæc est ratio; instrumento sic posito, accipe filum centri & extendende illud, ita ut transeat per singulas horas circuli, gradatim; & designa in muro puncta, ubi filum ita expansum, quamlibet horam transiens definit. Nam ducta linea e centro Horologii (quod est punctum muri ubi filum per axem transiens definit,) per singula puncta, lineæ omnium horarum ductæ erunt, & per consequens totum horologium perfectum. Si centrum vero nimis longe in murum abit, aut plane non, sicut accidere potest, utere. - -

6. Secunda ratione. - Instrumeto posito sicut supra accipe aliud filum, quod extremo axis *i* adstringas, duc illud per horam quandam circuli e. g. *r*, replica illud extendendo per axem aut super filum axi superintensum, ita ut filum hoc *c* bene expansum, simpliciter axem tangat, aut filum means per axem, in *b*, & deinceps in *f*, aut alio quovis loco, & ut puncta ubi filum ita extensum definit in muro sint *g* & *e*. Tunc solum ducatur linea *g e*, quæ erit hora denotata in *e*. Hora hac ita notata *c*, pone filum de loco *c* in aliam horam, & simili operatione

ad pag. 231.





tione omnes horas Horologii notabis.

7. Tertius modus noctu fit. Pone candelam ita ut umbra axis meet per horam quandam circuli. Tunc umbra axis ejusdem aut fili per axem extensi, eandem horam in muro denotabit, & non nisi creta ducatur per umbram hanc necesse est. Posthæc transponens lumen, ita ut umbra per aliam horam eat, eodem modo in muro notabis eam. Et sic in reliquis.

8. Quarta interdū ad solem efficitur, ope speculi, ita locandi, ut umbra axis eat per horam quandam circuli; tunc enim eadem hora in muro lineam horæ hujus describit. Ultimæ hæ duæ rationes sunt excellentes, imprimis si locus horologio destinatus non satis planus.

## PROBLEMA II.

*Signa Zodiaci & Festa anni designare.*

I.

**L**Inque instrumentum in situ suo, tende filum centri per superficiem circuli, & filum hoc in diversis punctis muri desinens, ibi lineam æqui-

æquinoctialem notabit, ubi esse debent signa *Arietis* & *Librae*, postea pone circulum in signum *Canceri*, (semper ad angulum rectum cum axe) extende jam filum centri, successive illud transire faciens circumferentiam circuli; & hoc modo signum *canceri* in muro denotabis, si deinceps circulum super quodvis signum ordine pones, simili modo omnia Zodiaci signa notabis.

2. Ita si circulum ponas in diem mensis in quo est Festum aliquod immobile, e. g. 15. Aug. 24. Junii, aut alium, eodem modo in muro describes lineam, trahens filum circa peripheriam circuli, & umbra styli in lineam hanc cadet, toto die hujus festi.

3. Ut autem in muro diversa puncta commodius describi possint, in quæ definit filum, utile erit adhibere acum ex orichalco, argento aut ebore aut alia molli materia confectam & per foramen *a* hujus acus ducere filum, donec plumbum extremo filii *b* appensum, illud semper extensum teneat. Tunc enim facile movebitur filum, & certius notabuntur in muro tot puncta quot velis.

PROBLEMA III.

*Signare Azimuta & Almicantarata.*

I.

**Q**uadrantem linque in situ suo, & verte semicirculum, ita ut axis ejus erectus sit versus punctum verticale. Applica jam circulum quocunque loco libuerit, modo ad angulum rectum, & notabis Azimuta eodem modo ac horas, cum axis inclinatus esset. Nam filum in quavis gradum circuli aut decimum vel decimum quintum quemcunque ponens, & per axem ducens, diversa puncta in muro denotabis, ubi filum desinet.

2. Quoad Almicantarata, pone circulum in gradum quendam lineæ Z, sub axe, e. g. in decimum, duc jam filum centri circa perimetrum uti dixi in signandis arcubus signorum, & hoc modo lineam curvam in muro notabis, quæ erit Almicantaratum, vel gradus elevationis super Horizontem, qui est notatus in loco ubi circulus positus est, id est decimus. Et quando extremum umbræ cadet, in hanc lineam, hoc denotabit Solem tunc super Horizontem elevatum

tum esse decem gradibus ; postea pone circulum in 20. & 30 gradum, & reliquos, & ita omnia Almicantaria describes usque ad 45. gradus ferme. Sed ad describenda illa quæ sunt ultra 45. alio parvo circulo opus est, qui quartam saltem partem hujus circuli adæquet, & qui etiam jungi possit semicirculo. Nam hunc circulum parvum in parvos gradus ponens, denotare poteris in muro ac 70 gradus, quod omnino sufficere potest, cum Sol nunquam tam alte adscendat in Europa.

#### PROBLEMA IV.

##### *Denotare Domus cælestes.*

**D**Eprime semicirculum, ita ut plane decumbat & axis Horizontalis sit. Pone circulum in Medio, eumque inclina, ita ut una superficie tangente centrum, circumferentia respondeat gradui elevationis Poli, in Quadrante. Tunc tende filum juxta axem usque ad murum, & habebis centrum, ubi omnes lineæ domuum cælestium se intersecabunt. Si deinceps filum tenditur per horas, quæ numero pari constant in circulo, 8, 10, 12, 2, 4, 6, de-



describes domus cælestes eodem modo quo horas astronomicas descripsimus.

### PROBLEMA. V.

*Horas Italicas, Babylonicas & Judaicas describere.*

I.

**T**ropicis & Æquatore secundum probl. II. notatis, non multum difficultatis occurrit in his horis describendis, quoniam quælibet earum Æquatorem transit in eodem puncto, cum hora astronomica, ita ut ibi jam punctum sit ad quamlibet horam pertinens & aliud tantum restet querendum, quod sit in alterutro tropicorum, hæc modo.

2. Linea horizontalis inter Tropicos, a parte orientis est 24ta hora Italica & a parte occidentis 24ta Babylonica: & utrinque eadem horizontalis, est 12ma Judæorum. Si itaque capias locum tropici cujusdam, ubi Horizontem fecit & numeres in eodem tropico horas singulas, habebis ibi punctum pro qualibet hora Italica & Babylonica. E. g. observans, Horizontem, secare tropicum *Canceri* circa hora vespertinam septimam & tres quadrantes cape punctum in hora  
præ-

præcedenti, i. e. in 6. & tertia quadrante, & hoc erit punctum, quod permeabit 23a hora Italica; ducens igitur ab hoc puncto lineam versus punctum Æquatoris, ubi 5ta hora astronomica est, habebis totam lineam 32æ horæ Italicæ. Deinceps duc aliam lineam a puncto 5tæ horæ & tertii quadrantis tropici hujus ad quartam horam æquatoris, hæc dabit 22am horam Italicam &c.

3. Eodem modo advertens, horizontem a parte occidentis circa quartam & quadrantem, secare Tropicum, accipies horam sequentem in eodem tropico, h. e. 5. & quadr. & ab hac ad 7am Æquatoris lineam duces quæ erit prima Babylonica. Deinceps linea a 6 cum quadr. tropici usque ad 8 Æquatoris ducta erit secunda Babylonica &c.

4. Si Horizon tropicos non secat ad orientem, aut occidentem, scias tantummodo horam ortus, & occasus Solis Diei longissimi & brevissimi totius anni. E. g. cum scias solem oriri die brevissimo hora septima &  $\frac{3}{4}$ , duces modo lineas horarum babylonicarum per  $6\frac{3}{4}$ ,  $5\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{3}{4}$ ,  $3\frac{3}{4}$ , &c. hora-

rarum tropici *Capricorni*, & 7, 8, 9, 10. &c. *Æquatoris*; aut si scis solem oriri circa  $4\frac{1}{4}$  die longissimo, duc lineas a  $5\frac{1}{4}$ ,  $6\frac{1}{4}$ ,  $7\frac{1}{4}$ ,  $8\frac{1}{4}$ , &c. Tropici *Canceri* per 7, 8, 9, 10, &c. *Æquatoris*, & habebis easdem horas *babylonicas*.

5. Similiter sciens solem occidere die longissimo circa  $7\frac{3}{4}$ , duc lineas a  $6\frac{3}{4}$ ,  $5\frac{3}{4}$ ,  $4\frac{3}{4}$ ,  $3\frac{3}{4}$ , &c. Tropici *Canceri* per 5, 4, 3, 2, &c. *Æquatoris* & habebis horas *Italicas*.

6. Quoad *Judaicas*, divide in sex partes æquales horas, quæ sunt post meridiem ad solis occasum vel ortum, hoc est ad horizontem usque, in uno Tropico, & a qualibet harum partium duc lineas per quamvis horam *Æquatoris*, & habebis *Judaicas*: ita ut linea meridionalis semper sit 6ta hora *Judæorum*, & quæ transit per primam *Æquatoris*, sit 7ma *Judæorum* &c.

*Note.*

1. Si in Horologiis contenti sumus designasse solas horas *astronomicas*, qualemunque adhibere licet stylum

stylum modo ejus extremum tangat aliquot punctum axis. Sed dum signa Zodiaci, aut alii circuli adduntur, necesse est, extremum styli respondere præcise centro instrumenti.


2. Nimis sæpe incommodi est, tanta exstruere tabulata, & adeo firma, ut ei tabula imponi possit, instrumentumque ibi teneri immobile. Melius ergo longe est, pandere lintheum Pictorum, aut chartam magnam in imo muri, in quo Horologium describendum & in hoc panno pro lubitu operari. Horologium enim in hoc panno conscriptum, transportari potest, ex scala quadam, in summum muri inque locum a murariis præparatum; applicando itaque illud in eodem situ, quo erat infra murum, penicillo quodam omnes horæ & arcus, ita ut in panno ductæ apparent, pingi possunt. Præprimis vero bene observanda dispositio styli prout eam determinavit instrumentum in panno.

---

### PROBLEMA VI.

*Horologium reflexionis in cubiculo facere.*

Optima





I.

**P**ulcherrima horologia sunt horologia reflexionis. In fenestra parvum speculum ponitur, quod radium in conclave reflectit, accipiendo lumen a sole, ita ut radius iste locum mutans secundum solis progressum, denotet omnes horas pictas in conclavi. Hoc genus horologiorum nostro instrumento sic efficitur;

2. Pone instrumentum in fenestra, ferme ad locum ubi parvum speculum esse debet; loca illud in meridianum suum more solito, secundum allata Probl. I. n. 3 & posteaquam ita inveneris situm meridionalem, verte planum meridionale cum suo circulo, ita ut summum axis, non polum borealem, sed Meridiem respiciat. Deinceps operabis in conclavi eodem modo quem præscripti in aliis horologiis in muro conficiendis.

3. Si nonnisi horas astronomicas cupis, speculum horizontale esse debet, ita ut in puncto, quodcunque illud fuerit, axem tangat, ubi filum per axem extenditur. Si vero signa & alios circulos cupis, speculum eo loco

loco positum esse oportet, ubi centrum instrumenti fuit.

## PROBLEMA VII.

*Omni momento horam & altitudinem Poli Regionis invenire ubi degis.*

**A**Dde acum magneticam instrumento, hujus ope Planum meridionale vero meridiano loci super imponi poterit. Postea circulo centro imposito, eleva aut inclina semicirculum, qui portet etiam circulum, donec peripheriæ umbra directe super diem in axe cadat. Tunc parva manus, quæ est in medio limbi semicirculi indicabit altitudinem Poli in gradibus Quadrantis, & eodem tempore umbra axis denotabit horam in circulo; nisi quod crassities Plani meridionalis impedimentum quoddam a nona ad tertiam horam efficiat.

### *Nota.*

**I**Nstrumentum hoc ex orichalco factum absque dubio commodissimum



munum erit quoniam loco plani horizontalis virga ferrea ipsi addi potest, ope cujus instrumentum stylo Horologii alligari potest, qui stylus quam firmitissime muro affigi debet. Hoc in casu autem stylus ex 2 partibus compositus esse debet, ita ut pars A B a parte C D vel prorsus, vel aliquo saltem intervallo mediante cochleâ removeri possit. Si horologium conficere vis, quadrantem instrumenti absque circulo suo & semicirculo ponas oportet, ita ut centrum respondeat directè extremo styli A, & præterea quadrans circumvolvi possit in fibula sua, dum semper verticalis vel horizonti perpendicularis manet. Tunc aufer styli extremum, & junge semicirculum & circulum quadrantis instrumenti, quod jam verti potest quaquaversum, non amplius impeditum stylo, propter ablatum caput styli. Sic volvitur, Sole splendente, ad orientem, & secundum dicta Probl. 1. n. 3. seqq. operatio instituitur. Horologio confectò instrumentum auferitur & caput styli in locum suum restituitur.

*Descriptio secunda Machinæ.*

I. Machina hæc est certa Lucerna,

L


ex

ex ferro albo vel chartâ densiore  
constans, sub cylindri formâ, Vide  
Fig 6: )  $g b d$  est lamina circularis, vel  
magnum circuli segmentum, sicut  
& lamina opposita  $f e$  quæ est se-  
gmentum parvum, ita ut hæc duo se-  
gmenta sibi addita circulum totum  
constituant. Punctum  $b$  est centrum  
circuli  $g b d$ , per quod axis cylindri  
transit;  $g b f f$  est lamina, cujus me-  
dio foramen  $a$ , centrum instrumen-  
ti, inest. Arcus  $i o, m p, l q$ , &c. sunt  
arcus signorum. Lineæ rectæ pa-  
rallæ sunt horæ. Omnes hæc lineæ  
hoc modo signantur.

2. Totus circulus cylindri, h. e.  
peripheria  $g b d$ , in 24. partes divi-  
ditur æquales, & inde parallæ  
ducuntur, quæ sunt horæ, ita ut linea  
per altissimum punctum  $d$  &  $e$   
transiens horam duodecimam s. me-  
ridiei denotet.

3. In medio semicirculus  $i o$  circa  
cylindrum ducitur, qui erit *Æqua-*  
tor. Perpendicularis  $i k$  semidia-  
metro  $b d$  æqualis ducitur Ex  $k$  tan-  
quam centro circulus describitur, in  
cujus utraque parte accipiuntur 23.  
gradus 26. ; & per hunc gradum du-  
ctis lineis  $k a, k e$  in meridiano habe-  
bis puncta, per quæ circuli *Æquato-*

6





ri paralleli ducendi, qui erunt Tropici; posthæc facillè puncta reliquorum signorum inveniuntur, secundum praxin datam n. 7. descriptionis primæ machinæ.

4. Utile quidem, sed non absolute necessarium est, ut semicirculus Equatoris præcisè terminetur per inferiorem laminam, eo loco, ubi Equator lineam sextæ horæ secat, & ut lamina eadem cum plano Equatoris angulum regionis, ubi degimus, constituat. Hoc enim modo lamina ista erit Horizon.

*Ufus Machina secunda.*

1. In lapide fenestram excava fossulam rotundam magnitudine semihalterum adæquantem, ut ibi ponas speculum; aut cura confici thecam ferream cum pede infernè, qui lapidi immitti possit, & ibi ferruminari plumbò.

2. Accipe jam lineam meridianam, quæ per hunc locum transit, quod a meridie, sole splendente, facillime fit. Nam si teneas plumbum filo appensum in altera parte fenestram, ita ut umbra filii transeat per fossam excavatam, umbra hæc erit linea meridiana. Commodius adhuc filum ita expansum linqui & in eodem situ firmari potest.

3. Noctu lampadem parvam in fossula colloca, ita ut flamma tenuis sed clara in ipso loco speculi existat.


4. Huic impone Machinam, ita ut flamma lampadis rectè foramini  $a$  insit, quod est centrum, & eodem tempore radius per foramen axis  $b$  means, respondeat filo extenso, aut cuivis alii parti, ubi linea meridiana fuerit. Verbo, oportet Machinam hanc orientalem esse, & ita positam, ut axis verum meridianum loci respiciat.

5. Tunc radius lampadis omnia Lucernæ foramina transiens, fideliter totum horologium in conclavi denotabit, ita ut certò omnia pro commodo tuo depingere possis.

6. Deinceps speculum sume & huic fossæ immitte, ita ut una vice & horam & signum diei notet & momenti, quod aliunde per aliud quoddam horologium cognosci debet. Sic quando vitrum ita positum, mastige firmandum est in hoc situ, aut potius coloribus crassioribus, humectatis oleo nucum quales colores pictores ad deaurandum adhibent, qui benè siccantur, & mirè rem continent, pluvix & calori resistentes.

7. Unum commodorum hujus instrumenti est quod verti possit, quocunque libuerit, ut lineæ horarum, & totum horologium cadant in locum conclavis aptissimum ad eas recipiendas. Cum juxta vulgarem & communem methodum cogamur semper horas ad certum dirigere locum, secundum meridianum, & sæpius accidet, ut locus hic sit minus commodus, & ut horæ per trabes aut alia loca irregularia transeant. Ope autem hujus Machinæ horas quo velis, cadere facies. Modo enim radius *b* cadat in punctum aliquod lineæ meridianæ, h. e. modo axis cylindri sit in plano meridionali, instrumentum erigi aut inclinari potest, ad orientem vel occidentem verti, prout commodum videbitur. Posset quidem etiam disponi, ut radius *b* non transiret per meridianam lineam, sed tunc plus difficultatis aderit in locatione.

8. Simili Machinâ Azimuta & Almicanthata notari possunt. Si enim adhibeas aliam lucernam instar tympani (2. fig.) & ita ponas ut flammâ lampadis in centro *a* existente, radius *c* respondeat puncto verticali Horologii, (quod punctum altero instrumento invenitur, dum



mus in tabula punctum ubi radius  $e$  ejus instrumenti Fig 1. definit) tunc radi per circulos parallelos transeunt in conclavi denotabunt Almicantarata, sic ut  $gfb$  sit horizon; lineæ vero transversales, & deorsum cadentes, denotabunt azimutha, modo lucerna hæc ita locata sit, ut radii pertranseunt unam harum linearum cadant in Meridiana in conclavi designatam. Eodem modo & meridiani diversarum regionum, circuli latitudinis, & tota Geographia signari possunt.

9 Incommodum, quod experimus lampadem adhibentes, hoc est, quod lumen



lumen illud nimis debile fit, ut omnia in pariete vel tabulato vix bene discerni possint, si conclave magnum est, ideo utendum radiis solaribus opæ speculi; quod ita fit.

10. I. Initio affige speculum parvum loco suo, 2. si Sol in illud splendorem mittit, denota tria aut quatuor loca, in quæ radius reflexus cadit tribus diversis horis, in conclavi. Consultum est, ut hoc facias eo die, quo sol in aliquod signum intrat; & minimum una harum operationum fieri debet cum scimus horam certam instare, e. g. duodecimam, decimam, tertiam cum dimidio, &c. 3. Loca instrumentum, ita ut centrum ejus præcise respondeat parvo speculo. 4. Adhibe quatuor aut 5 specula satis magna, (concava meliora sunt) & ita eadem dispone, ut radios a sole receptos reflectant in parvum speculum, quod eos ex parte sua reflectet in peripheriam Laternæ, qui foramina ibi invenientes, in conclave cadent, & satis vivaciter lineas Horarias & signorum denotabunt. 5. Sed cum videmus radios hosce ita laternam transire, illa sic disponenda est, ut radii signum diei percurrentes, in quo tria aut quatuor pun-

Et notavimus, præcise respondeant etiam hisce punctis, & ut eodem tempore radii horæ incidant etiam in punctum tum annotatum, cum ista hora esset.

11. Hoc instrumentum in primis aptum ad conficienda Horologia in muris & alibi: Sed in hunc finem minus sit oportet, & etiam levius quam ad horologia reflexionis; adhæc, oportet invenire medium, illud stylo jam muro infixio affigendi, ita ut caput styli in centro instrumenti reperiatur, quod non adeo difficile factu est. Insuper ita locandum est, ut radii solares, per rimam horæ duodecimæ transeuntes, respondeant lineæ meridianæ jam muro inscriptæ, & ut eodem tempore radii signi etiam tribus aut quatuor punctis respondeant, quæ in die signi illius notata erant. Si sol non cadit a meridie in murum, utendum aliquo alio puncto alia quadam hora notato, de qua certi sumus facti vel per aliud horologium vel alia via.

12. Notandum quod dum conficimus horologium Reflexionis, instrumentum ita ponendum sit ut tergum confidat superne, ipsum instrumentum

Instrumentum vero ita verti possit, ut axis & foramen *b* meridiem respiciant, non septentrionem aut Polum. E contrario cum facimus horologia in muris, necesse est instrumentum tergum suum infra habeat, & axis vel punctum *b* directe Polum aspiciat.

Facillimum est omnia hæc applicare horologiis per radios directos facientis, qui per foramen transirent, ut conclave quoddam intrent.





# ELEMENTA GEOMETRIÆ

*in quibus*

Methodo brevi ac facili sum-  
me necessaria ex Euclide, Archi-  
mede, Apollonio, & nobilissima vete-  
rum & recentiorum Geometra-  
rum inventa traduntur

*per*  
P. IGNAT. GASTON PARDIES,  
S. J. Gallico Idiomate conscripta


*Nunc vero*  
IN VSVM STUDIOSE JUVENTVTIS  
latinitate donata.

EDITIO QVINTA,



---

JENÆ,  
SYMPTIBVS GEORGII CHRIST. TROEBERT  
M DCCXXI.



**VIRO ILLUSTRIS**  
**NICOL. CHRISTO-**  
**PHORO LYNCKERO,**

**I**Cto, Hæreditario Domino in  
Kötschau, in Aula Saxo-Isenacensi  
& Regimine Tutelari Jenensi Con-  
siliario Excellentissimo, Judici  
Provincialis & Scabinatus Assessori,  
Collegii Juridici Seniori & Pro-  
fessori Primario, Academia  
Salanæ hodie

**RECTORE MAGNIFICO,**

*Patrono observantissime colendo*

*perpetuam felicitatem!*

**I**Gnosce homini ad Themidos sa-  
craria proruenti. Gallus est,  
cui natura liberiores indulget

genium. Non tamen miles, qui  
Tuos turbaret circulos, sed ma-  
thematicus audit jamdudum do-  
ctorum volitans per ora virum,  
Hic postquam natale reliquit so-  
lum, mutato habitu, quod Je-  
suitis solenne est, Germaniam  
perlustrare constituit. Abhorret  
nihilominus eadem cum maleficis  
sede locari; cum patris non pro-  
mittat funus neque principum  
inquirat in annos; sed mare &  
terram, numeroque carentem  
arenam metiri doceat. A me  
igitur, cui hactenus familiaris  
fuit, enixe petit, ut Patro-  
num conciliarem, sub cujus tu-  
tela exterius apud exteros secu-  
rus vivere posset. Diu non de-  
liberavi, sed magnificum nomen  
Tuum ad id exorandum esse di-  
xi. Dictum. Factum! Qua-  
pro-



propter in me converte iras, si  
quicquam in audendo peccatum  
fuit. Simultamen reputa, sum-  
mum Tuum favorem, quem  
sine ullis meae tenuitatis axioma-  
tibus per sola postulata novo pla-  
ne ac singulari conamine mihi de-  
monstrasti, primos subiecisse  
igniculos. His enim observan-  
tia mea excitata, hanc sibi legem  
latam putavit, etiam otii &  
partium noctis rationem Tibi soli  
reddere. In Gallia quidem Au-  
ctor Chineses, Europaeis populis  
si dls placet oculatiores, imitatus  
operam suam omnibus Academia  
Regiae membris, tanquam judi-  
cibus, obtulit: Nunc vero ea-  
dem defertur ad Academiæ nostræ  
caput, quia Te solum amplissimum  
laboris hujus theatrum esse exi-  
stimavi. Suscipe igitur Vir Illu.

EPISTOLA.

---

*Stris serena fronte, quod animo  
devoto calidisque omnigena felici-  
tatis votis offero, & futuris  
quoque temporibus perpetuum  
Nominis Tui cultorem benevo-  
lencia Tua radiis bea. Jena die  
14. Martii cl. 18c LXXXIV.*

Illustri Nomini Tuo

devotissimus

INTERPRES.

## L. B.

**E**lementa Geometriæ magna facilitate demonstrata hic accipis. Possunt ea omnetadium, quod incipientibus ex prima Euclidis lectione oritur, plenissime tollere.

Erubui sæpius, quando in explicatione Euclidis ab auditoribus mihi objiciebatur, cur hæc per se nota demonstrantur, cur non breviori via id fit? &c. Cœpi igitur evolvere varios Euclidis commentatores, sed alii prolixitate nimia, alii dum breves esse voluerant, obscuritate laborabant, ad unum vero omnes ordini Euclideo stricte inhærebant. Tandem incidi in præsentem auctorem, cujus labor desideriis incipientium ex asse satisfacere videtur. Absit tamen, ut hoc ipso Studiosæ Juventuti Euclidem è manibus excutiamus, aut quicquam ejus laudi detrahamus. Manebit illa semper illibata, quamdiu nomen mathematici eruditorum ordini insertum erit. Viam potius planiorem reddet hæc opera, ut ad ipsa Euclidis adyta pervenire queamus. Hoc igitur cum nostrum sit propositum, interpretatio præsens æquum sperabit judicem. Fateor regulas bonæ interpretationis geniumque linguæ Gallicæ non semper observatum fuisse. Et qui fieri aliter potuit, cum stans

a 4

quasi

## PREFATIO.

quasi pede in uno & aliis quam plurimis  
districtus, unice in commodum quorun-  
dam DNN. Commilitonum eam absolve-  
rim. Si Deus majora nobis dederit otia,  
facile cuncta ad limam revocari poterunt.  
Ceterum Nicolai Mercatoris introductio-  
nem in Geometriam præmisit, & appendi-  
cis loco ex Logica sive Arte cogitandi sub-  
jeci cap. 9. part. IV. in quo defectus Geo-  
metrarum norantur, quia & illa & hoc  
cum Auctoris nostri scopo maximo-  
pere conveniunt. Vale &  
labori fave.





## PRÆFATIO.

**Q**ui conferent exiguam libelli  
hujusce molem cum inscriptio-  
nis suæ magnitudine, primo  
fortè intuitu absterrebuntur  
inæqualitate, quæ inter utram-  
quæ est; & timendum est, ne illi  
omnia hæc promissa adeò eximia habeant  
pro verbis audacioribus hominis qui facile  
suscipiat quæ præstare non possit: sed hos  
ego rogatos velim, suspendant paulùm ju-  
dicium suum, ac considerent in præsentia,  
nonnisi dimidium horum Elementorum  
dari, & de sedecim libris, quibus illa ab-  
solvendi debent, nonnisi novem nunc publica-  
ri, quoniam reliqui, abstrusiora atque emi-  
nentiora Geometriæ inventa explicantes,  
incipientibus hanc artem addiscere non  
adeò necessarii sunt. Interea in primis  
hiscæ libris non omittantur quæcunque  
pulchra habentur in quindecim libris Eucli-  
dis, & præterea quæ Archimedes de quadra-  
tura circuli demonstravit & alia quædam e-  
jusdem generis. Videbitis hîc mirabiles nu-  
merorum proprietates quas Euclides in se-  
ptimo, octavo & nono Elementorum suo-

## PRÆFATIO:

rum demonstravit. Discetis hic demonstrationem *magnitudinum incommensurabilium*, quæ fortè maximus est conatus cujus capax sit humana mens, quoniam dum scrutatum abit usque ad possibilitatem rerum, tantâ cum claritate ac perspicuitate, id quod est & quod non est detegit; & quod in infinita multitudine comparationum, quas omnes observat tanquam possibiles inter duas magnitudines, demonstrat immobili quadam certitudine, neque ipsum Deum videre earum unam aptam quam suppeditet ut communem mensuram duarum harum magnitudinum. Verum enimvero licet hæc demonstratio pulchra sit, faciendum tamen est, eam satis esse difficilem; in quibus inventionem tantam debemus, non aliud nobis iter ostenderunt, quam quo ipsi fuerant usi, aut quod revera aliud non nossent, aut quod hac ratione veluerint partem laboris, quò defuncti fuerant nos quoque experiri & simul gustare tanto majori cum gaudio delicias novi hujus mundi, quanto majori cum labore eò pervenissemus. Quodcumque sit, hæc via adeo longa plenaque difficultatum est, ut pauci, qui aut constantiæ satis ad ferendum ejus tædium habeant, aut virium ad superandas molestias inveniantur. Nescio an aulam dicere me satis fuisse felicem in detegendo novo itinere. Nec tamen admodum

## PRÆFATIO.

dum magnæ id mihi laudi foret : interdum audaculus nauta felicior est in nova quadam detectione , quam peritissimus navarchus, fortunæq; idem in tempestate reperire finit, quod nemo perfectissima, quæ de re nautica haberi potest, cognitione detegere potuisset. Sic etiam contingere potuisset ut vasta hæc Geometriæ maria percutrens, sorte quadam offendissem novum aliquod iter & magnis hominibus qui me præcesserunt incognitum. Nihilominus bonam, hæc fortunam mihi attribuere non studeo ; illud tamen minimum jure dicturus sum, viam quam ego ingredior, iturus ad incommensurabiles, brevissimam esse atque facillimam, ita ut exigua attentione, quæ quatuor aut quinque saltem parvarum pagellarum, lectioni dicanda est, exactè aliquis comprehendere possit rem quam paucissimi, etiam ex iis qui se Geometriæ penitus dedunt, intelligere queunt.

Posthæc de diversis progressionum generibus ago, ac peculiariter duabus magis celebribus, quæ sunt Geometrica & Arithmetica, insisto ; easque inter se conferens Logarithmorum quoque tractationem suscipio, eorumque artificium ostendo mediante linea aliqua Geometrica, quæ admodum utilis erit ad resolutionem Problematum Algebraicorum de omnis generis dimensionibus. Hæc est illa linea quacum

## PRÆFATIO.

olim quadrare potui Hyperbolen; & quod non ita pridem amicorum quidam in Diario sive Actis Eruditorum Angliæ de iis, quæ de hac materia à peritissimis Geometris publici juris facta sunt, ostendit, aded me non occupavit, ut potius cogitationem mihi injecerit, eos noluisse omnia quæ de hac re dici possent, nobiscum communicare. Finio autem primam hanc partem praxi Geometrica; quæ deberet contineri ultimo Elementorum omnium libro. Præter operationes faciliores communioresque trado hic principia mensurandi magnitudines & distantias locorum inaccessibilium, conficiendi tabulas Topo. & Chorographicas; inveniendi sinus, tangentes & secantes omnium angulorum; ac tandem notitiam omnium eorum quæ ad hanc partem, quæ Geometria practica vocatur, pertinent.

Post hæc totidem libris tradam Algebram, Sectiones Conicas, Sphæricas, & Staticam; sed ante omnia quinque aut sex generales regulas stabiliam, è quibus deinceps, tanquam per corollaria, demonstratio infinitarum propositionum, quæ pro palmaris in Geometria habentur, trahitur. Inde natura invenietur & mensura spatiorum asymptoticorum, quorum cognitio res est omnium maxime admirabilis, & quæ clarissimè magnitudinem ac spiritualitatem animæ nostræ ostendit, siquidem hæc solo spiri-

ritus



## P R A E F A T I O.

ritus sui lumine ultra infinitum penetrans  
 adeo clarè res, quas nulla sensuum experien-  
 tia eam docere, nullaque corporea facultas  
 percipere saltem potest, detegit. Spatia hæc  
 sunt extensionis actu infinita, comprehensa  
 inter duas lineas, quæ prolongatæ, in infi-  
 nitum, non se unquam offendunt; unde  
 ipsas nomen Asymptotorum est. Interim hic  
 demonstratur, hæc spatia quoad longitudi-  
 nem infinita, nihilominus circulo alicui aut  
 alteri figuræ determinatæ æqualia esse: ita  
 ut Infinitum ipsum, quam immensum  
 & quam innumerabile etiam illud est, nihi-  
 lo secius ad calculum atque mensuram  
 Geometriæ reducatur, & anima nostra, ma-  
 jor adhuc illo, id comprehendere queat. Ex  
 omnibus naturalibus, quas homo propria  
 ratiocinatione acquirere potest, notitiis si-  
 ne dubio hæc Infiniti comprehensio maxi-  
 mè est admirabilis: neque quicquam ego  
 aptius video quod de animæ nostræ existen-  
 tia nos convinceat, atque doceat, ultra mate-  
 rialem facultatem qua nobis res imagina-  
 mur medio organorum, esse nobis aliquam  
 plane spirituales ad cogitandum & ratioci-  
 nandum, quam omnia Philosophorum  
*maximus potentiam aliquam ab organo in-  
 dependentem, separatam à materia, & ali-  
 unde quam à corpore venientem appellat.*  
 Certè, quantascunq; etiam vires intendemus,  
 ut nobis infinitum imaginemur, ad extre-

mum tamen ejus nunquam veniemus; & quamdiu in sola ejus imaginatione nos detinebimus, formare seu concipere quidem nobis poterimus spatium aliquod vastæ diffensionis, illud tamen semper erit determinatum: siquidem cum imaginatio, ut propriè loquamur, corporea quædam sit potentia, quæ objecta non nisi per phantasmata ac species sensibiles nobis repræsentat, ea ipsa, instar corporis, in repræsentationibus suis determinata esse debet. Et quemadmodum tabula aliqua oculis nostris quandam extensionem actu infinitam subicere nequit, quia id quod limitibus in certo aliquo spatio circumscriptum est id quod terminos nullos habet continere non potest; ita etiam imaginatio quæ nihil aliud est quam tabula repræsentans imagines revera satis subtiles, sed semper materiales, non nisi corporeas atque limitibus comprehensas res nobis ostendere potest, cum tota infiniti immensitas picturæ alicujus corporeæ terminis contineri nequeat. Imaginatio igitur eo usque non attingit, ut nobis infinitum repræsentet. Sed aliunde demonstratio quam de natura & proprietatibus immensæ hujus atq; infinitæ extensionis asymptoticæ instituimus, nos pariter omnes convincit, haberi intra nos facultatem, quæ idonea sit hanc infinitam extensionem nobis repræsentare. Quemadmodum enim

## PRÆFATIO.

ut regula atque circino figuram in charta, delineatam metiar, opus est me eam figuram præ oculis atque ad manus habere, quò instrumenta ad angulos ejus atque latera applicans, omnes ejus dimensiones sumere, & sic magnitudinem illius determinare possim; ita etiam ut rationis meæ regula mensuras spatii hujus asymptotici sumere queam, necesse est, ut ejus ideam aliquam, intimè animo meo præsentem habeam; & ut idem animus, liceat ita loqui, huic ideæ atque interiori figuræ se applicans, ejus dimensiones accipiat, magnitudinem determinet, atque omnes ejus proprietates demonstret. Necesse igitur est ut agnoscamus claras & distinctas infinitæ alicujus extensionis ideas & repræsentationes nos in nobis habere, & per consequens eam facultatem quæ ita nobis repræsentat id quod corpus nullum repræsentare potest, esse potentiam quandam pure spiritualem & à materia distinctam: adeo ut Geometria unica quadam demonstratione simul aliquam maximè admirabilem naturæ proprietatum, eodemque tempore unam è duabus maximè momenti veritatibus Moralibus probet.

Audebone ulterius etiam progredi, & dicere in hac ipsa demonstratione invictum quoque argumentum existentiae Dei reperiri? Novi equidem divinam naturam, abyssum esse luminis, quod passim se diffun-

## PRÆFATIO.

fundit. & in cœcissimorum etiam atque, stupidissimorum animis sese inserit: sed nec minus novi, quousque progressa sit Libertinorum impietas, qui cum propriæ ac internæ refutationi resistere, aut sibi ipsis respondere nequeant, extrinsecus tamen aliorum demonstrationes eludere, intricato negotio de æternitate se munientes, conantur; & in tuto se esse sub infinita hac causarum dependentium multitudine, ac refugit cum nunquam non invenire in æternæ serie diversarum productionum arbitrantur. Verùm Geometria, manifesto quodam asymptotorum exemplo, invicto argumento demonstrat, quod etiam in hac ipsa, quam prætendunt, causarum subordinatarum & dependentium unius ab altera in infinitum serie necessario veniendum sit ad primam aliquam naturam, quæ cum omnibus his causis particularibus eum concurrat, omnibusque temporibus correspondeat, quoque ipsa sit infinita & æterna; & quæ licet non sola ullam horum causarum sine concursu & determinatione aliarum producat, nihilominus generalis quæ res omnes producit conservatque, causa existat.

Fortè, post hæc omnia, nonnemo cogitabit me res hic in epitome solum tradere, hancque Geometriam iis quidem, quibus jam cognita esset hæc scientia,

## PRÆFATIO.

memorialis libelli loco futuram, non verò instituturameos, qui eam addiscere cupiunt. Sed profiteor longè ab intentione mea hoc abesse, quæ nunquam fuit epitomen conficere: semper enim præ me tuli Geometriam conficere, quæ incipientibus inserviret, & ex qua illi etiam qui nunquam de Mathematicis rebus quicquam audivissent, brevi admodum tempore, non solum quod summe necessarium est in Geometria, sed subtiliora quoque addiscere possent. Non ignoro libros in hac materia brevissimos non esse clarissimos; atque in magno numero eorum, qui nobis sectionem atque cognitionem Euclidis faciliorem reddere voluere, plurimi satis ejus volumen minuerunt; propterea tamen non omne tempus quo ad eum intelligendam opus est, abbreviarunt.

Inter omnes Commentatores, maxime prolixus est, mea quidem opinione, Clavius, Pater Fournier verò brevissimus; nihilominus persuasum mihi est, longiori tempore opus esse ad mediocriter intelligendum Euclidem in Patre Fournier, quam in Clavio: adeò verum est, in Geometria studii, ac laborum tempus non magnitudine aut parvitate voluminis metiendam esse. Itaque in instituto, quod erat, medium, Scientiam hanc cum maxima qua posset facilitate addiscendi tradere, non tam in-

scri-

## PRÆFATIO.

scriptis brevis esse, quàm ut in modo procedendi facile intelligerer studui; sique hic libellus exiguus admodum apparet, non tam illud brevitati demonstrationum particularium adscribendum erit, quam methodi generalis facilitati. Notandum enim est inter ea, quæ difficilem ac tædiofam Euclidis & vulgarium Autorum lectionem faciunt esse & illud, quod dum in summo illo rigore, quo nihil quod demonstrari possit, quàm facile aliàs etiam appareat, sine demonstratione abire sinunt, sæpe accidit ut quod clarum fuisset, si animo id quale naturaliter videbatur proposuisse satis habuissemus, postea difficile ac intricatum evadat, quando ad demonstrationem regularem id reducere volumus. Imò & hoc observabis in Euclide, ut demonstret propositionem aliquam magni momenti, longam adhibere propositionum seriem, quæ propriè nulli sunt usui quam ad probandam principalem hanc propositionem. Si itaque sola explicatione ut veritas perspiciatur efficere possumus, absque eo ut laboremus demonstrare id de quo plenè convicti sumus, & sermones infumamus, qui non videntur aliud facere, quam nos dedocere id quod ignorare non possumus, labore hoc certè supersedebimus. Pari modo, si una vice omnes hæ principales atque magni momenti propositiones, absque

## PRÆFATIO.

que adhibita longa illa demonstrationum serie, tantisque apparatus, demonstrari possunt, habebimus procul dubio medium res inutiles rescindendi: atque hoc est illud, quod ego me pluribus in locis præstitisse arbitror, dum in unica quadam propositione demonstro, quod aliàs non nisi tædiosa illa aliarum propositionum serie probatum fuit. Aliud, quo usus sum, medium abbreviandi, est res ad generalia certa principia reducere; quod non in hoc solum libro feci, ubi per quinque sexve regulas universales ferme infinitum numerum palmariarum propositionum demonstro, sed in multis aliis etiam locis, veluti quando de Sectionibus Conicis agens, quatuor illarum proprietates per unam proprietatem, quæ unicæ alicui sectioni peculiaris est, demonstro. E g. eas omnes sub proprietatibus Ellipseos considerans, dico Circulum esse ellipsin, cujus duo foci se tangunt; Parabolam esse ellipsin, cujus duo foci sunt in infinitum à se invicem distantes; & Hyperbolen esse ellipsin cujus foci magis quam infinitum distant: quod optime procedit ac bene percipi potest, velut illo in loco explico.

Nonneminem sine dubio malè habebit quod consuetam methodum definitiones, principia & propositiones collocandi deseruerim; ac forsan ille me Geometriæ, sublati

## P R A E F A T I O.

latis illis, quæ ei semper dignitatem æccurratissimæ scientiæ dederunt, injuriam facere creder. Alius quidam reprehendet, quod adhuc vetustos quosdam demonstrandi modos retinuerim, postquam moderni, per expolitam illam hujus in quo vivimus temporis rationem, demonstrationes multo *magis naturales* dederunt, atque differentiam, quæ est inter *illuminare animos* atque *eos convincere*, ostenderunt. Objicietur mihi porro, quod in pluribus negligentior fuerim; quod multas propositiones absque quod eas demonstrarem præterierim; quod sæpè loca, quæ non directe id quod in questione est probant, citem; quod indifferenter *Conversa* & propositione ipsa utar. Ad hæc omnia verbo uno respondeo, me, cum Geometriam cum omni qua fieri posset facilitate docere instituissem, hanc viam, quam institi, maxime idoneam invenisse: quod non obstat, quo minus bonas hominum harum rerum peritorum de me opiniones lucrifaciam.

Interim animadverto, me dum omnimodam brevitatem hujus Opusculi promitto, nimis longum in Præfatione esse. Verumtamen non me detineo in ostendendis magnis Geometriæ utilitatibus; id solum dico, eam si unquam in Scientiis naturalibus aut Artium praxi commodi quicquam attulit, nunc certe & his & illis summe esse



## PRAEFATIO.

necessariam. Notum est quousq; seculo nostro artium perfectio prolata sit, & quantâ cum indagine res occultissimæ in Physicâ perpendantur. Eo modo quo his temporibus Physica docetur, Geometria æque ac Mechanica, quæ nihil aliud est quam Geometria ad motum localem applicata, necessaria est, & qui maxima hodiè famâ clari sunt, ab iis qui harum duarum cognitione instructi non sunt, intelligi nequeunt. Quod Mechanicam attinet, ejus Elementorum, in dissertatione de motu locali, quam meam profiteri non est quod pudeat, jam tradidi partem; atque spero cum eo quod hoc libro de Geometria nunc publici juris facio, duo magna haberi posse admiscula per quæ Physicâ, prout nunc traditur, intelligatur, recteque de ea judicetur. Fortassis etiam observare licebit eos, quibus honori est Philosophiam suam Geometriæ atque Mechanicæ fundamentis superstruxisse, non semper bene esse fundatos; & illud ipsum quod doctrinæ eorum incrementa dedit, inservire poterit ad errores eorum agnoscendos. Porro Lectorem moneo, me nullo modo eorum, quæ hoc opusculo traduntur, auctorem haberi velle; undique quæ mihi placuerunt collegi: ac si quis heic quicquam reperiat quod à se inventum putet, aut ab alio quopiam, audacter id  
arri-

## PRÆFATIO.

arripiat, Auterive suo attribuat, lubens  
ego consentio; nec litem ei ullam move-  
bo. — Quod si quis forte fortuna quic-  
quam hic offenderit quod alibi non inve-  
nit, idque mihi tribuere velit, pro meo  
tunc id agnoscam, metu ne plane  
pro deserto habeatur.



MONI.

# MONITA

ad eos qui Geometriam discere cupiunt.

**E**odem tempore quo legitur propositio, considerentur & appposita figura. Laboris id principio est, sed duobus tribusve ille diebus superatur.

Non deferendus est labor, si occurrant res, quæ non initio statim comprehendantur; Geometria non tam facile quam historia quadam capitur.

Si postquam propositionem aliquam cum attentione legens, eam non intelligas, ulterius progredere; intelliges eam fortasse in sequentibus, aut ad minimum tunc, cum omnibus perlectis de rebo planè legere incipies.

Numeri qui inter Parentheses reperiuntur, veluti e.g. (3.24.) notant id quod eo loco dicitur alibi probatum esse, nempe libro tertio articulo vigesimo quarto: ita ut prior numerus librum, reliqui articulum significent; eosque articulos consulere oportet, ut sciatur probatio ejus quod legitur.

Si vocabula invenies quæ non intelligas, consule tabulam quæ in fine subjuncta est.


Maxi-

## MONITA.

*Maxime conduces initio Magistrum, qui  
has demonstrationes explicet, habere, ea sa-  
nim ratione multo facilius quam si ipse  
tantum legeris hæc addisces.*

*Si quis laborem non subterfugerit in Col-  
legium Claremontanum veniendi, Autorem  
horum Elementorum ea die Luna atque Ve-  
neris explicantem offendet.*

Sperabam primo quoque tempore reli-  
qua hujus Geometriæ in lucem edere; ve-  
rum eorum impressionem aliquandiu dif-  
ferre coactus sum, quo spatium haberem  
alios Mathematicos tractatus multò magis  
necessarios publicandi. Quamprimùm  
Staticam Opticam & Quadrantes, in qui-  
bus jamjam distineor, absolvo, continuo  
statim ordine Algebra, Sectiones Conicæ,  
& reliqua quæ promisi, ut plena quæ-  
dam & perfecta Geometria fiat,  
imprimantur,



*Nicolai*

*Nicolai Mercatoris*  
in  
**GEOMETRIAM**

*Introductio brevis*



*Geometria* tradendæ metho-  
dus eadem debebat es-  
se, quæ aliarum scientia-  
rum; ubi Nomen exponi-  
tur primum, tum defini-  
tio, genus, subiectum, obiectum, principia,  
genesis, & affectiones tam primæ, quam se-  
cundæ.

*Nomen* Geometriæ dimensionem terræ  
innuit; quod ea, quæ plerumque metiri so-  
lemus, vel terra sint, vel ex terraquo glo-  
bo producta.

Convenit igitur hoc nomen apprimè  
scientiæ vel arti, quæ in dimetiendis obje-  
ctorum visibilium quantitatibus occupa-  
tur; quales sunt itinerum distantia; alti-  
tudines montium & ædificiorum; agrorum  
latifundia, vel moles corporum.

Postulabat ab industria mentis ipsa ne-  
cessitas, ut inquireret in rationem ista defi-  
niendi. Voluit igitur sollicitata mens suc-  
currere indigentia; rei, & intellecto nego-  
tio, quæcunque ad institutum facerent, exa-  
minare.

Ideoque non dedignatur Geometria or-  
tum

tum suum nec invidet nomen arti, quæ suis natalibus præfuerat. Quinimo inventis suis liberè uti jubet; dummodo luminibus suis acceptum feratur, quicquid illa circa materiales extensiones occupata machinatrix usquam pollet.

Dehinc opportunum est quærere, quænam sit illa, quam nos Geometriæ nomine indigitamus. Ne sim longus, accipe *definitionem*.

*Geometria* est scientia circa magnitudinum genesin & affectiones occupata.

*Genus* est *scientia*, cujus finis unicus & solus est scire.

*Subjctum inbæsonis* est *mens*, cujus facultates omnes in eruenda scientia occupantur.

*Mentis facultates* sunt *Voluntas*, *Intellectus*, *Judicium*.

*Objeſtum* est *magnitudo*, non illa quidem materiæ adhærens sed ab omni materia abstracta. Quid sit abstractio Mathematica docent Philosophi. Nobis sufficit, quod possumus concipere lineam, vel extensionem in latum, aut solidum; quamvis illa nulli materiæ adhæreat. Atque in hoc elucet discrimen inter Geometriam puram & Practicam.

*Principia*, quæ magnitudinem constituunt, sunt Infinitum, Punctum, & Motus.

*Infinitum* est, quod omni termino & pos-  
finitio

sitione caret, nec proinde augeri vel minui potest.

Ab Infinito differt *Maximum*, quod augeri quidem nequit, at minui potest omnino.

*Punctum* nec augeri potest, nec minui, neque aliud in se quicquam habet præter positionem

A Puncto differt *Minimum*, quod minui quidem nequit, at augeri potest omnino.

Cæterum Infinitum absolutè consideratum non est principium magnitudinis; sed cum in Infinito ponitur Punctum, tum deum evadit ipsum Infinitum Campus maximus, qui est veluti matrix vel receptaculum magnitudinum gignendarum.

Sed nec Punctum absolutè consideratum, principium est magnitudinis; sed accedente motu fit terminus lineæ, & quasi semen omnium magnitudinum gignendarum.

Est autem *Terminus* magnitudinis cujusque extremum, nullam utique partem ipsius constituens, sed limites tantum ponens.

Ita punctum terminat lineam, licet innumera puncta ne minimam quidem constituent lineam. Et linea terminat superficiem, licet innumera lineæ ne minimam quidem partem constituent superficiem. Denique superficies terminat corpus, licet innumera superficies ne minimam quidem partem constituent corporis.

Sic igitur Punctum terminus est terminorum

norum, atque hoc nomine purum putum est principium magnitudinis. Reliqui termini, nimirum linea & superficies certo respectu sunt quoque magnitudines, atque tum principii nomine haudquaquam veniunt. Ita linea absolute considerata, magnitudo est, constans partibus suis; at si moveatur linea in transversum, jam consideratur ut terminus & principium superficiei, quam generat. sed cujus tamen partem nullam constituit. Ita superficies absolute considerata, magnitudo est, partibus suis constans; at si moveatur superficies in transversum, jam consideratur ut terminus & principium corporis, quod motu suo generat, cujus tamen partem nullam constituit. Quare principium magnitudinis, secundum, proprie loquendo, est *terminus*; quisque scilicet magnitudinis suae. Cum verò à puncto reliqui termini trahant indivisibilitatem illam, cujus ratione vocantur termini, ita ut linea sit indivisibilis in latum, superficies indivisibilis in profundum; ideo puncto, ut termini terminorum, secundi principii locum haud inepte tribui existimamus.

Tertium principium est *Motus*, qui est exspatiatio termini in campo libero.

Motus autem termini cujusque talis sit oportet, ut si quas habet partes, singulae succedant novis vestigiis, nunquam antea pressis.

Pun.



Punctum quidem, cum nullas habeat partes, quocunque motu cieatur, necessario lineam describit; at linea non quovis motu superficiem: etenim fieri potest ut lineæ rectæ, vel circularis, singulæ partes pristino quidem excedant vestigio, at non ita tamen, ut non aliquæ vel omnes succedant in vestigia jam antea pressa; quo motu nulla producitur superficies, sed tantum linea recta continuatur, vel circularis in seipsum revolvitur. Ideoque dixi, oportere, ut singulæ termini partes novis vestigiis, *nunquam antea pressis*, insistant. Ubi animadvertendum, licet omnes & singulæ partes vestigio suo excedere debeant; non impedire hoc tamen, quò minus lineæ rectæ unus terminus, vel curvæ lineæ ambo termini maneant fixi, ut generetur superficies: nam termini, uti diximus, non sunt partes ejus magnitudinis, cujus sunt termini.

Ut verò mota superficie generetur corpus, omnis quoque superficiei partes nova vestigia occupare debent, nunquam antea pressa; nec tamen impedit hoc, quò minus unicus saltem superficiei terminus, nempe qui sit linea recta, fixus maneat suo loco: quia linea non est pars superficiei.

Corpus autem, licet moveri possit ita, ut singulæ ejus partes novis vestigiis insistant; fieri tamen non potest, quin aliqua vestigia, quæ à succedentibus partibus occupantur,

jam ante pressa fuerint ab aliis partibus, quæ inde excesserunt: ideoque motus corporis non producit novam speciem magnitudinis.

Hinc liquet, non esse plures, quam tres magnitudinis species, nimirum lineam, superficiem, corpus.

Jam vero, *Genesis* magnitudinis est productio extensionis ex termino movente in campo libero.

*Magnitudo* autem est moles determinata & continua.

*Affectiones* magnitudinis *prima*, quæ illi semper insunt per sua principia, sunt moles, determinatio, & continuïtas. Nam ab Infinito habet molem; à termino circumscriptionem vel figuram; & à Motu continuïtatem, extensionem, & partium extra partes positionem.

*Affectiones secunda* oriuntur, cùm vel una aliqua magnitudo comparatur cum suis partibus, respectu molis; etenim tota æqualis est omnibus suis partibus, eademque major qualibet sui parte: vel cùm duæ pluresve magnitudines ejusdem speciei comparantur invicem; nam si termini unius congruant terminis alterius, æquales sunt; sin excurrant termini unius ultra limites alterius, inæquales. Itaque comparatio molis facit *æqualitatem* vel *inaequalitatem*, quæ quidem nihil aliud est, quam ipsa magni-

gnitudinum *ratio*. Et *ratio* quidem *aqualitatis* non nisi unica esse potest: at *inaequalitatis ratio* innumeris modis variat, dum magnitudinum comparandarum altera quidem constantem molis mensuram obtinet, altera vero a minima continuo excrefcit in maximam; ubi tot oriuntur rationes diuersæ, quot sunt in crescente momenta incrementi, & crescens ad constantem acquirit rationem continuo maiorem atque maiorem; at constans ad crescentem, rationem continuo minorem atque minorem. Contrarium accidit, cum altera quidem magnitudine molem obtinente constantem, altera a maxima continuo decrefcit usque ad minimam; ubi decrefcens ad constantem acquirit rationem continuo minorem atque minorem; at constans ad decrefcentem, rationem continuo maiorem atque maiorem. Ita magnitudo crescens vel decrefcens ad constantem rationes omnes obit, quoruncque sunt a minima usque ad maximam, & constans itidem ad crescentem vel decrefcentem.

Sed cum duo vel plures sunt constantes, ad quas totidem crescentes vel decrefcentes obeunt rationes continuo maiores vel minores; tum oritur *rationum aequalitas* vel *inaequalitas*, quæ quidem melius explicari non potest, quam per ipsam magnitudinum genesis, dum scilicet procreantur motu successivo.

Hic autem *motus* est vel *aquabilis*, cum terminus movens æqualibus temporum momentis æqualia spatia conficit: vel *inæqualis*, cum velocitas intenditur subinde vel remittitur.


Et cum fieri possit, ut terminus aliquis ad certum tempus incedat quidem motu æquabili; at mox velut ex abrupto mutet tenorem velocitatis in citatiorem vel tardio-rem; ubi rursus fieri potest, ut novus ille velocitatis tenor sit quidem in se æquabilis, at respectu prioris omnino citatior vel tardior: ideoque ad explicandam rationum æqualitatem, convenit ubique intelligere motum non modo æquabilem, sed *eiusdem* quoque tenoris, hoc est, eadem, quâ æcepit, velocitate perpetuo incedentem. Hic ita suppositis.

*Rationes æquales* sunt crescentium ad suam cujusque constantem, cum eodem instanti e carceribus suis erumpunt, atque eodem tempore in suas constantes exerescent, & præterea quovis instanti simul sistunt. Nam æqualia tempora producunt æquales rationes crescentium ad suam cujusque constantem.

Ubi non est opus, ut crescentes sint ejusdem speciei, neque ut sint æque veloces; sed sufficit crescentem quamlibet ejusdem esse speciei cum sua constante; & motum uniuscujusque crescentis in se esse æquabilem, & ejusdem tenoris.

Hinc

Hinc jam perfacile est demonstrare sex illos argumentandi modos Geometris usitatos, qui sunt rationis alternæ, inversæ, divisæ, compositæ, conversæ, & ex æquali.



Exponantur enim quæ constantes  $DA$  &  $DB$ , quas duo puncta à  $D$  erumpentia versus  $A$  &  $B$  producant eodem tempore, ita ut, cum unum pervenerit à  $D$  ad  $a$ , alterum pervenerit à  $D$  ad  $b$ ; & cum illud pervenerit ad  $a$ , hoc pervenerit ad  $b$ ; denique, cum illud ad  $A$ , hoc ad  $B$ . Dico, per definitionem superiorem; cum crescentes  $DA$ ,  $DB$  eodem tempore productæ sint & constantes  $DA$ ,  $DB$  itidem eodem tempore; rationem  $DA$  ad  $DA$  æqualem esse rationi  $DB$  ad  $DB$ : Atque ob hoc etiam, alternando terminos duos medios, esse rationem  $DA$  ad  $DB$  æqualem rationi  $DA$  ad  $DB$ . Nam

si ab æqualibus temporibus  $DA$  &  $DB$ , auferantur æqualia  $Da$  &  $Db$ ; restant æqualia tempora  $aA$  &  $bB$ . Maneant jam velocitates ipsarum  $DA$  &  $DB$  eadem, quæ fuerant; at ipsis  $Da$  &  $Db$  gignendis præter ea, quæ habebant tempora, concedantur insuper ipsarum  $aA$  &  $bB$  tempora; ita fiet, ut velocitas ipsarum  $Da$  &  $Db$  retardetur, & ut producantur nunc quidem eodem tempore, quo  $DA$  &  $DB$ . Quod si igitur considerentur  $Db$  &  $DB$ , ut constantes; at  $Da$  &  $DA$ , ut crescentes. Jam crescentes  $Da$  &  $DA$  eodem tempore producantur, & constantes  $Db$  &  $DB$  itidem eodem tempore. Ergo ratio crescentis  $Da$  ad constantem  $Db$ , æqualis est rationi crescentis  $DA$  ad constantem  $DB$ . q. e. d.

Rursus, supponendo ut prius, rationem  $Da$  ad  $DA$  æqualem esse rationi  $Db$  ad  $DB$ : dico, *invertendo terminos*, esse quoque rationem  $DA$  ad  $Da$  æqualem rationi  $DB$  ad  $Db$ . Sint enim  $Da$  &  $Db$  constantes, &  $DA$  &  $DB$  crescentes. Cum  $Da$  &  $Db$  gignantur eodem tempore; &  $DA$ ,  $DB$  itidem eodem tempore: erit per definitionem, ratio  $DA$  ad  $Da$  æqualis rationi  $DB$  ad  $Db$ .

Tertio, si sit ratio  $Da$  ad  $DA$  æqualis rationi  $Db$  ad  $DB$ ; erit etiam *dividendo terminos* ratio  $Da$  ad  $aA$  æqualis rationi  $Db$  ad  $bB$ . Sint enim constantes  $aA$  &  $bB$ ; harum tempora sunt æqualia, quippe quæ  
restant,

restant, cum ab æqualibus ipsarum  $DA$  &  $DB$  temporibus auferuntur æqualia tempora ipsarum  $Da$  &  $Db$ : sed & crescentium  $DA$  &  $DB$  tempora sunt æqualia: Ergo sequitur per definitionem, quod ratio crescentis  $Da$  ad constantem  $aA$  æqualis sit rationi crescentis  $Db$  ad constantem  $bB$ .

*Quarto*; si sit ratio  $DA$  ad  $aA$  æqualis rationi  $Db$  ad  $bB$ ; erit etiam componendo terminos, ratio  $DA$  ad  $aA$  æqualis rationi  $DB$  ad  $bB$ ; item ratio  $DA$  ad  $Da$  æqualis rationi  $DB$  ad  $Db$ .

*Quinto*; si sit ratio  $DA$  ad  $Da$  æqualis rationi  $DB$  ad  $Db$ ; erit etiam convertendo ratio  $aA$  ad  $Da$  æqualis rationi  $bB$  ad  $Db$ .

*Sexto*; si sit ratio  $Da$  ad  $aA$  æqualis rationi  $Db$  ad  $bB$ ; & porro ratio  $aA$  ad  $aA$  æqualis rationi  $bB$  ad  $bB$ : erit etiam ex æquali ratio  $Da$  ad  $aA$  æqualis rationi  $Db$  ad  $bB$ .

Quæ quidem omnia demonstrantur ex ipsa temporum æqualitate, nec ulteriorem explicationem postulant.

Dicitur autem ista, de qua hæctenus egimus, rationum æqualitas *proportio*; & magnitudines ipsæ rationum æqualitate affectæ, vocantur *proportionales*. Verum ad intelligendam *rationem duplicatam*, vel *triplicatam*, quæque hanc sequitur, figurarum *similitudinem*; descendendum nunc est ad singularum magnitudinum genesin,

quo pacto nimirum *linea recta* procreetur, & *angulus rectilineus*, nec non *superficies plana*, atque in hac *circulus*, & *linea perpendicularis*, item *figura trilatera* & *quadrilatera*, tandemque *linea parallela*, & *figura similes tam plana*, quam *solida*. Itaque jam.

*Linea recta* generatur, cum punctum movetur ita, ut singulorum vestigiorum a singulis elongationes cum ipsis lineæ incrementis paria faciant.

Cum verò magnitudines ex iisdem principiis, atque eodem modo genitæ, congruant inter se; rectæ autem omnes generentur ex puncto, eodem illo, quo diximus, modo: ideoque omnes rectæ sibi mutuò congruunt.

*Congruere* autem dicuntur magnitudines, cum, applicatione facta, singula puncta unius incidunt in totidem puncta alterius. *Congruentia* autem cum *æqualitate* coniungitur, cum singula puncta unius incidunt in singula puncta alterius.

Præterea, cum quævis pars rectæ eodem generetur modo, quo & tota: ideoque, si quævis duo puncta partis incidant in duo puncta totius; congruent & singula reliqua puncta partis totidem punctis totius, nec ullum partis punctum existet extra totam. Quia, dum generatur recta, non nisi uno modo proceditur à puncto ad punctum.

Unde



Unde patet; si duæ rectæ diversæ sibi mutuò occurrant, eas non posse nisi in unico puncto convenire. Quæ enim rectæ in pluribus, quàm uno, punctis conveniunt, non sunt diversæ, sed eadem recta

Patet item; si pars rectæ moveatur per vestigia totius, vel si recta aliqua sua ipsius vestigia legat; non nisi eandem rectam continuari.

Et si recta convertatur, itidem ut axis sphaeræ, atque inter convertendum duo quævis illius puncta hæreant suo vestigio: nullum omninò relinquorum punctorum vestigio suo excedet. Quia, ut diximus, per duo puncta non nisi unica recta continuari potest.

Et vicissim; si alicujus lineæ, dum circa duo puncta fixa convertitur, singula puncta hæreant suo vestigio; illa linea erit recta. Nam si aliquod ejus punctum distaret à recta circa eadem puncta conversa; fieret, ut conversis ambabus, revolutionibus æquabilibus & synchronis ipsum punctum distans eandem semper servaret distantiam, cum ambæ lineæ situm inter se eundem servant: ideoque punctum distans, quod initio revolutionis erat infra rectam, post dimidiam revolutionem foret supra. Et cum recta locum non mutet; oporteret, ut punctum distans locum mutasset, quod tamen suo vestigio hæreere supposueramus.

Deinde, si in lineâ rectâ sumatur punctum aliquod, quod ab ipsâ digrediendo describat aliam rectam a priori diversam; tum generatur *angulus rectilineus*, qui nihil est aliud, quàm duarum rectarum diversarum ad se invicem inclinatio.


Facto autem angulo rectilineo, si tertiâ quædam recta moveatur super ambabus angulum intercipientibus, ita ut tertiâ illa nunquam non stringat ambas; tum generatur *superficies plana*, & ubicunque tandem sistat tertiâ illa linea, ibi triangulum terminat rectilineum, quæ est figura plana tribus istis rectis inclusa.

Quòd si porro in superficie plana ponatur recta linea, quæ altero suo extremo figatur, dum ipsa, circumgyrando in orbem, redeat ad situm pristinum; figura sic generata in plano vocatur *circulus*; & linea, quam extremum mobile describit, est *peripheria*; & punctum fixum est *centrum*. Cæterum ex ipsa genesi innotescit differentia circuli specifica, quæ consistit in æqualitate omnium rectarum a centro ad peripheriam educatarum.

Est verò & alia circuli genesis, quam concipies, si lapidemingas naturali descensu incidere in stagnum quietum. Etenim à puncto, ubi incidit lapis, tanquam centro, emicabit in superficie stagni circulus quidam initio minimus; qui paulatim excurrenti-

# *Introductio brevis.*

rentibus undique radiis excrescet in maximum. Ubi memineris, me in hac delineatione uti lapide pro puncto, & superficie stagni pro plana ( licet reverà sit spherica) & motu radiorum, quasi esset æquabilis, licet fortasse incitatio sit initio, & tardior in fine. Neque aliter faciunt Geometræ, cum per figuras in charta vel pulvere exaratas subijciunt oculis, quæ mente concipi volunt.



Quod si verò duo lapides eodem instanti & impetu incidant in duo diversa stagni puncta; generabuntur duo circuli, quos æqualiter crescere putemus. Hi sibi mutuò occurrerent primum in puncto *c*, quod ab utriusque centro *a* & *b* æqualiter distat; cum radios æqualiter crescere statuamus. Postquam

quam verò se mutuo attigerint isti duo circuli, jam quoque incipient se invicem secare in aliis subinde atque aliis punctis; quæ sectiones tam supra quam infra primum contactum excurrent in lineam, cujus singula puncta à centris circulorum æqualiter absunt. Et dum pergunt crescere circuli, tandem illorum peripheriæ simul appellant utraque ad alterius centrum; atque tum radii, continuati à centris ad utramque sectionem, faciunt cum ea, quæ centra connectit, duo triangula æquilatera  $abd$  &  $abe$ , quorum basis communis est  $ab$ : lineæ verò  $cd$  &  $ce$  à primo contactu  $c$  ad utriusque trianguli apices  $d$  &  $e$  extensæ, sunt inter se æquales; quippe æqualibus motibus atque eodem tempore genitæ.

Sed & anguli quatuor circa  $c$  eodem modo geniti, nimirum  $acd$ ,  $bcd$ ,  $ace$ ,  $bce$ , sunt inter se æquales. Ergo inclinatio lineæ  $ac$  ad lineam  $cd$  æqualis est inclinationi ipsius  $bc$ , ad  $ce$ ; & porro lineæ  $cd$  ad lineam  $cb$  inclinatio æqualis est inclinationi ipsius  $ce$  ad  $ca$ . Quæ igitur ex æqualibus inclinationibus componuntur *sergentiæ*, nimirum lineæ  $ac$  ad  $cb$  per inclinationes  $acd$  &  $dc b$ , & lineæ  $bc$  ad  $ca$  per inclinationes  $bce$  &  $eca$  sunt æquales. Ergo radii contingentium  $ac$  &  $bc$  sunt *in directum* siti; & recta *contra connectens*  $ab$  transit per contactum  $c$ .

Sunt

## *Introductio brevis.*

Sunt verò &  $c d$  &  $c e$  lineæ propter eandem rationem *in directum* fixæ; eademque deprehenduntur quoque esse *rectæ*, si triangula  $b c d$ ,  $b c e$ , fixis punctis  $c$  &  $d$ , item  $c$  &  $e$ , convertantur, donec incidant in plana triangulorum  $a c d$ ,  $a c e$ . Nam angulus  $b e d$  congruet angulo  $a c d$ , item angulus  $b c e$  angulo  $a c e$ , & recta  $c b$  rectæ  $c a$ . Ubi non solum puncta  $d$  &  $e$  manent suo loco, ut erat suppositum, sed & quæcunque alia in linea  $d e$  puncta à circulorum sectionibus genita fuerant, veluti  $K$  &  $l$ , singula suis vestigiis hærent, dum triangula  $b c K$ ,  $b c l$ , & reliqua simul genita, convertuntur. Ergo, inquam,  $d c e$  est linea recta, quæ cum ad rectam  $a c b$  æquales habeat inclinationes s. angulos  $d c a$  &  $d c b$ , dicitur ob hoc *perpendicularis*, & anguli ipsi æquales  $d c a$ ,  $d c b$  vocantur *recti*.

Cæterum recta  $d e$  non tangit peripherias contingentium circulorum nisi in unico puncto  $c$ . Nam quæcunque magnitudines non possunt ex iisdem principiis eodem modo produci, ex nec possunt sibi mutuo congruere. Non possunt autem circuli occurrentes in  $c$ , & recta  $d e$  eodem modo produci: quia recta cum æqualibus incrementis pares facit elongationes à puncto  $c$ ; circuli verò contingentes in se redeunt. Ergo recta  $d e$ , & circuli contingentes non possunt sibi mutuo congruere. Enimverò, si vel in duobus punctis congruerent, etiam tota longitudine congruerent.

Ex

Ex eadem porro scaturigine manat omnium omnino triangulorum isoscelium pariter ac rectangulorum generis, omnium item rhomborum & parallelogrammorum rectangulorum, nec non singulorum affectiones inseparabiles.

Nam in isoscelibus quidem una cum æqualibus lateribus generantur æquales anguli. In rhombis verò opposita latera & anguli fiunt æquales. In rectangulis autem triangulis, quale est  $bcd$ , duo anguli acuti  $cbd$  &  $cdb$  semper æquipollent uni recto. Applicetur enim trianguli  $ace$  hypotenu-  
sa  $ae$  hypotenusæ  $db$  trianguli  $deb$ ; componetur ex ambobus triangulis figura rectilinea  $bcdh$ . Et eodem modo ex triangulis  $acd$  &  $bce$  componetur figura  $bcei$ . Cum verò  $dc, ce, hb, bi$  sint æquales; item  $db, cb, ei$  æquales; & rectæ  $dc, ce$  in directum sitæ: poterunt  $d$  &  $h$  puncta æquali motu descendere, & simul appellere,  $d$  quidem ad  $e$ ,  $h$  verò ad  $b$ ; & tum linea  $de$  congruet lineæ  $ce$ , &  $hb$  ipsi  $bi$ , & figura  $bcdh$  figuræ  $bcei$ , & angulus  $bdc$  angulo  $bce$ : & cum  $bce$  sit rectus; erit &  $bdc$  rectus. Sed  $bdb$  æqualis est ipsi  $cbd$ . Ergo  $cbd$  cum  $cdb$  æquipollet uni recto. q. e. d. Sunt ergo etiam figurarum rectangularum, qualis est  $bcdh$ , & latera & anguli oppositi æquales; & diameter  $db$  illas dividit in duas partes æquales.

*Introductio brevis.*

Jam, verò, cum  $i c e$  faciat cum  $d e$  duos angulos  $i c e$ ,  $i c d$  duobus rectis æquales; idem valebit in triangulis  $a c l$  &  $b c K$  eodem modo compositis, & per descensum aptatis; item quoq; in omnibus aliis triangulis à circulorum crescentium sectionibus simul productis. Quapropter recta rectæ insistens semper facit duos angulos duobus rectis æquales.

Rursus, cum *alterni*  $d a b$  &  $a b e$  sint æquales, & eorum *complementa*  $a b f$  &  $b a g$  itidem æqualia; sequitur, quòd inclinatio lineæ  $d a$  &  $a b$ , & hujus  $a b$  porro ad  $b f$ , æquales sint inclinationibus ipsius  $a b$  ad  $b a$ , & hujus  $b a$  porro ad  $a g$ : quare  $a d$  non magis annuit ad  $b f$ , quàm  $b e$  ad  $a g$ , nec  $a d$  producta citius occurret  $b f$  productæ, quàm  $b e$  occurrat ipsi  $a g$ . Cum verò  $e b f$  &  $d a g$  sint rectæ, non possunt sibi mutuo bis occurrere: ergo  $e b f$  &  $d a g$  nunquam concurrent, ideoque vocantur *Parallele*, quarum affectio inseparabilis est, quòd habeant angulos alternos  $d a b$  &  $a b e$  æquales.

Figuræ autem  $a d b e$ , &  $b c d b$ , parallelis lineis contentæ vocantur *parallelogramma*.

Possunt verò ex jam dictis perfacile derivari reliquæ triangulorum quorumcunque affectiones. Et primò quidem, quòd cujusque trianguli tres anguli æquales sint duobus rectis. Cum enim trianguli rectanguli tres anguli æquipolleanť duobus rectis, &

nullum non triangulum dividi possit in duo rectangula; æquipollebunt utriusque trianguli rectanguli duo acuti uni recto, & cum trianguli obliquanguli omnes anguli æquipolleant duorum rectangulorum acutis; patet cujusque trianguli tres angulos æquales esse duobus rectis

Patet quoque; si trianguli alicujus singula latera æqualia sint singulis alterius trianguli lateribus; etiam angulos congruere, & esse æquales. Nam si basis unius applicetur basi alterius, & intervallo unius lateris trianguli, ad quod fit applicatio, describatur unus circulus, & intervallo alterius lateris alter circulus: oportet, ut applicati trianguli latera sibi mutuo occurrant in communi circulorum sectione. Quoniam omnes rectæ, quæ æquales sunt trianguli applicati lateribus terminantur in periphæria sui quæque circuli; quare non possunt sibi mutuo occurrere, nisi in communi circulorum sectione. Congruentibus autem lateribus, non possunt non congruere anguli.

Patet denique, cujusque trianguli duo latera majora esse tertio. Nam si recta connectens centra circulorum contingentium sumatur pro basi; liquet, quod super ista basi constitui possit triangulum cujuscunque figuræ. Atqui illa latera nunquam concurrere possunt in ullo puncto, quod sit utrique periphæriæ commune, cum non  
tan-



tangent se in pluribus punctis, quàm uno. Ergo vel in unius tantùm circuli peripheria concurrent, vel in neutrius. Si in unius tantùm; jam unum quidem latus æquale est dimidiæ basi, at alterum majus; ergo ambo simul majora totâ basi. Sin in neutrius peripheria concurrent; vel erit punctum concursus extra utrumque circum, & jam utrumque latus majus dimidia basi; vel fiet occurfus intra alterutrum æqualium circum, & tum poterunt describi alii duo circuli, ita ut unus transeat per punctum concursus, alter verò eum tangat in aliquo puncto baseos; atque sic erit illud punctum rursus extra hunc alterum circum, cum non tangent se nisi uno puncto.

Quod si Problemata sectari lubeat, habemus hæc lineæ & anguli bisectionem, erectionem & demissionem perpendicularis, angulorum æqualium & linearum parallelarum descriptionem, quæ in Geometria utramque paginam faciunt. Sed properandum est nobis ad finem.

Interim tacendum non est, posse & parallelogramma & triangula cujuscunque generis etiam alio modo produci. Nam si recta insistat rectæ perpendiculariter, incipiatque moveri in transversum, ita ut singula ejus puncta æqualiter recedant à pristinis vestigiis; describetur isto motu parallogrammum rectangulum. Nam apex lineæ insi-

Ren-

stentis, à linea subjecta semper æqualiter distat, ideoque motu suo lineam describit parallelam. Et ad quemcunque situm pervenerit linea mota, semper tota æqualiter abest à quovis relictorum vestigiis, hoc est, semper parallela manet primo termino, unde excesserat. Quod si jam tantundem promoveat in transversum, quantum ipsa longitudine pollet; fit *quadratum*: sin plus, vel minus; fit *rectangulum alter à parte longius*.

Sin recta rectæ insistens non faciat quidem angulum rectum, attamen motu suo singula puncta æqualiter provehat, & tantundem excurrat in latum, quantum ipsa longitudine pollet; fit *Rhombus*: sin plus, vel minus; *Rhomboides*.

Eodem modo, si plana superficies, insitens planæ, moveatur ita, ut singula ejus puncta æqualiter procedant; fit *prisma*. Et si figura insitens sit parallelogrammum; corpus, quod generatur, est *parallelepipedon*, hoc est, parallelis superficiebus inclusum.

*Coni & Cylindri* genesin habetis apud Euclidem, ubi motu trianguli vel parallelogrammi, gyrante circa latus perpendiculare, producuntur: ne fortè soli videamur motum ad generandas magnitudines accersere.

Possunt verò & Conus & Cylinder aliter quoque produci; hic quidem, si circulus mergatur in profundum; ille vero, si inter mergendum a minimo continuò augeatur in maximum.

De

## *Introductio brevis.*

De parallelogramm<sup>i</sup>, prismatibus, parallelopipedis, Cylindris unum idemque est Theorema, quòd sint in eadem ratione eum lineis, quas singula puncta, dum generantur ipsæ magnitudines, motu suo describunt. Id quod ex definitione æqualium rationum manifestum est.

Redeundo verò ad Figuram Primam, si punctum quoddam incipiat moveri ab  $A$  versus  $D$ , & simul ex movente excrescat linea sursum, quæ semper ad  $A D$  obtineat eundem angulum, atque interea dum pervenit ad  $D$ , ipsa crescat ad altitudinem  $D B$ ; jam describetur duplici illo motu superficies  $A D B$ , quæ vocetur constans, & crescentes sint  $A a b$ ,  $A a c$ ; Dico, crescentem  $A a b$  ad constantem  $A D B$  habere *duplicatam rationem* ejus, quam habet crescens  $A a$  ad constantem  $A D$ ; ideò, quia eodem tempore bis crescit in ratione  $A a$  ad  $A D$ ; etenim dum crescit in longum in ratione  $A a$  ad  $A D$ , simul etiam crescit in latum in ratione  $a b$  ad  $D B$  (quæ eadem est cum ratione  $A a$  ad  $A D$ .) Eodem modo ratio  $A a c$  ad  $A D B$  duplicata est rationis  $A a$  ad  $A D$ .

Quòd si verò à singulis lineæ crescentis in altitudinem  $D B$  vestigijs descendant inter movendum totidem parallelogramma, crescentia simul in latum & profundum; jam describetur motu transverso istorum parallelogrammorum corpus solidum, quod  
voca-

vocatur *pyramis*. Oportet autem non modò lineam, quæ crescit in altitudinem  $DB$ , interea dum movetur, eundem semper ad  $AD$  angulum obtinere; sed & parallelogramma crescentia eodem semper modo inclinari ad superficiem  $ADB$ . Et quocunque articulo sistatur motus pyramidis crescentis, semper habebit pyramis sistens ad constantem *triplicatam rationem* ejus, quam habet latus sistentis ad latus constantis. Dico; pyramidem, cujus summitas est  $Aab$ , ad eam, cujus summitas est  $ADB$  esse in ratione lineæ  $Aa$  ad  $AD$  ter repetitâ. Dum enim latus, movente puncto, crescit in ratione  $Aa$  ad  $AD$ ; ipsa pyramis  $Aab$  crescit ter in eadem ratione, nimirum in longum, in ratione  $Aa$  ad  $AD$ , in latum in ratione  $ab$  ad  $DB$ , denique in profundum in ratione qua demerguntur parallelogramma.

Figuræ autem, quæ sic crescunt in ratione duplicata, vel triplicata, vocantur *similes*.

Hætenus igitur derivavimus ortum magnitudinum ex genuinis principiis, & ortarum affectiones ex ipsa genesi demonstravimus. Quam methodum, si, quibus vacat, persequi libuerit; habebimus aliquando Geometriam scientiam suo nomine dignam.



7. 7.

# ELEMENTA GEOMETRIAE.

LIBER PRIMUS  
*De lineis & angulis.*

I.



Er nomen *quantitatis* intelligimus rem, quæ comparata ad aliam ejusdem naturæ, major vel minor, æqualis vel inæqualis appellari potest: ut sunt extensio, numerus, pondus, tempus, motus; hæc omnia, in quantum ita comparari possunt secundum plus vel minus, sunt objectum Geometriæ.

2. Nihilominus subsistimus tantum in consideratione extensionis, utpote quæ exemplum & mensura omnium aliarum quantitatum esse potest.

A


3. Quan-

3. Quantitas, quæ extensionem tantum, habet in longitudinem sine ulla profunditate, appellatur *linea*; illa quæ extensa est in longitudinem & latitudinem dicitur *superficies*; & illa quæ longitudinem, & latitudinem & profunditatem habet, appellatur *corpus* sive *solidum*.

4. *Punctum* est initium quantitatis, quod concipitur ac si nullam haberet extensionem, & undiquaque indivisibile esset: sic extrema vel medium lineæ, sunt puncta.

5. Lineæ sunt vel *rectæ* vel *curvæ*: similiter superficies sunt vel *plana*, quæ *plana* dicuntur simpliciter: vel *curvæ*, quæ sunt vel *convexæ*, ut exterior superficies globi, vel *concavæ*, ut interior alicujus fornicis.

6 Quando duæ lineæ se mutuo tangunt in uno puncto, & postea altera ab altera recedit oritur inter illas *angulus*, qui *Rectilineus* dicitur, si duæ lineæ sunt rectæ, *a* *Curvilineus*, si sunt curvæ, *b*; *Mixtus*, si una, est curva, altera recta, *c*.



7. Angulus tanto minor esse dicitur, quanto magis lineæ quæ illum constituunt, ad se invicem inclinatæ sunt. Sumantur

duæ

duæ lineæ  $a b$  &  $a c$ , quæ se mutuo tangant in  $a$ ; si concipias, duas illas lineas moveri instar compassi, ita ut in  $a$ , tanquam clavo compassi, semper conjunctæ maneant, licet extremitas  $c$  recedat ab extremitate  $b$ ; tunc observabis, quo magis extremitates à se mutuo recedent, eo majorem quoque evadere angulum inter illas constitutum: & contra, quo magis extrema ad se mutuo accedunt, eo magis lineæ ad se invicem inclinatæ erunt, & hinc angulus minor erit.




8. Hinc bene notandum, magnitudinem angulorum non æstimari longitudine linearum, illos constituentium, sed linearum inclinatione Ex. gr.

angulus  $b$  est major angulo  $a$ , licet lineæ ang.  $b$  sint breviores: quoniam non sunt ita inclinatæ ad se

invicem, ut lineæ ang.  $a$ : clarius, imaginare ang.  $b$  esse impositum ang.  $a$ , ceu monstrant lineæ punctatæ, ang.  $b$  repræsentantes. Tunc videbis angulum  $b$  commodè intra se continere ang.  $a$ , lineasque ang.  $a$  magis ad se invicem inclinatas esse, quam lineas ang.  $b$ , & sic tandem ang.  $a$  multo minorem esse.

9. Angulus communiter tribus literis designatur, quarum media notat punctum contactus linearum. ut in fig. seq.  $dac$  notat angulum per duas lineas  $da$  &  $ca$  constitutum, ita ut  $a$  sit punctum commune, quo se lineæ mutuò tangunt

10. Si concipimus lineam  $ad$  in extremo  $a$  affixam medio lineæ  $bc$ , eamque præterea sinamus moveri circa punctum  $a$ , tunc quando illa redierit ad eundem locum, ex quo moveri cœperat, descripsit lineam



curvam, quæ appellatur *circulus*, vel potius *circumferentia* circuli, nam proprie loquendo, *circulus* est omne illud spatium, quod circumferentiæ includitur.

11. Pars circumferentiæ appellatur *Arcus*, ut  $cd$ .

12. Linea  $bc$  per circumferentiam terminata, appellatur *Diameter*, quæ dividit circulum in duas partes æquales, quod probare opus non est. Imò omnis linea recta ducta per *centrum* id est, punctum  $a$ , dividet circulum in duas partes æquales, & ipsa etiam erit *diameter*.


13. Linea  $ad$  vel  $ac$  quævis alia ducta è centro ad circumferentiam, appellatur *radius*, vel *semidiameter*.

14. Omnes




14. Omnes radii five semidiametri unius circuli sunt æquales.


15. Quando extremitas  $B$  æqualiter distat à duobus extremis diametri  $c$  &  $d$ , id est, quando  $B$  est in medio semicircumferentiæ; tunc linea  $Ba$  facit duos angulos  $Bac$  &  $Bad$ , qui recti vocantur, & utrinque sibi æquales sunt. Et si linea  $Ba$  producta fuerit versus  $e$  faciet quatuor angulos rectos, & novam constituet diametrum, quæ cum priori circulum dividet in quatuor partes æquales.



16. Tunc etiam lineæ dicuntur perpendiculares una ad aliam,  $Ba$  ad  $dc$ , &  $da$  ad  $Be$ .

17. Verum si  $b$  proximior est uni extremo diametri, quam alteri; tunc hæc linea dicitur *obliqua* & facit utrinque duos angulos inæquales, quorum minor appellatur *actus*,  $bac$ ; major vero *obtusus*,  $b ad$ . Et si linea  $ba$  fuerit producta usque ad  $e$ , erit illa nova diameter & infra duos novos angulos constituet: ita ut in universam adfiant quatuor anguli, quorum duo,






qui se tantum in puncto tangunt ut  $bac$  &  $ead$ , vel  $bac$  &  $cde$  appellantur *oppositi ad verticem*: illi vero, qui habent latus commune dicuntur *anguli deinceps*, ut  $dab$  &  $bac$ , vel  $bac$  &  $cae$  &c.

18. Anguli qui arcus æquales habent, etiam sunt æquales. Vt si probetur arcum  $cb$  esse æqualem arcui  $ed$ , etiam probatum erit angulum  $cab$  esse æqualem  $ead$ .

19. Duo anguli deinceps, simul sumti, semper æquales sunt duobus rectis. Nam linea  $dc$  est diameter, & cum illa circulum in duas partes æquales fecerit, erunt duo arcus  $cb$  &  $bd$ , simul sumti, æquales semicircumferentiæ. Sic etiam duo anguli  $cab$  &  $bad$  simul sumti, æquales erunt duobus rectis, quoniam semicirculum adimplent, æque ac duo recti.

20. Hac ratione hæc propositio est generalis; cum linea recta super




aliā lineam rectam consistit, duos angulos deinceps vel rectos, vel duobus rectis æquales efficit. Nam si lineæ sunt perpendiculares, ut  $Ba$  super  $dac$ , anguli utrinque sunt recti. (15) Si vero linea est obliqua, ut  $ba$  super eadem  $dac$ , tunc anguli quidem sunt inæquales; sed quantum obtusus  $bad$  superat rectum  $Bad$ , tantum etiam acutus  $bac$  superatur ab alio recto  $Bac$ . Et sic

pat-


parvitas unius compensatur magnitudine alterius.

21. Si duo anguli, latus commune habentes, æquales sunt duobus rectis, reliqua latera efficient lineam rectam. Sint anguli  $dab$  &  $bac$ , latus commune  $ba$  habentes, æquales duobus rectis, dico lineam  $ad$  cum linea  $ac$  constituere rectam lineam; (fig. art. 17.) quod manifestum est per jam dicta. Nam si è centro  $a$  ducatur circulus  $dbc$ , duo arcus  $db$ ,  $bc$  erunt æquales semicircumferentiæ, quoniam supponitur hos duos angulos æquales esse duobus rectis. Et sic lineæ  $da$ ,  $ac$  constituent diametrum & per consequens erunt posita in directum.

22. Si ex dato puncto  $a$  erigantur diversæ lineæ  $ab$ ,  $ac$ ,  $af$ ,  $ad$ , &c. illæ efficient diversos angulos; & omnes hi anguli simul sumti, vel si qui alii circa idem punctum constituerentur, erunt æquales quator rectis: Nam perspicuum est, omnes hos angulos complere circulum, cujus circumferentiam quoque dividunt in totidem arcus  $bf$ ,  $fe$ ,  $ed$ ,  $dc$ ,  $cb$ . Et sic omnes hi arcus simul sumti sunt æquales quatuor quadrantibus circuli, id est, omnes hi anguli sunt æquales quator rectis; nam etiam quatuor anguli recti adimplent circulum.



23. Anguli oppositi ad verticem sunt inter se æquales. Sint duæ lineæ rectæ  $dac$  &  $bae$ . dico angulum  $bac$  esse æqualem angulo  $ead$ : nam arcus  $eb$ , cum arcu  $bd$  constituit semicircumferentiam (12)



& eadem ratione arcus  $bd$  cum arcu  $de$  etiam facit semicircumferentiam. Hinc arcus  $bc$  est æqualis arcui  $de$ , quia arcus  $bd$  semper facit eandem quantitatem, siue conjungatur cum arcu  $bc$ , siue cum arcu  $de$ . Ob eandem rationem angulus  $dab$  est æqualis angulo  $cde$ .

24. Tota circumferentia circuli dividitur in 360 partes æquales, quæ *gradus* appellantur, & quilibet gradus in 60. partes æquales, quæ sunt *minuta*, & quodlibet minutum in 60. *secunda* & sic in infinitum. Et quando magnitudo angulorum determinanda est, numerantur gradus, quos illi comprehendunt. Ex. gr. quando nominamus angulum 90. grad. tunc intelligimus angulum rectum, quia angulus rectus comprehendit quartam partem circumferentiæ, quæ continet 90 gradus, quia tota circumferentia continet 360, quorum quarta pars est 90. Similiter angulus 60. grad. est angulus qui facit duas tertias recti.


25. Gradus in scribendo notantur cifra, quæ numeris vel imponitur vel à latere ad-

jun-

jungitur. Minuta notantur virgula una  $\cdot$ .  
 Secunda per duas virgulas  $\cdot\cdot$  : Tertia per  
 tres  $\cdot\cdot\cdot$  : Quarta per quatuor  $\cdot\cdot\cdot\cdot$  : &c. ut  
 $0\cdot1\cdot\cdot\cdot$ .

25. 32. 43. id est, 25. gradus, 32. minuta, 43.  
 secunda.


26. Dux lineæ dicuntur *Parallæla*, quan-  
 do illæ undique æqualiter à se invicem di-  
 stant. Dux lineæ  $ab$  &  $cd$  sunt parallelæ, si æ-  
 qualiter distant in  $ac$  & in  $bd$  vel in  $BD$  & in  
 quovis alio loco.



27. Hæc distantia mensuratur per per-  
 pendiculæ. Vt si quis concipiat ex puncto  
 $a$  lineam  $ac$  perpendiculariter cadere su-  
 per  $cd$  : & eodem modo  $b$   $d$  cadere per-  
 pendiculariter super  $cd$  ; statim cognoscat,  
 quod positis illis duobus perpendicularis  $ac$ ,  
 $bd$  æqualibus, etiam dux lineæ  $ab$  &  $cd$   
 æqualiter ab invicem distent in his locis ;  
 quod natura notum est sine ulteriori proba-  
 tione.

28. Dux lineæ parallelæ in infinitum  
 productæ, nunquam concurrunt ; nam cum  
 semper æqualiter distent, ubivis licebit per-  
 pendiculares ducere æquales  $ac$  aut  $bd$  :  
 & per consequens nunquam se contin-  
 gunt.

29. Si linea secat duas alias lineas parallelas, erit æqualiter inclinata ad utramque: & si linea secans duas alias, æqualiter ad




utramque inclinata est, hæc duæ erunt parallelæ.

Sint duæ lineæ parallelæ  $c a e$ ,  $d b f$  secatæ per

lineam  $g a b b$ , dico hanc lineam  $g a b b$  esse incli-

natam ad  $c a e$ , eadem ratione ac ad  $d b f$ : id est, angulum  $g a e$  esse æqualem angulo  $g b f$ . Hoc natura notum esse videtur, si modo exigua attentione perpendatur. Nam si angulus  $g a e$ , ex.gr. major esset, & linea  $a e$  magis remota ab  $a g$ , tunc punctum  $e$  lineæ  $a e$  inclinaret versus  $f$ , quia  $b f$  tantum non recederet, quantum  $a e$ : & sic duæ lineæ  $a e$  &  $b f$  non essent parallelæ. Vltcrius, si concipimus has duas lineas tanquam latera regulæ, poterimus totam regulam considerare tanquam lineam indivisibilem. Sic anguli  $b b d$  &  $c a g$  erunt ut anguli deinceps æquales duobus rectis (20. & ang.  $b b d$  &  $g a e$  erunt ut duo anguli oppositi ad verticem inter se æquales. (23.)

30. Quando linea secat duas parallelas,



efficit octo angulos, quorum quatuor  $a, b : b, g$ , sunt externi, reliqui sunt interni. Anguli  $c$  &  $f$  vel  $d$  &  $e$  appellantur alterni; ang.  $b$

&  $f$

&  $f$  vel  $a$  &  $e$  sunt *alternatim oppositi*: anguli  $d$  &  $f$ , vel  $c$  &  $e$  sunt *interni ad easdem partes* lateris.

31. Anguli alterni & alternative oppositi sunt inter se æquales  $b, f, c, h$ , &  $a, e, d, g$ . (29.)

32. Quando linea hac ratione incidit in duas parallelas, efficit angulos internos ad easdem partes æquales duobus rectis. Angulus  $d$  cum ang.  $f$  est æqualis duobus rectis, quia  $f$  est æqualis ang.  $c$  (31.) Sed  $c$  cum  $d$  facit duos angulos rectos: (20.) E m.

$f$  cum  $d$  faciet duos angulos rectos, Q. E. D.

33. Propositio quædam appellatur *conversa* alterius, quando facta conclusione ex aliquo quod suppositum erat, postea in propositione altera conversa id supponitur quod conclusum erat, ut exinde colligamus quod ab initio supponebatur. Ex gr hic dicimus, si lineæ sunt parallelæ, anguli  $d$  &  $f$  simul sumti æquales erunt duobus rectis, ubi supponimus lineas esse parallelas & exinde concludimus: E. anguli & c. Conversa sic fieret. Si anguli *interni ad easdem partes* lateris sunt æquales duobus rectis, lineæ erunt parallelæ: ubi ex supposito, hos angulos esse æquales duobus rectis, concludimus lineas esse parallelas.

34 Conversæ h. l. sunt veræ, nîm. si lineæ duas alias lineas secās angulos alternos &c. æquales facit, hæ duæ lineæ sunt parallelæ.

3. Si duæ lineæ sunt parallelæ uni tertiæ,

*a b* / inter se erunt parallelæ. Sit  
*c d* / linea *a b* parallela lineæ  
*e f* / & *e f* sit etiam parallela  
*c d*, dico *a b* esse parallelam  
*e f*: nam si ducatur linea

*b d f* omnes tres secans, angulus *b* erit æqualis ang. *d* (31.) & eodem modo angulus *f* erit æqualis angulo *d*: 31. E angulus *e* est æqualis ang. *f*; quia axioma est, si duo sunt æqualia eidem tertio, inter se sunt æqualia. Quoniam igitur angulus *b* est æqualis ang. *f*, sequitur lineam *a b* esse parallelam

lineæ *e f*. (34)







## LIBER SECUNDUS

*De Triangulis.*

I.

**F**igura est spatium undique circumscriptum. Si lineæ illam terminantes sunt rectæ, appellatur figura *rectilinea*: si curvæ sunt, appellatur *curvilinea*; & si partim rectæ partim curvæ, vocatur *mixta*.

2. Figuræ sunt vel *planæ*, quæ sunt in superficie plana, vel *solide*, quæ sunt corpus cum tribus dimensionibus. Hic agimus tantum de figuris planis.

3. Omnes lineæ, quæ figuram circumscribunt, simul sumptæ, constituunt *circumferentiam*, vel *Perimetrum*, vel *circuitum* figuræ.


4. Ex omnibus figuris planis curvilineis vel mixtis, circulus tantum consideratur, vel pars circuli, terminata arcu & una vel pluribus lineis rectis.

5. Inter figuras rectilineas simplicissima est *Triangulum*, quod terminatur tribus lineis, tres angulos constituentibus.

6. Triangulum, habens angulum rectum, appellatur *Triangulum rectangulum*, *a*: habens angulum




obtusum, appellatur *obtusangulum* vel *Amblygonium*; habens tres angulos acutos, dicitur *acutangulum* vel *Oxygonium*, *e*.



7. Quando triangulum omnia latera habet inæqualia, appellatur *Scalenum*, *a*, : *b*: Si duo latera sunt æqualia, est *isofceles*, *e*: si omnia latera sunt æqualia, est *equilaterum*, *e*.

8. Si duo saltem latera trianguli sumuntur, appellari possunt *crura*, & tertium tunc appellabitur *basis*. Omnes latus potest sumi pro base.

9. In omni triangulo tres anguli simul sumti sunt æquales duobus rectis. Sit trian-




gulum *a b c*, dico angulum *a*, una cum angulo *c*, & ang. *a b c* respondere duobus rectis: nam si concipiamus lineam *b d*

esse parallelam lineæ *ac*, hæc duæ lineæ parallelæ secantur per tertiam *b c*, & per consequens anguli alterni erunt æquales, id est, ang.

angulus  $e$  est æqualis ang.  $c b d$  (1. 31.) Vlt. rius, linea  $b a$  incidens in lineas parallelas  $b d$  &  $a c$ , facit angulos internos ad easdem partes lateris æquales duobus rectis (1. 32. id est, angulus  $a b d$ ,  $b$ ..... $d$  una cum angulo  $e$  est æqualis duobus rectis.

Sed angulus  $a b d$  est compositus ex duobus angulis, quorum alter est  $a b c$  (unus ex numero trium angulorum ipsius trianguli) alter  $d b c$ , quem æqualem esse diximus ang.  $c$ . E. m. tres anguli, nim.  $a b c$ , una cum  $e$  &  $a$  duobus rectis æquales erunt; Q. E. D.




10 Producta basi cujuscunque trianguli, angulus externus est æqualis duobus internis oppositis. Sit triangulum  $a b c$ . & producaturs latus  $c a$  ad  $e$ , habebis angulum  $b a e$ , qui appellatur angulus *externus* trianguli. Jam dico  $b$  angulum hunc externum  $b a e$  esse æqualem duobus angulis  $b$  &  $c$



$c$ , qui sunt *interni oppositi*; nam hi duo anguli  $b$  &  $c$  cum tertio  $b a c$  simul sumti faciunt duos rectos, (per præced.) & similiter hic tertius angulus  $b a c$  cum angulo  $b a e$  facit etiam duos rectos: (1. 20.) E. anguli  $b$  &  $c$  simul sumti tantum faciunt, quantum angulus  $b a c$ ; Q. E. D.

11. Si triangulum  $ABC$  habeat duo latera  $AB$  &  $AC$  æqualia duobus lateribus  $a b$  &  $a c$  alterius trianguli; & si præterea angulus  $A$  sit æqualis angulo  $a$ : dico tertium latus




$BC$  etiam  
esse æqua-  
le  $bc$  &  
angulum  
 $B$  angulo  
 $b$  &  $C$  ang

gulo  $c$ , & totum triangulum  $ABC$  toti trian-  
gulo  $abc$ . Nam si concipiamus triangulum  
 $abc$  esse superimpositum triangulo  $ABC$ , ita  
ut latus  $ab$  exacte respondeat  $AB$ , quod illi  
æquale est, tunc etiam latus  $ac$  cadet super  
 $AC$ , quia supponitur angulum  $a$  esse æqua-  
lem angulo  $A$ ; & sic punctum  $c$  cadet super  
 $C$ , quia  $ac$  est æquale  $AC$ : E. m.  $bc$  cadet  
super  $BC$ , & per consequens ipsi erit æqua-  
le; similiter angulus  $c$  erit æqualis angulo  
 $C$ , & angulus  $b$  angulo  $B$ , & totum trian-  
gulum toti triangulo, quoniam omnia ita  
sibi congruunt, ut triangulum superim-  
positum, neque excedat alterum, neque ab  
eo excedatur.

12. Figuræ, quæ sibi exacte respondent,  
si una superposita fuerit alteri, dicuntur fi-  
guræ congruæ, quæ mutuo sibi congruunt:  
& hoc est axioma generale, quæ mutuo sibi  
congruunt, æqualia sunt.


13. Etiam conversa præcedentis propositionis vera est; nimirum, si triangulum habet tria latera æqualia tribus lateribus alterius trianguli, omnes anguli unius etiam æquales erunt angulis alterius, & area seu spatium unius trianguli erit quoque æquale a-



rea alterius: Vt si  $AB$  est æquale  $ab$ , &  $AC$ ,  $ac$ , &  $BC$ ,  $bc$ : dico angulum  $A$  esse æqualem angulo  $a$ , &  $B$  angulo  $b$ , &  $C$  angulo  $c$ , totumque triangulum  $ABC$  toti triangulo  $abc$ ; quod non indiget probatione.

14. Si angulus  $A$  est æqualis ang.  $a$ , & angulus  $B$  ang.  $b$ , & latus  $AB$  lateri  $ab$ ; erit etiam latus  $AC$  æquale lateri  $ac$ , &  $BC$  lat.  $bc$ , & totum triangulum  $ABC$  toti triangulo  $abc$ ; quod facile probari potest per præcedentes.

15. In omni triangulo Isoscele duo anguli quos crura æqualia ad basin constituunt, sunt inter se æquales. Sit triangulum  $abc$ , cujus crus  $ab$  sit æquale  $ac$ , dico angulum  $b$  esse æqualem angulo  $c$ : nam si concipiamus basin  $bc$  esse divisam æqualiter in  $d$ , linea  $ad$  efficiet duo triangula  $adc$  &  $adb$ , & tria latera unius trian-




guli



guli erunt æqualia tribus lateribus alterius; nam  $ac$  est æquale  $ab$  per hypothesein vel suppositionem ipsius propositionis; &  $dc$   $db$ , quia hic supponimus basim  $bc$  esse æqualiter divisam in  $d$ . Tertium latus  $ad$  est commune utrique triangulo: sic tria latera unius sunt æqualia tribus lateribus alterius, & per consequens totum triangulum  $adc$ , & angulus  $c$  ang  $b$ ; (2. 13.) Q. E. D.

16. In omni triangulo isoscele, si linea cadens ex angulo verticis dividit basim bifariam, id est, in duas partes æquales, tunc ad eandem basim perpendicularis est, ac angulum quoque verticis bifariam secat: nam angulus  $adc$  est æqualis ang.  $adb$  per præcedentem: & per consequens uterque rectus est, & linea  $ad$  est perpendicularis ad  $bc$  (1. 15.) Similiter angulus  $dac$  est æqualis angulo  $dab$ , per præcedentem.

17. Omnis trianguli majus latus majorem angulum subtendit; id est, majori angulo oppositum est.




Sit latus  $bc$  majus latere  $ac$  dico angulum  $a$  subtensum à latere  $bc$  esse majorem ang.  $b$ , qui subtenditur à latere  $ac$ : nam cum  $bc$  sit majus  $ca$ , concipe  $cd$  esse æquale  $ca$ , ita ut  $adc$  sit triangulum isosceles: Ergo (2. 15.) angulus  $cad$  erit æqualis angulo  $acd$ . Sed angulus

gulus  $c a b$  est major angulo  $c a d$ , totum enim est majus sua parte. Ergo angulus  $c a b$  est major angulo  $c d a$ . Vltcrius, cum angulus  $c d a$  sit externus respectu minoris trianguli  $d a b$ , major erit solo interno  $b$ : (2.10.) Ergo multo magis, angulus  $c a b$  erit major angulo  $b$ . Q. E. D.

18. Omnes triangulum necessario habere debet duos angulos acutos: nam si tantum unum haberet, reliqui duo essent vel obtusi, vel recti, vel unus obtusus & alter rectus. Sed nullum horum esse potest, cum (2.9.) omnes anguli simul sumti duos tantum rectos faciant.

19. Omnium linearum quæ duci possunt à puncto dato ad lineam datam, brevissima est perpendicularis & illæ sunt longiores, quæ magis recedunt à perpendiculari. Sit data linea  $a d$  & punctum datum  $b$ ; sit præterea  $b a$  perpendicularis ad  $d a$ , à qua  $b c$  magis remota sit quam  $b a$ :



dico  $b a$  esse brevissimam omnium linearum possibilium, ex. gr.  $b c$ : & præterea,  $b c$  esse longiorem  $b a$ : Nam in triangulo  $a b c$  angulus  $a$  est rectus, & per consequens maximus omnium, quia reliqui duo necessario esse debent acuti: (2.18.) Ergo latus  $b c$  est majus latere  $b a$ . (2.17.) tanquam subtensum majori angulo. Similiter in triangulo

gulo  $bce$  angulus  $bce$  est obtusus, quia angulus  $bca$  est acutus, & per consequens latus  $be$  erit majus latere  $bc$  (2. 17.) tanquam subtendens majorem angulum.


20: In omni triangulo duo latera simul sumpta majora sunt tertio. Sit triangu-

lum  $abc$ , dico latus  $ab$ , una cum  $ac$ , esse majus solo  $cb$ : Nam sit producta  $ba$  & concipiatur  $ad$  æquale  $ac$ , erit triangulum  $adc$  isosceles, & per consequens an-



gulus  $acd$  erit æqualis angulo  $d$ : (2. 15.) Ergo angulus  $dcb$ , qui major est ang.  $dca$ , etiam major erit ang.  $d$ : Jam si conciperes  $bdc$  tanquam unum triangulum, latus  $bd$  erit majus latere  $cb$ , (2. 17.) tanquam subtensum angulo majori. Sed  $bd$  est æquale duobus lateribus  $ba$ ,  $ac$ , quia  $ad$  est æquale  $ac$ : Ergo duo latera  $ba$ ,  $ac$  sunt majora  $bc$ ; Q. E. D.

21. Et si hæc propositis demonstrata sit, nihilominus pro principio natura noto admitti potest. Nam linea  $cb$ , cum sit



recta, facit viam brevissimam à puncto  $c$  ad punctum  $b$ , dum interim reliquæ  $cab$ , vel etiam  $cd b$  vel  $ceb$  circuitum faciunt, & per consequens longiorem viam absolvunt. Similiter illud cum Archime-



de pro principio ponere possumus, illarum linearum quæ tales circuitus faciunt, istas esse longiores, quæ suo ambitu alias circumscribunt vel includunt, & sic  $cdb$  esse longiorem  $ceb$ , &  $cab$  longiorem  $cdb$ ; quod tamen intelligendum non est de illo casu, ubi lineæ efficiunt figuram dentatam, ut in hac figura, ubi lineæ  $cffb$  longiores esse possunt  $cab$ , non obstante quod circumscribantur circuitu  $cab$ .






## LIBER TERTIUS.

*De Quadrilateris, & Polygonis.*


**F**iguræ terminatæ quatuor lineis rectis quatuor angulos efficientibus, appellantur *quadrilatera*.

2. Quando lineæ oppositæ sunt parallelæ, quadrilaterum appellatur



*parallelogrammum*, a; si non, appellatur simpliciter *Trapezium*, b.

3. Si parallelogrammum omnes quatuor angulos rectos habuerit, dicitur *parallelo-*




*grammum Rectangulum* c, vel brevitatis gratia, *Rectangulum*: & si præter hæc etiam omnia

latera sunt æqualia, dicitur *quadratum*, d.

4. Si omnia latera æqualia quidem sunt, anguli vero non, tunc parallelogrammum dicitur *Rhombus*.

5. Si parallelogrammum neque angulos neque latera æqualia habet, dicitur *Rhomboides*, e.

6. In omni parallelogrammo anguli oppositi sunt æquales. Sit parallelogrammum  $o b c d$ , dico angulum  $o$  esse æqualem angulo  $c$ : nam angulus  $o$  est æqualis angulo exteriori  $o$  (1.31.) &  $b$  est æqualis  $c$ : (1.31.) ergo etiam  $o$  est æqualis  $c$ .




7. Linea ducta ex angulo ad angulum oppositum, dicitur *Diagonalis* vel *Diameter*, ut  $b d$ .

8. Omne parallelogrammum dividitur bifariam, id est, in duas partes æquales, per diagonalem. Diagonalis  $b d$  dividit parallelogrammum  $o b c d$  in duo triangu-  
la  $o b d$  &  $b c d$ . Probandum igitur erit hæc duo triangu-  
la esse æqualia. 1. angulus  $o$  est æqualis angulo  $c$ . (3.6.) 2. angulus  $o b d$  est æqualis ang.  $c d b$ : (1.6.) & ob eandem rationem etiam angulus  $o d b$  est æqualis ang.  $c b d$ . Habent igitur hæc duo triangu-  
la omnes angulos reciproce æquales; & præterea, latus  $b d$  est commune utrique triangulo: E. etiam totum triangulum  $o b d$  est æquale toti triangulo  $c b d$  (2.14.)

9. In omni parallelogrammo latera opposita sunt æqualia inter se, quoniam totum triangulum  $o b d$  est æquale toti triangulo  $d c b$  per præcedentem: E. etiam latus  $c d$  erit æquale lateri  $b o$  & latus  $o d$  lateri  $b c$ ;  
Q.E.D.

10. Duo

10. Dux diagonales  $ac$  &  $bd$  secant se mutuo in medio  $e$ ; nam in triangulis  $aed$  &  $bce$ , latus  $ad$  est æquale lateri  $cb$



(3.9) angulus  $ead$  est æqualis ang.  $ecb$ , (1.31) ob eandem rationem angulus  $aed$  est æqualis ang  $ceb$ ; (1.31) & ulterius angulus  $aed$  est æqualis ang.  $ceb$ , (1.23.) quia ipsi ad verticem oppositi. E. latus  $de$  est æquale lateri  $be$  & latus  $ae$  lateri  $ce$  (2.14.) Sic igitur dux diagonales sunt divisæ æqualiter in  $e$ .

11. Omnis linea recta  $fg$ , transiens per medium diagonalis  $e$  dividit parallelogrammum in duas æquales partes. Probandum est, trapezium, id



est, quadrilaterum irregulare,  $afgd$  esse æquale trapezio,  $cgfbc$ . 1. triangulum  $bef$  est æquale triangulo  $d eg$ : nam latus  $de$  est æquale  $eb$  per hypothefin; angulus  $f$  est æqualis angulo  $g$ ; (1.31.) angulus in  $e$  utrinque est æqualis, quia est oppositus ad verticem & c. E. triangulum  $feb$  est æquale triangulo  $ged$ . (2.14.) 2. totum triangulum  $adb$  est æquale toti  $cbd$ . (3.8.) Ergo si de triangulo  $adb$  auferatur parvum triangulum  $feb$  & per compensationem ei iterum addatur triangulum  $d eg$ , resultabit trapezium  $afgd$  æquale triangulo  $adb$ , medietatis. s. semissi totius parallelogrammi.

Q.E.D.

12. Si

12. Si in diagonali  $bd$  sumatur punctum  $e$ , perque illud transeant duæ lineæ lateribus parallelæ, nim.  $gef$  &  $he i$ ; resultabunt quatuor parallelogramma, nim.  $efbi$ ,  $ehdg$ ; (& hæc duo appellantur *parallelogramma circa diametrum*) & reliqua duo parallelogramma  $ebaf$ , &  $eicg$ , quæ appellantur *complementa*:




duo verò complementa cum uno parallelogrammo circa diametrum efficiunt figuram, quæ vocatur *gnomon*, quale hic est spatium lineis notatum.

13. In omni parallelogrammo *complementa* sunt æqualia. Probandum erit  $ebaf$  esse æquale  $egei$ . Totum triangulum  $bda$  est æquale toti triangulo  $bdc$  (3. 8.) Similiter triangulum  $efb$  est æquale triangulo  $ebi$ , (3. 8.) & etiam  $ehd$  est æquale  $egd$ : (3. 8.) Ergo si ab æqualibus triangulis  $bda$ , &  $bdc$ , auferantur æqualia, nimirum si auferantur ab una parte  $efb$ , &  $ehd$ , & ex altera parte  $ebi$ , &  $egd$  restabit ab una parte parallelogrammum  $ebaf$  æquale parallelogrammo  $eicg$ , quod restat ab altera parte. Q.E.D.

14. Parallelogramma quæ sunt super eadem basi, & in iisdem parallelis, sunt inter se æqualia. Sit parallelogrammum  $abdc$ , & aliud  $abfe$ , ita ut basis


B

ab



$a b$  sit communis utrique, & linea  $c d$  producta transeat per  $e f$ ; simulque hac ratione duo parallelogramma inter duas parallelas constituentur, nimirum inter lineam  $a b$  & lineam  $c f$ , parallelam lineæ  $a b$ : Dico parallelogrammum  $a b d c$  esse æquale  $a b f e$  1.  $c d$  est æquale  $e f$ , quia tam hæc quàm illa æquales sunt lineæ  $a b$ : (3. 9.) Ergo si hisce duabus lineis æqualibus addamus lineam  $d e$ ; erit  $c e$  æqualis  $d f$ . 2.  $c a$  est æqualis  $d b$  (3. 9.) 3. angulus  $a c e$  est æqualis angulo  $b d f$ : (1. 3.) Ergo totum triangulum  $a e c$  est æquale toti  $b f d$ . Si jam de quovis horum triangulorum æqualium auferatur triangulum album  $d e o$ , quod est inter duo parallelogramma, & cuiusvis illorum etiam addatur triangulum lineis contrariis notatum  $a b$ ; resultabit ex hisce ab una parte parallelogrammum  $a b d c$  æquale parallelogrammo  $a c f b$ , ab altera parte constituto.

15. Parallelogramma, quæ sunt in eisdem parallelis  $a b$  &  $c f$  &




super æqualibus basibus, alterum super  $a b$ , & alterum super  $g b$ , ita ut  $a b$  æqualis sit  $g b$ , sunt æqualia. Nam si quis concipiat tertium parallelogrammum  $a c f b$ , hoc æquale

erit

erit  $a b d c$ , (3. 14.) quoniam est super eadem basi  $a b$ , & in iisd. parallelis  $a b$  &  $c f$ : Et idem hoc parallelogrammum  $a e f b$  etiam est æquale  $a b d c$ , quia utrumque habet eandem basin, nimirum  $c f$  (nihil enim refert siue basis sit in inferiori linea  $c f$ , in superiori) & sunt in iisd. parallelis, nimirum  $f c$ , &  $b a$ . Ergo etiam  $b f e g$  est æquale  $a b d c$ , quia sunt æqualia uni tertio  $a e f b$ .

16. Triangula super eadem basi  $a b$  & inter easdem parallelas  $a b$  &

$c e$  constituta sunt æqualia. Triangulum  $a b c$  est æquale triangulo  $a e b$ , quia si quis concipiat lineam  $b d$  parallelam  $a c$



& aliam  $b f$  parallelam  $a e$ , resultabunt duo parallelogramma  $a c d b$ , &  $a e f b$ , quæ cum sint super eadem basi & in eisdem parallelis, erunt æqualia. (3. 14.) Sed triangulum  $a c b$  est dimidium parallelogrammi  $a c d b$ , & triangulum  $a e b$  est dimidium parallelogrammi  $a e f b$ : (3. 8.) Ergo hæc duo triangula inter se sunt æqualia.

17. Triangula super æqualibus basibus constituta & in iisdem parallelis, inter se sunt æqualia. Demonstratio est facilis.

18. Si triangulum cum parallelogrammo eandem basin habuerit, in eisdemque fuerit parallelis, dimidium erit parallelogrammi. Triangulum  $a b c$  est dimidium parallelogrammi  $a e f b$ .

19. *Pentagonum* est figura quinque laterum & quinque angulorum. Si omnia latera sunt æqualia, & omnes anguli æquales, pentagonum est *regulare*.

20. *Hexagonum* est figura sex laterum & totidem angulorum; *Heptagonum* septem; *Octogonum* octo &c. quæ quoque regularia sunt, si omnes anguli & latera omnia inter se æqualia sunt.

21. *Polygonum* in genere omnis dicitur figura, quæ pluribus comprehensa lateribus, plures efficit angulos: sed vocabulum hoc raro adhibetur, nisi figuræ pluribus quam quatuor aut quinque lateribus constent.

22. Omne polygonum dividi potest in tot triangula, quot habet latera. Si intra figuram sumatur punctum *a*, ubicunque id fuerit, & ex eo concipiantur ductæ lineæ versus quemcunque angulum *ab*, *ac*, *ad* &c. tot erunt triangula, quot fuerint latera polygoni.

23. Anguli polygoni omnes simul sumti conficiunt bis tot rectos, demtis quatuor, quot sunt latera polygoni. E.gr. si polygonum habet septem latera, quorum duplum est 14 ab iisque auferantur quatuor,



restant decem: dico omnes angulos hujus heptagoni, nimirum angulum *ebh* una cum *bbg* & *bgf* &c. simul sumtos esse æquales his decem angulis



rectis. Nam si ex puncto  $a$  ducantur ad angulos septem lineæ  $ab$ ,  $ac$ ,  $ad$  &c. ad constituenda septem triangula quodlibet horum triangulorum habebit tres angulos duobus rectis æquales : (2.9.) ita ut omnes anguli simul sumpti in septem triangulis æquales sint 14. rectis. Sed quodlibet horum triangulorum unum habet angulum circa verticem in puncto  $a$  ; ita ut, si omnes ponerentur circa hoc punctum, totum circuitum implerent. Ergo hi septem anguli coeuntes ad punctum  $a$  æquales sunt quatuor rectis, (I. 22.) & per consequens omnes reliqui anguli, qui conficiuntur ab ipsis lateribus heptagoni, æquales sunt decem rectis; Q E D.

24 Polygonum etiam resolvi poterit in in triangula, ducendo lineas ab angulo ad angulum; sed tunc numerus laterum excedit numerum triangulorum duobus.






## LIBER QVARTVS

## De Circulo.

1.

**L**inea circulum *tangere* dicitur, quæ cum circulum tangat, non tamen eum secat, licet producatul ultra punctum contactus. Linea *a* tangit circulum *c* prout etiam circulus *c* tangit circulum *d*: sed in *b* linea circulum transiit eumque secat.



2. Linea transiens per circulum eum secat in duas partes, quæ appellantur *segmenta*, *e* est segmentum *minus* & *f* *maius*; hæc linea secans dicitur *chorda* & partes circuli sectæ *arcus*. Chorda cum arcu constituit in duobus extremis duos angulos mixtos, qui appellantur *anguli segmenti*, ut *ebf*.




3. Si in arcu segmenti sumatur punctum *c* ubicunque id fuerit, & concipiantur duæ lineæ *c a*, *c b*; illæ constituent ang. *acb* qui vocatur *angulus in segmento*: & hic ang. *acb* *insistere* dicitur *arui alterius segmenti inferioris*.

4. *Secor*

4. Sector circuli est triangulum mixtum, duabus semidiamentris  $a b$ ,  $a c$ , & arcu circuli  $b c$ , comprehensum. Sector hic notatus est lineolis.



5. Si ad extremitatem semidiamentri  $a b$ , concipiatur perpendicularis  $b d$ , illa tanget circulum in unico puncto  $b$ ; & quodvis aliud punctum lineæ  $b d$  erit extra circulum situm. Ex. gr.




punctum  $d$  est extra circulum; nam si concipiatur linea  $a d$  ducta ex centro, quæ secet circulum in puncto  $c$ , erit illa  $a d$  major  $a b$ , (2.19.) & per consequens major quam  $a c$ , quia  $a c$  est æqualis  $a b$ : (1.14.) E. punctum  $d$  cadit extra circulum. Q.E.D.

6. Chorda quædam  $b c$  dividitur bifariam per perpendicularem  $a d$ , per centrum  $a$  ductam; nam triangulum  $a b c$  est Iſosceles, quoniam  $a b$  est æquale  $a c$ : (1.14.) E. perpendicularis  $a d$



secat basin  $b c$  in duas partes æquales (2.16.) Et arcus quoque  $b c$  est divisus bifariam.


7. Si duæ lineæ  $d b$  &  $d c$  tangent circulum, erunt æquales. Nam concipiantur à centro ad puncta contactus lineæ ductæ  $a b$  &  $a c$ , erunt hæ perpendicularares ad tangentes. (4.5.) Vlt-





anguli, quorum alter  $a c b$  vocatur *angulus ad centrum*, alter  $a d b$  *angulus ad circumferentiam*.


11. Angulus ad centrum  $a c b$  semper duplex est anguli ad circumferentiam  $a d b$ . 1. Si una linea, ut  $b d$ , transeat per centrum  $c$ , angulus  $a c b$  erit externus respectu trianguli  $a c d$  (2. 10.) & per consequens erit



æqualis duobus angulis internis oppositis, nim. angulo  $a d c$  & ang  $d a c$ : (2. 10.) Sed hi duo anguli  $a d c$  &  $d a c$  inter se sunt æquales. (2. 15.) quia duo crura  $c a$  &  $c d$  sunt æqualia: (1. 14.) Ergo angulus  $a c b$  est duplex unius horum duorum. nim.  $a d c$ ; Q.


E. D. 2. Si linea quædam  $a d$  vel  $b a$  non transeat per centrum  $c$ ; concipiatur  $d c e$ , ita ut  $e$  sit extra arcum  $a b$ :

Tunc totus angulus  $a c e$  erit duplex anguli  $a d e$ , per casum primum hujus propositionis; & similiter angulus  $b c e$  est duplex anguli  $b d e$ :




Ergo si de angulo  $a c e$  auferatur  $b c e$  & de angulo  $a d e$ , (qui est semissis anguli  $a c e$ ) auferatur  $b d e$ , (qui etiam est semissis anguli  $b c e$ ) erit residuum  $a d b$  dimidium  $a c b$ : quia axioma est, si quantitas est dupla alterius, & auferatur à majori duplum illius quod auferitur à minori, quod resi-

duum est in majori erit etiam duplum residui in minore: vel si totum totius est duplum, & ablatum ablati, erit & reliquum reliqui duplum. 3. Si punctum  $e$  cadit intra arcum  $ab$ , tunc angulus  $ace$  erit duplex anguli  $ade$  & angulus  $bce$  erit etiam duplex ang.  $bde$ , quod jam in primo casu hujus propositionis demonstratum erat, ergo



angulus totus  $acb$  est duplex ang.  $adb$ .

12. Omnes anguli qui insunt eidem arcui  $ab$  sunt inter se æquales,




in quocunque loco circumferentiae etiam fuerit illorum punctum verticale. Angulus  $acb$  est æqualis angulo  $adb$ , quia uterque est semissis anguli  $aceb$ , qui est ad centrum  $c$ .

(4.11.)




13. Angulus ad centrum  $ace$ , insistens medietati arcus  $ab$  cui insistit alius angulus ad circumferentiam  $adb$  est æqualis eidem angulo ad circumferentiam. (4.11.)



14. Angulus  $adb$ , qui insistit semicircumferentiae, est rectus; nam si  $e$  dividat bifariam semicircumferentiam  $acb$ , angulus  $ace$  erit

rit æqualis ang.  $a d b$  per præcedentem. Sed  $a c e$  est reclus: (I. 15.) E etiam  $a d b$  est reclus


15. Angulus  $a d b$  in minori segmento est obtusus, quia cum arcus  $a e b$  sit major semicircumferentia, erit etiam arcus  $b e$ , qui  $a$  est semissis arcus  $a e b$ , ma-




ior 90. Et angulus  $a d b$  qui est æqualis angulo  $b c e$ ,

(4. 13.) erit major 90; id est, erit obtusus.

16. Angulus  $a d b$  in majori segmento est acutus: nam est æqualis angulo  $a c e$ . Sed cum arcus  $a e b$  sit minor semicircumferentia, arcus  $a e$  qui est semissis  $a e b$ , erit minor 90. grad.




17. Si recta linea  $g a b$  tangat circulum in puncto  $a$  & alia linea  $a e$  secuerit eundem circulum, angulus  $b a e$  erit æqualis angulo in segmento opposito  $a b e$ : Et angulus  $e a g$  erit æqualis angulo in altero segmento  $a f c$ : Nam con-



cipiatur perpendicularis  $a d$ , quæ tranſſit per centrum  $c$ , (4. 5.) quo ipſo angulus  $a e d$  erit reclus: (4. 14.) & per conſequens, quia tres anguli unius trianguli ſunt æquales


duobus rectis (2. 9. angulus  $e a d$  unà cum angulo  $a d e$  constituet unum rectum. Sed idem  $e a d$  cum  $e a b$  etiam efficiunt rectum, quia  $a a$  est perpendicularis ad  $a b$ : E. angulus



$e a b$  est æqualis  $a d e$ , & per consequens omni angulo, qui insidet eidem arcui  $a e$  & punctum quodvis habuerit in circumferentia, ut ang.  $e b a$ , quia omnes hi anguli inter se sunt æquales; (4. 12.) Et hæc est prima pars hujus propositionis. Nunc probandum est, angulum  $e a g$  esse æqualem ang.  $a f e$ ; quæ est altera pars. In triangulo  $a e f$ , angulus  $a f e$  una cum  $f a e$  &  $f e a$  est æqualis duobus rectis, (2. 9.) Sed angulus  $f e a$  est æqualis  $f a b$ , per jam demonstratam in parte prima hujus propositionis; nam linea  $f a$  considerari potest ut secans circumulum & tangentem  $b a$ , in quo casu angulus  $f a b$  debet esse æqualis omni angulo, qui fieri potest in segmento opposito  $f d b a$ . Sed angulus  $f e a$  est in hoc segmento, quia insidet arcui  $f a$  & ejus punctum  $e$  incidit in punctum quoddam circumferentiæ  $f e d b a$ , ut ita angulus  $f e a$  æqualis sit ang.  $f a b$ . Porro duo anguli  $e a f$  &  $f a b$  unà cum  $a f e$  sunt æquales duobus rectis. Sed idem  $e a f$  &  $f a b$  unà cum  $e a g$  sunt etiam æquales duobus rectis: (1. 20.) Ergo angulus  $e a g$  est æqualis ang.  $e f a$ , Q. E. D.



18. Figura rectilinea *circa circumulum* describi dicitur, cum singula latera ejus circuli peripheriam tangunt. Triangulum *a c d* *circa circumulum* *b g f* descriptum est, quia quodlibet latus hujus trianguli tangit circumulum in *b*, in *g*, in *f*.




19. Figura *circulo inscribi* dicitur, cum singuli ejus anguli tetigerint circumferentiam, ut triangulum *a b c* in figura sequente.

20. Omne triangulum *a b c* inscribi potest circulo: nam si quis concipiat duas lineas *c i* & *c o*, quæ latera *a b* & *b c* perpendiculariter, & medio secent, tunc ex puncto *c* tanquam centro duci poterit circulus per punctum *b*. Sed dico hunc circumulum quoque transiturum per puncta *a* & *e*: nam 1. duo triangula *c i b* & *c i a* erunt æqualia, quia latus *i b* est æquale lateri *i a* per hypothesin, latus *c i* est commune, & angulus *a d i* est utrinque rectus: Ergo (2. 11.) latus *c b* est æquale lateri *c a*. 2. Ob eandem rationem probari poterit latus *c c* esse æquale *c b*. Et per consequens circulus, cujus centrum erit *c*, & semidiameter *c b*, transibit per *a* & *e*.



21. Triangulum  $a c d$  (fig. art. 18.) potest describi circa circulum. Nam si concipiantur duæ lineæ  $a e$  &  $d e$ , qui dividant bifariam angulum  $a$  &  $d$ ; Et postea quoque lineæ perpendiculares ad latera trianguli, *nim.*  $e b$ ,  $e f$ ,  $e g$ , dico, si quis circulum ducat ex centro  $e$  per  $b$ , hunc circulum tangere tria latera trianguli in punctis  $b$ ,  $f$ ,  $g$ . Nam 1. duo triangula  $a e b$ ,  $a e f$  sunt æqualia: Habent enim latus  $a e$  commune, angulum ad  $b$  &  $f$  rectum, & alium angulum ad  $a$  æqualem, quia angulus  $b a f$  est divisus bifariam: Ergo latus  $e b$  est æquale lateri  $e f$ . (2. 14.) 2. Ob eandem rationem probari poterit  $e g$  esse æquale  $e f$ . Et quia hæ lineæ  $e b$ ,  $e f$ ,  $e g$  sunt perpendiculares ad latera trianguli, circulus  $b f g$  tanget latera in his punctis. (4. 5.)

22. Omne quadrilaterum  $a f e d$  in circulo descriptum habet angulos oppositos simul sumtos duobus rectis æquales. Nam




si per punctum  $a$  ducatur tangens  $g a b$  & diagonalis  $a e$ , erit angulus  $a f e$  æqualis angulo  $e a g$ , (4. 17.) & angulus  $a d e$  angulo  $e a b$ ; (4. 17.) & per consequens quia duo  $a a b$  &  $e a g$  sunt æquales duobus rectis, hi duo anguli oppositi  $f$  &  $d$  etiam æquales erunt duobus rectis. Similiter probari poterit, angulos  $f e d$  &  $f a d$  fore æquales duobus

bus rectis, si quis saltem concipiat aliam tangentem ad punctum  $f$ .

23. Conversa hujus propositionis etiam manifesta est; nim. omne quadrilaterum, cujus anguli oppositi sunt æquales duobus rectis, inscriptum esse circulo id est, posse habere circulum qui tangat omnes illius quatuor angulos.

24. Omne polygonum circa circulum descriptum est æquale triangulo rectangulo, cujus unum crus esset æquale semidiametro circuli, & alterum toti circumferentiæ polygoni. Sit linea  $FA$  æqualis semidiametro  $fb$ , & perpendicularis infinita  $ABCD$ , &c. in qua sumatur  $Ab$  æquale  $ab$  &  $bB$  æquale  $bb$  &  $Bi$  æquale  $bi$  &  $iC$  æquale



$fc$  &c. ita ut tota  $ABCD EA$  sit æqualis toti circumferentiæ polygoni  $abcdea$ . Ulterius sit  $FFF$  parallela  $AB$ , ita ut omnes perpendiculares  $bF, iF, kF$ , &c. sint æquales semidiametro  $fb$  vel  $fi$  &c. manifestum erit triangulum  $AFB$  esse æquale triangulo  $afb$  & triangulum  $BFC$  triangulo  $bfc$  &  $CFD$ , triangulo  $cf d$  &c. Sic omnia hæc triangula simul sumta erunt æqualia toti polygono. Sed triangulum  $FAA$  est æqua-

æquale omnibus his triangulis simul sum-  
tis, quia si ducantur lineæ  $BF, CF, DE$ , &c.  
triangulum  $FAB$  erit æquale triangulo  $F$   
 $AB$ , &  $FBC$  æquale  $FBC$  &c. (3. 16.) Er-  
go etiam totum triangulum  $FAB$  est æqua-  
le polygono; Q.E.D.

25. Omne polygonum regulare est æqua-  
le triangulo rectangulo, cujus unum crus  
esset tota circumferentia polygoni, & alte-  
rum perpendicularis aucta ex



centro ad latera polygoni. De-  
monstratio est eadem cum  
præcedente propositione. Nam  
omnia perpendiculara  $fb, fi,$   
 $fk$ , &c. sunt æqualia &c.

26. Omne polygonum circumscriptum  
est majus circulo, & omne polygonum in-  
scriptum est minus illo. Quod manifestum  
est, quia id quod continet, majus est eo  
quod continetur.


27. *Perimetre* (vel circumferentia) omnis  
polygoni circumscripti major est circum-  
ferentia circuli, & perimetre omnis poly-  
goni inscripti est minor illa: hoc etiam  
manifestum est per 21. Libri secundi.

28. Si in minori segmento circuli  $abc$   
describitur triangulum Iso-  
sceles, ita ut  $ab$  sit æqualis  $bc$ :  
erit triangulum illud ma-  
jus dimidio segmenti. Nam si  
ducatur tangens  $ed$ , tunc e-  
rit



rit parallela ad  $ac$ , est enim perpendicularis ad  $fb$  (4.5.) cui etiam  $ac$  perpendicularis est, (4.6.) & præterea terminetur parallelogrammum rectangulum  $aecd$ : erit hoc majus segmento circuli  $abc$ . Sed triangulum  $abc$  est semissis parallelogrammi  $aecd$ . (3.18.) E. triangulum  $abc$  est majus dimidio segmenti  $abc$ .

29. Sit tangens  $adb$  & secans  $fc b$ , & recta  $ac$ , ut & alia tangens  $cd$ ; dico triangulum  $dbc$  excedere dimidium trianguli mixti, rectis  $ab, cb$  & arcu  $ca$  comprehensi: nam cum in triangulo  $dbc$  angulus in  $c$  sit rectus, (4.5.) latus  $db$  erit majus latere  $dc$  (2.17.) sed  $dc$  est æquale  $da$ : (4.7.) Ergo  $db$  est majus  $da$ : E. triangulum  $cbd$  est majus triangulo  $cad$ : (3.17.) E. m. majus dimidio totius  $cba$ . Sed triangulum  $cba$  est majus triangulo mixto, arcu  $ac$ , & rectis  $bc, ba$ , comprehenso: E. m. triangulum  $dbc$  est majus dimidio trianguli mixti  $abc$ .



3. Ex hisce duabus propositionibus sequitur, quod si multiplicata fuerint latera polygonorum regularium, exinde fieri posse circumscripta & inscripta, ita ut differentia, qua circumscriptum excedet circumculum, vel qua circulus excedet inscriptum, etiam pro lubitu minor reddi possit;

fit; nam si de quacunque quantitate aufe-  
ratur plus quam dimidium, & de residuo  
etiam plus quam dimidium, & iterum de  
hoc residuo plus quam dimidium & sic  
aliquoties, tandem perveniemus ad resi-  
duum minimum desideratum; quod na-  
tura notum est. Sic, postquam inscri-  
ptum est triangulum, quod minus est cir-  
culo tribus magnis segmentis, adhuc  
inscribi potest hexagonum, quod quidem  
majus est triangulo; sed minus tamen  
est circulo sex parvorum segmentorum,  
quæ in adjecta figura alba sunt. Sed hæc  
sex parva segmenta simul sumta non con-  
tinent tantum spatium, quan-



tum semissis trium prio-  
rum segmentorum (4. 28.) Et licet adhuc inscribi possit  
dodecagonum, quod circulus  
excedet duodecim parvis  
segmentis; nihilominus duo-  
decim hæc simul sumta non æquivalent se-  
missi sex segmentorum hexagoni; & sic,  
multiplicando latera polygoni, pro lubitu  
quis diminuere potest differentiam, qua  
circulus excedet polygonum inscriptum.  
Similiter, postquam triangulum circum-  
scriptum est, adhuc circumscribi potest he-  
xagonum, postea dodecagonum, & figura  
viginti quatuor laterum &c.


31. Omnis circulus est æqualis triangulo rectangulo, cujus unum crus (ex. gr. perpendiculum) est semidiameter, & alterum (ex. gr. basis) est linea recta, æqualis circumferentiæ circuli. Nam triangulum hoc erit majus quovis polygono inscripto, & minus quovis polygono circumscripto: (per 24. 25. 26. & 27. lib. 4.) E. erit æqualis circulo. Nam si esset majus, tunc licet minima esset differentia, adhuc tamen construi posset polygonum circumscriptum, cujus differentia à circulo minor esset differentia ejusdem circuli & trianguli rectanguli: & sic polygonum circumscriptum esset hoc triangulo minus, quod absurdum est. Similiter, si triangulum hoc esset minus circulo, construi adhuc posset polygonum inscriptum, quod majus esset hoc triangulo; quod est impossibile.

Hoc genus demonstrationis, quod nunc adhibemus & per impossibile appellatur, inter pulcherrima veterum inventa numeratur; tota quippe Geometria indivisibilibus in eo fundatur: ita ut mirari necessum habeamus, quosdam recentiorum autorum eam rejecisse tanquam mancā & indirectā. Quod si vero quispiam eam delicati fuerit ingenii, ut nullam demonstrationem perferre possit, quæ non concludat directe & positive, tunc facile erit eam convertere in regularem & directā: Nam saltem id pro principio ponere debe-

debemus, quod si duæ quantitates determinatæ  $a$  &  $b$  tales fuerint, ut quævis alia quantitas conceptibilis, quæ major vel minor esset quam  $b$ , etiam major vel minor esset quam  $a$ , tunc duæ quantitates  $a$  &  $b$  erunt æquales. Posito hoc principio, quod reuera ex se manifestum est, probari poterit directe, triangulum illud esse æquale circulo, quoniam quævis figura, quæ saltim concipi potest (inscripta) minor circulo, etiam minor est triangulo; & quævis figura (circumscripta) major circulo, etiã major est triangulo.

Hoc est, quod quadraturam circuli appellant, quæ consistit in eo, ut constituatur quadratum, & vel triangulum, & vel quævis figura retilinea æqualis circulo; quod fieret, si inveniri posset linea recta æqualis circumferentia, seu videre est in ipsa propositione; sed hæc æqualitas nunquam inventa est Geometr.

32. Linea disposita circulariter, plus spatii continebit, quam quævis alia figura polygonæ regularis, quæcunque etiam illa fuerit. Si circumferentia circuli  $a b c d$  disponeretur in formam quadrati vel alterius polygoni regularis, ita ut omnia latera  $e g, g h, h i, i e$ , simul sumpta, æqualia sint circumferentiæ  $a b c d$ ; dico circulum esse majorem polygono. Nam circulus est æqualis triangulo, cujus u-





num latus est circumferentia, & alterum semidiameter  $fa$ : polygonum v. est æquale ttriangulo, cujus unum latus etiam est eadem circumferentia  $abcd$  (vel latera  $egbi$ ) & alterum latus  $fo$  (4.25.) Et quemadmodum  $fo$  minus est quam  $fa$ , sic totum triangulum secundum æquale polygono, erit minus primo triangulo, quod æquale est circulo: & per consequens polygonum hoc erit minus circulo; Q.E.D.

*Hoc est quod volunt, quando communiter dicunt, inter omnes figuras Isoperimétras, vel quæ habent æquales circumferentias, maximam esse circulum.*





## LIBER QVINTUS.

*De Solidis.*

I.

**L**inea recta est simpliciter *recta* ad planum, vel *erecta* in plano *ad angulos rectos*, quando neque in hanc neque in illam partem est magis inclinata, ut columna in pavimento.

2. Duo plana sunt parallela, quando omnes perpendiculares vel rectæ, inter plana ductæ, æquales sunt.

3. Planum est perpendiculare vel *rectum* ad aliud planum, quando neque in hanc neque in illam partem est magis inclinatum, ut murus in solo.

4. *Angulus solidus* oritur, quando tria vel plura plana se contingunt in uno puncto, ut punctum adamantis bene præparati.




5. Si concipiatur linea *ab* fixa in puncto *a* & postea mota secundum longitudinem laterum polygoni *bcd*, describet ea per motum hanc figuram, quæ appellatur *Pyramis*.

6. Po-

6. Polygonum appellatur *basis* Pyramidis.

7 Si linea  $ab$  moveatur secundum longitudinem circuli  $bce$ , describit *conum*,cujus *basis* est hic circulus; &



linea ducta à vertice ad centrum circuli  $e$ , est *axis*.

8. Si linea  $ab$  moveatur uniformiter circa duo Polygona  $bcd$ ,  $afg$ , quæ sint secundum latera & angulos mutuo & in totum æqualia, ut & parallela, ita ut latera æqualia sibi responde-



ant parallela,  $af, ad, bc, fg, ad, cd$  &c. tunc hæc linea per motum producet figuram, quæ dicitur *Prisma*: ejus polygona sunt *bases*.

9. Si bases prismatum sunt parallelogramma, appellatur *Parallelepipedum*.


10. Si linea  $ab$  moveatur uniformiter circa duos circulos æquales & parallelos, describit *Cylindrum*.



11. Linea quæ jungit centra  $e$  &  $e$  basium, est *axis* cylindri.

12. In

12. In omnibus his figuris, quando axis est perpendicularis ad basin  $des$ , illæ appellantur Ifoſceles; Si verò axis est inclinata, sunt ſcalenæ.




13. Si Semicirculus  $adb$  revolvatur circa suam diametrum, describit *sphæram* vel globum, cujus axis est  $ab$ ; centrum  $c$  idem est cum centro semicirculi.

Omnis linea ducta per centrum  $c$  & utrinque terminata per superficiem *sphære*, appellatur *diameter* & dici potest *axis*.

14. Omnes lineæ ductæ à centro  $c$  ad circumferentiam, dicuntur *radii*, & sunt inter se æquales.

15. Duæ lineæ rectæ, quæ se mutuo secant, sunt in eodem plano. & per consequens omne triangulum etiam est in uno plano.

16. Si duo plana  $edb$ , &  $dab$  se mutuo secant, id fiet in linea recta  $db$ , quæ appellatur *communis sectio*.



17. Si linea  $cd$  est perpendicularis ad duas lineas  $fd$  &  $gd$ , in plano  $fgd$  existentibus, illa etiam erit perpendicularis ad planum.


18. Si linea  $cd$  est perpendicularis ad tres  $fd, gd, ad$ , hæ tres lineæ sunt in uno plano.

19. Si duæ lineæ  $dc, bi$  sunt perpendiculares ad idem planum  $fdb$ , erunt illæ parallelæ.


20. Si duæ lineæ  $dc, bi$  sint parallelæ, & ducatur quævis alia linea recta à quovis puncto unius lineæ ad alteram, ut  $db$ , hæ tres lineæ erunt in eodem plano.

21. Si duæ lineæ  $dc, bi$  sint parallelæ tertiæ  $ak$ , licet illæ cum hac non existant in eodem plano, inter se tamen parallelæ sunt.

22. Si una atque eadem linea  $ab$  est perpendicularis ad duo plana  $cd, ef$ , tunc hæc sunt parallelæ.



23. Si duo plana parallelæ  $abg, afe$  secantur per planum aliquod tertium  $i$ , communes illorum sectiones  $bg, fe$ , sunt parallelæ.



24. Si solidus angulus tribus angulis planis contineatur; ex his duo quilibet, utut assumti, tertio sunt majores.

Omnes hæ propositiones tam manifesta sunt, ut adhibita exigua attentione non necessum sit pluribus eas probare.

52. Omnes anguli plani, qui angulum solidum constituunt, simul sumti sunt minores quatuor rectis. Nam si facerent quatuor rectos, non constituerent angulum solidum, sed planum. Ergo ut angulus solidus fieri possit, oportet angulos quatuor rectis minores esse.

*Suasor essem, ut anguli & figura ex charta construerentur, & hac ratione omnia facile comprehendi poterunt.*

26. In omni parallelepipedo plana opposita sunt æqualia: quod facile concipi potest.

*Octo sequentes demonstrationes demonstrabuntur in secunda parte elementorum. Nihilominus & hic demonstrari possint, si solidis saltim applicentur, quæ jam probata sunt de planis lib. 3. & 4. sed non opus est hisce diu inherere.*

27. Parallelepipeda basibus æqualibus & planis parallelis contenta sunt æqualia. (vid. 3. 14.)

28. Omne parallelepipedum secatur in duo prismata triangularia æqualia ab ipso plano per duas diametros parallelas adversorum planorum.

29. Prismata triangularia super æqualibus basibus & inter easdem parallelas constituta, sunt æqualia.

30. Pyramides in basibus æqualibus, & in eisdem parallelis constitutæ, sunt æquales.

31. In genere omnia prismata, cylindri, conï, in basibus æqualibus & in eisdem parallelis constituti sunt æquales.

32. Pyramides & conï, qui habent bases æquales basibus prismatum & cylindrorum, & sunt in eisdem parallelis, erunt tertia pars prismatum vel cylindrorum.

33. Omnis sphaera est æqualis cõno, cujus axis perpendicularis est semidiameter sphaeræ, & basis planum æquale toti superficiei convexæ ejusdem sphaeræ.

34. Inter omnes figuras solidas, quæ eadem superficiei terminari possunt, maxima est sphaerica.

35. Corpus *regulare* est, quod continetur figuris regularibus & æqualibus, gaudetque angulis solidis æqualibus, ut sunt.

36. *Tetraedrum* est contentum quatuor triangulis æqualibus & æquilateris, tale est pyramis, cujus basis est æqualis cuivis faciei seu lateri.

37. *Hexaedrum* seu *Cubus* constat sex quadratis æqualibus, prout sunt illi quibus ludimus.

38. *Octaedrum* est sub octo triangulis æqualibus & æquilateris.

39. *Dodecaedrum* est sub duodecim pentagonis æqualibus & æquilateris contentum.

40. *Icosaedrum* constat viginti triangulis æqualibus & æquilateris.

41. Ultra hæc quinque corpora regularia, impossibile est plura alia invenire; quod ita demonstratur:

Sumantur triangula æquilatera, quæ sunt inter figuras rectilineas simplicissima. Ad minimum tria requiruntur ad constituendum angulum solidum; sed his tribus conjunctis perfectum oritur tetraedrum: nam hæc triangula in unum punctum cœuntia, relinquunt basin triangularem similem & æqualem lateribus, cui videre est ex compositione.

Junctis quatuor ejusmodi triangulis, oritur angulus Octaedri.

Ex quinque talibus triangulis resultat angulus Icosaedri.

Sex triangula simul juncta non possunt constituere angulum solidum, sunt enim æquales quatuor rectis: Sed omnis angulus solidus constat angulis planis, qui simul sumti minores esse debent quatuor rectis: (5. 25.) sic igitur impossibile est per triangula, alia corpora regularia conficere, præter illa tria:

Si jam assumamus quadrata, & tria simul jungamus, habebimus cubum; & non poterit aliud corpus præter cubum per quadrata constitui, quia si assumerentur quatuor quadrata & conjungerentur, non effice-

rent



rent angulum solidum, sed tantum planum.  
(5. 25.)

Si sumantur tria pentagona, resultabit angulus dodecaedri: sed quatuor pentagona non possunt constituere angulum solidum.

Tandem tria hexagona simul juncta, cum efficiant quatuor angulos rectos, angulum solidum constituere non possunt; & tria heptagona vel aliæ figuræ plurium laterum id multo minus præstare poterunt: Sic igitur non possunt plura præter hæc quinque corpora regularia construi, tria cum triangulis, unum per quadrata, & unum per pentagona.





## LIBER SEXTUS

*De Proportionibus.*


**Q**uando loquimur *de magnitudine*, item quantitate *magna*, semper comparatio instituitur inter hanc quantitatem & aliam ejusdem naturæ, respectu cujus illa *magna* dicitur: Sic dicimus montem esse parvum, adamantem esse magnum, quia comparamus hunc montem cum aliis, in quorum comparatione *minor* est; & similiter comparamus hunc adamantem cum aliis, in quorum comparatione hic est major.

2. Quando hac ratione consideratur quantitas, ut investigetur quantam *magnitudinem* illa habeat in comparatione ad aliam; tunc magnitudo quæ datur in comparatione ad aliam, appellatur *ratio*, vel si rem melius exprimere velimus *comparatio*.

3. Quantitas quæ refertur ad aliam dicitur *antecedens*, ea vero ad quam alia refertur, *consequens*.

Sumantur quatuor quantitates, & com-

comparentur binæ & binæ  $a$   
 4. cum  $b$  2. &  $c$  6. cum  $d$  3.  
 Si reperiatur  $a$  habere tan-  
 tam magnitudinem in compa-  
 ratione ad  $b$ , quam  $c$  in com-  
 paratione ad  $d$ : Tunc dicuntur hæ rationes  
 æquales; i.e. ratio  $a$  ad  $b$  est æqualis rationi  $c$   
 ad  $d$ ; Et ut  $a$  habet duplo maiorem quantita-  
 tem quam  $b$ ; sic etiam  $c$  duplo maiorem  
 habebit quam  $d$ .



5. Sed si reperiatur  $a$  4. habere maiorem  
 quantitatem in comparatione ad  $b$  2. quam  
 $c$  6. in comparatione ad  $e$  5. Ex. gr. Si  
 reperiatur  $a$  4. habere duplo maiorem  
 quantitatem quam  $b$  2.  $c$  6. vero non habere  
 duplum in ordine ad  $e$  5. tunc dicuntur hæ  
 rationes inæquales, &  $a$  habet maiorem ra-  
 tionem ad  $b$  quam  $c$  ad  $e$ ; ita ut habere ma-  
 iorem rationem nihil aliud sit quam habere  
 maiorem quantitatem in comparatione ad  
 secundam quantitatem, quam tertia non  
 habet in comparatione ad quartam.

6. Æqualitas rationum appellatur pro-  
 portio; & quando dantur quatuor quanti-  
 tates, quarum prima habet tantam magni-  
 tudinem in ordine ad secundam, quantam  
 tertia habet ad quartam, tunc hæ quatuor  
 quantitates vocantur proportionales.

Ut melius intelligamus totum mysterium  
 proportionum, quæ inter difficillima Geome-  
 triæ referuntur, prout etiam reuera sunt al-  
 tioris indaginis; illas explicabo aliquo exem-

plo, quod solum meo quidem iudicio rem intellectu facilem reddet, quæ tamen alias satis intricata videtur.

7. Concipiatur circulus  $b A d$  per motum lineæ  $a b$  circa punctum  $a$  descriptus; & similiter sit circulus  $c C e$  per motum



puncti  $c$ , quod est in lineæ  $a c b$ , descriptus; Concipiatur denuo eandem lineam  $a c b$  adhuc alia vice moveri usque ad  $a e d$ ; arcus  $b B d$  appelletur  $B$ ; arcus  $c D e$  appelletur  $D$ ; totus circulus  $b$

$B A$  nominetur  $A$ ; totus circulus  $c D C$  vocetur  $C$ : Jam si comparemus ab una parte totum circulum  $A$  ad arcum  $B$ ; & ab altera parte totum circulum  $C$  ad arcum  $D$ , manifeste apparebit, circulum  $A$  habere tantam magnitudinem in ordine ad arcum  $B$ , quantam circulus  $C$  habet in ordine ad arcum  $D$ ; & si  $B$  est quarta vel sexta pars circuli  $A$ ,  $D$  etiam erit quarta vel sexta pars circuli  $C$ : quod hac ratione effertur, ut se habet  $A$  ad  $B$ , sic se habet  $C$  ad  $D$ , & brevitatis gratia nos sic notabimus  $A. B :: C. D$ .

8. Si jam rationem invertimus comparando  $B$  ad  $A$  &  $D$  ad  $C$  etiam manifeste videbimus, quod  $B. A :: D. C$ . ita ut supposito  $A. B :: C. D$ , subito conclusionem inferre possimus invertendo: Ergo  $B. A :: D. C$ .

9. Si instituamus alternationem comparando antecedens cum alio antecedente, &

simi-


Similiter consequens cum alio consequente, concludemus *alternando*, Ergo  $A.C::B.D$ . & hoc manifestum est: nam si totus circulus  $A$  est duplum vel triplum (vel quæcunque alia ratio sit) circuli  $C$ , arcus  $B$  etiam erit duplum vel triplum (vel alia quavis ratio) arcus  $D$ . Hoc manifestum esse dico, quia duo circuli  $A$  &  $C$  descripti sunt per motum lineæ  $ac b$ , ita ut dum  $b$  describit totum circulum  $A$ , interea  $c$  describat totum circulum  $C$ , & dum  $b$  describit arcum  $B$ , interea  $c$  etiam describat arcum  $D$  & hoc per unum communem motum circulare; nisi quod punctum  $c$ . dum tardius movetur quam punctum  $b$  etiam minorem circulum in proportionem ad tarditatem describat: Et similiter dum punctum  $b$  absolvit arcum  $B$ , punctum  $c$  pari modo describit arcum  $D$ . qui erit minor in proportionem tarditatis suæ.

10. Si comparemus differentias antecedentium & consequentium cum ipsis consequentibus; Ex. gr.  $A$  minus  $B$ , cum  $B$ , &  $A$  minus  $D$ , cum  $D$ , videbimus etiam hic dari proportionem &  $A$  minus  $B.B::A$  minus  $D.D$ ; nam manifestum est arcum  $b A d$  (qui est  $A$  minus  $B$ ) se habere ad arcum  $B$ , ut arcus  $c A e$  (qui est  $A$  minus  $D$ ) se habet ad arcum  $D$ : & hoc dicitur fieri *dividendo*.



11. Si conjungimus antecedentia & consequentia atque ea comparamus cum consequentibus, habebimus  $A$  plus  $B$ .  $B:: A$  plus  $D$ .  $D$ ; quod dicitur fieri *componendo*.

12. Si concludimus  $A$ .  $A$  minus  $B:: A$ .  $A$  minus  $D$ , hoc dicitur fieri *convertendo*.



13. Si sumantur plures quantitates quæ sint proportionales binæ ac binæ  $B.f:: D.i$  &  $f.g:: i.n$  &c. tunc possumus concludere sumendo primas & ultimas,  $B.g:: D.n$ ; & dicitur ratio *ex equo ordinata*.

Propositio quæ sequitur paulò intricata est, sed non est magni momenti & omitti potest.

14. Sed postquam sumimus  $f.g:: o.D$ , id est, ut se habet penultima ad ultimam in primo ordine: sic alia quædam quantitas  $o$  se habet ad primam secundi ordinis, tunc concluditur: Ergo  $B.g:: o.i$ , id est, ut prima ad ultimam in primo ordine: sic hæc alia quantitas  $o$  ad penultimam secundi ordinis: & hæc comparatio appellatur *ex equo perturbata*. Verum hoc semper concludi potest: nam quia  $f.g$  vel  $i.n:: o.D$  etiam erit *alternando* & *invertendo*  $o.i:: D.n$  vel  $:: B.g$ .

15. Si sumatur  $B$  tam multiplex quam  $D$ . ex.g.  $3.B$  &  $3.D$ . concludemus  $B.D:: 3.B.3.D$ .

Et

Et similiter :: 10  $B$ . ad 10  $D$ . vel etiam ::


$\frac{1}{12}$  —  $B$ . ad  $\frac{1}{12}$  —  $D$ ; Et sic quacunque ra-

$\frac{2}{2}$  ne multiplicentur hæ duæ magnitudines  $B$  &  $D$ . si modo æqualiter multiplicentur, tunc semper prodibit eadem ratio inter magnitudines æqualiter multiplicatas & magnitudines simplices. Magnitudines æqualiter multiplicatæ appellantur *æque multiples* simplicium  $B$  &  $D$ , & *æque multiples* inter se esse dicuntur ut simplices.

16. Si dividatur  $B$  eadem ratione ac  $D$  & sumatur ex gr. pars quarta de  $B$ , & quarta pars de  $D$ , vel etiam decima à  $B$  vel decima à  $D$ , vel alia quævis pars; Hæ partes habebunt eand. rationem inter se ac tota.  $B. D$  ::


$\frac{1}{4}$  —  $B$ . —  $D$  ::  $\frac{1}{10}$  —  $B$ . —  $D$ . &c. Hæc omnia naturâ nota sunt.

17. *Multiplicare* lineam per aliam lineam, est producere parallelogrammum rectangulum, quod pro duobus lateribus contiguïs has duas lineas habet. Ex. gr. multiplicatur linea  $A$  per lineam  $B$ , & fit rectangulum  $abcd$ , ita ut  $ab$  vel  $cd$  sit æquale  $A$ , &  $bd$  vel  $ac$  sit æquale  $B$ .




18. *Multiplicare* rectangulum vel aliam superficiem per lineam, est nihil aliud quam

producere parallelepipedum (5.9.) ejus  
basis sit hæc superficies & altitudo perpen-  
dicularis hæc linea. Ex.gr. multiplicatur su-



perficie*s*  $abcd$  per lineam  
 $E$ , & fit solidum  $abfgbh$   
&c. ita ut basis illius sit su-  
perficie*s*  $ad$ , & altitudo  $ac$   
vel  $bf$  æqualis  $E$ .

19. Vt has multiplicationes bene concipi-  
pere possimus, necessum est imaginari  
duas lineas, ac si haberent latitudinem, at-  
que earundem totam longitudinem divide-  
re in parva quadrata, ceu vides in his figu-



4

ris, ubi  $A$  est linea, vel potius  
regula constans tribus parvis  
quadratis, &  $B$  est alia regula  
constans quatuor parvis qua-  
dratis ejusdem latitudinis  
cum tribus quadratis regulæ  
 $A$ . Jam igitur multiplicare  
 $A$  per  $B$ , vel  $B$  per  $A$ , est nihil  
aliud, quam sumere regulam  
 $B$  toties, ac sunt quadrata in

$A$ , vel etiam sumere  $A$  toties, quot sunt qua-  
drata in  $B$ : quod ad idem recidit. Sic  $B$   
sumtum ter efficit primum rectangulum,  
quod continebit duodecim quadrata: &  $A$   
sumtum quater constituet secundum re-  
ctangulum, quod etiam continebit duode-  
cim quadrata, & erit in totum æquale primo.



20. Notandum est, eandem multiplicationem nihilominus fieri, etiamsi in longitudine lineæ non exacte inveniatur certus numerus parvorum quadratorum, ut si in *A*, ex. gr. essent tria quadrata & in *B* quatuor & dimidium, vel quatuor, & alia pars aut excessus quicunque, hic notatus per *d*; tunc *B* ter saltem sumitur, ut multiplicatio fiat *B* per *A*, & compositum erit primum rectangulum duodecim quadratorum & trium excessuum seu particularum *d*. Similiter multiplicando *A* per *B*, id est, sumendo *A* quater cum dimidio, vel quater cum tali excessu *d*, resultabit secundum rectangulum etiam constans duodecim quadratis & tribus *d*.

21. Si concipiamus lineam *B* ad dimidium se contrahere, ita ut, manente longitudine semper eadem, postea habeat octo parva quadrata, (id est, longitudo sit octies major latitudine,) etiam sequetur, si eadem ratione se contrahat latitudo

*A*, dari in illa sex parva quadrata: ita ut si nunc multiplicetur *B* per *A*, vel *A* per *B*, orientur duo rectangula in totum æqualia duobus prioribus. Nam *B* sumpta sexies facit primum rectangulum constans 48. quadratis; & *A* sumpta octies facit secundum rectan-



gulum etiam constans 48. quadratis; & hæc 48. quadrata nec plus nec minus valent quam duodecim illa præcedentis rectanguli, quia unum horum duodecim respondet quatuor ex 48, ceu in figura videre est, sic quæcunque tandem latitudo etiam minima hisce lineis detur, eas in infinitum contrahendo, manifestum erit, rectangula quæ per multiplicationem ab illis producantur semper esse eadem. Hinc audacter lineæ ut indivisibiles assumi & inter se multiplicari possunt, cum ex illis rectangulum efficiendum est, quia nunquam magnitudo hujus rectanguli variatur, licet vel minima latitudo lineis relinquatur.

22. Facillimum est omnia hæc applicare multiplicatione solidorum: sed loco quadratorum, concipi debent cubi: nam si concipiatur superficies constans duodecim cubis, & ex altera parte linea constans duobus cubis, multiplicari poterit superficies duodecim cuborum per lineam duorum, sumendo eandem superficiem toties, quot sunt parvi cubi in linea, id est, bis, & tunc resultabit solidum constans viginti quatuor parvis cubis.

23. Ex his omnibus apparet hæc parva quadrata & cubos in multiplicatione linearum & superficialium, respondere unitatibus in multiplicatione numerorum: nam multiplicare numerum per alium,

ex.

ex. gr. 3 per 5, nihil aliud est, quam sumere 3 toties, quot sunt unitates in 5, vel sumere 5 toties, quot sunt unitates in 3. & productum erit 15. Sicut multiplicare lineam per aliam, est sumere alteram illarum toties quot sunt quadrata in altera; & multiplicare superficiem per lineam, est sumere superficiem toties quot sunt cubi in linea.

*Alio in loco sermo erit de multiplicatione superficierum per superficies, vel per solida, ex qua resultant composita, que appellantur plurimum quam trium dimensionum.*


14. Omnes magnitudines exprimi possunt lineis: ut si magnitudo quædam dupla est vel tripla alterius, vel in quacunque alia ratione, saltem sumantur duæ lineæ, quarum altera dupla sit vel tripla alterius, vel in quacunque alia ratione simili cum ratione magnitudinum. Sic ad exprimenda duo tempora, ex gr. horam & duas horas; vel m. duas accelerationes five velocitates, quarum altera sit dupla alterius, saltem sumantur duæ lineæ *a* duplo *b*, & poteris dicere *a* repræsentare duas horas, vel maiorem accelerationem, & *b* respondere uni horæ vel minori accelerationi, & cum illis lineis agere ac cum ipsis horis &c.

25. Ad cognoscendam proportionem re-  
ctangulorum, necessum est scire rationem  
longitudinis unius ad longitudinem alte-  
rius, & præterea rationem latitudinis unius  
ad

ad latitudinem alterius, ex. gr. ad cognoscendam rationem rectanguli  $ac$  ad rectan-



gulum  $eg$ , non sufficit scire longitudinem  $ab$  esse triplam long.  $eb$ , sed præterea scire debemus  $ad$  esse duplam  $ef$ : nam si sumatur  $ai$  æqualis  $ef$ , rectangulum  $bi$  erit triplum rectanguli  $eg$ , quia  $ab$  est tripla  $eb$ , &  $ai$  æqualis  $ef$ . Et ulterius, quemadmodum  $id$  etiam est æqualis  $ai$ , vel  $ef$ , (quia supponitur  $ad$  esse dupla  $ai$  vel  $ef$ ,) rectangulum  $ic$  etiam erit triplum rectanguli  $eg$ . Sic totum rectangulum  $ac$  est bistriplum rectanguli  $eg$ , id est sextuplum, sive continet sexies rectangulum  $eg$ . Quod dico de ratione dupla & tripla latitudinum & longitudinum, idem quoque intelligi debet de quavis alia ratione: nam si  $ab$  est quadrupla  $eb$  &  $ad$  tripla  $ef$ , rectangulum  $ac$  erit ter quadruplum rectanguli  $eg$ , id est, duodecuplum ipsius  $eg$ , vel continebit illud duodecies. Sed si  $ab$  est duodecupla  $eb$ , &  $ef$  tripla  $ad$ ; tunc fiet certa compensatio. Nam si respectus saltem habeatur ad solas latitudines



$ab$  &  $eb$ , rectangulum  $ac$  illud superat & duodecies æquat; ab altera parte nihilominus amittit hunc excessum in altitudinibus  $ad$

&  $ef$ , dum rectangulum  $e g$  alterum æquare debet tribus vicibus. Si jam comparemus excessum & defectum, cum rectangulum  $a c$  sit ab una parte duodecies majus, & ab altera parte tribus vicibus minus, restat illiud tantum esse quatuor vicibus majus  $eg$ .

26. Hoc intelligimus, quando dicimus rectangula esse in *ratione composita* laterum: nam si  $ab$  est tripla  $eb$  &  $ad$  dupla  $ef$ , rectangulum  $ac$  habebit rationem compositam tripli & dupli ad rectangulum  $eg$ , id est, erit bis triplum, vel ter duplum, vel uno verbo sextuplum. Similiter si  $ab$  est quadrupla  $eb$ , &  $ad$  tripla  $ef$ , rectangulum  $ac$  habebit rationem compositam quadrupli & tripli ad rectangulum  $eg$ , id est, erit ter quadruplum, vel quater triplum, vel uno verbo duodecuplum. Similiter si  $ab$  est duodecuplum  $eb$ , &  $ad$  subtripulum  $ef$  (id est,  $ef$  sit triplum  $ad$ ) ratio rectanguli  $ac$  ad rectangulum  $eg$  erit composita ex ratione duodecupla & ratione subtripla, i. e.  $ac$  erit duodecies subtripulum, vel vice versa, vel uno verbo quadruplum  $eg$ .



Si tertia pars thaleri duodecies sumatur, resultant quatuor thaleri; ita ut quatuor thaleri sint duodecies subtripulum thaleri, i. e. faciunt duodecies tertiam partem thaleri.

27. Exinde apparet, si latera duorum rectangulorum sunt reciproce proportionalia, rectangula esse æqualia: nam si  $ab$  est dupla  $eb$ , sit vero reciproce  $bg$  dupla  $bc$ , vel etiam si  $ab$  est tripla  $eb$ , &  $bg$  tripla  $bc$ , vel quamcunque tandem rationem habuerit  $ab$  ad  $eb$ , eandem etiam habeat  $bg$  ad  $bc$ , manifestum erit, quantum rectangulum  $ac$  excedit alterum in longitudine, tantum idem excedi in latitudine. Dum sic longitudo compensat latitudinem, inter se sunt æqualia. Exinde deducitur hæc propositio maximæ momenti.

28. Si sunt quatuor magnitudines proportionales, id quod provenit ex multiplicatione duarum mediarum, semper æquale est ei, quod producit ex multiplicatione duorum extremorum; ut si  $ab, eb :: bg, bc$ , dico, ex multiplicatione  $ab$  &  $bc$ , oriri rectangulum  $ac$ , & ex multiplicatione mediarum  $eb$  &  $bg$ , oriri rectangulum  $eg$ , & hæc duo rectangula  $ac$  &  $eg$  esse æqualia. (6.27.) Quod fit per lineas & rectangula, fieri potest per quamcunque aliam magnitudinem, quia omnes magnitudines possunt exprimi per lineas, & omnes multiplicationes magnitudinum per multiplicationes linearum, i. e. per rectangula. (6.24.)

29. Quan-

29. Quando rectangula habent latera proportionalia, ita ut  $ab, eb :: ad, ef$ , tunc dicitur rectangulum  $ac$  esse in ratione duplicata laterum ad rectangulum  $eg$ : nam ratio  $ac$  ad  $eg$  est composita ex ra-




tionem  $ab$  ad  $eb$ , & ex ratione  $ad$  ad  $ef$ . (6.26.) Sed ratio  $ab$  ad  $eb$  hic est (per hypothesin) eadem cum ratione  $ad$  ad  $ef$ : Et sic ut habeamus rationem rectanguli  $ac$  ad rectangulum  $eg$ , sufficit bis sumere rationem  $ab$  ad  $eb$ . Ex. gr. Si,  $ab$  est dupla  $eb$ , &  $ad$  est dupla  $ef$ , rectangulum  $ac$  erit bis duplum, i. e. quadruplum rectanguli  $eg$ . Et si  $ab$  est tripla  $eb$ , &  $ad$  tripla  $ef$ ; erit  $ac$  ter triplum  $eg$ , id est, nonecuplum: Et si  $ab$  est quadruplum  $eb$ , erit  $ac$  quater quadruplum, i. e. sextecuplum  $eg$ .

30. Si sumatur tertia quædam proportionalis  $no$ , ita ut  $ab. eb :: eb, no$ , duo rectangula  $ac$  &  $eg$  erunt ut lineæ  $ab$  &  $no$ . Nam  $ab$  ad  $no$  est in ratione duplicata  $ab$  ad  $eb$ . Et si  $ab$  est dupla vel tripla, vel quadrupla  $eb$ , erit  $ab$  bis duplum, vel ter triplum, vel quater quadruplum  $no$ .

31. Rectangula illa, quæ hac ratione latera proportionalia habent.  $ab, eb :: ad, ef$ , appellantur *similia*: quorum latera

tera homologa sunt illa, quæ in proportionem sibi respondent, ut  $ab$  &  $eh$  vel etiam  $ad$  &  $ef$ : nam si  $ab$  est latus maximum rectanguli  $ac$ , erit etiam  $eh$  latus maxi-



imum rectanguli  $eg$ .

32. Omnia quadrata sunt rectangula similia: nam manifestum est, si  $ab$  est dupla vel tripla  $eh$ ; erit etiam  $am$  dupla vel tripla  $hi$ , quia  $am$  est æqualis  $ab$  &  $hi$  æqualis  $eh$ .

33. Rectangula similia inter se sunt, ut quadrata super illorum latera homologa constituta. Dico rectangulum  $ac$  esse ad rectangulum  $eg$ , ut quadratum  $bm$  ad quadratum  $ei$ : nam tam quadrata quam rectangula, sunt inter se in ratione duplicata  $ab$  ad  $eh$ . (6. 29. 31.)

34. Ad cognoscendam rationem duorum solidorum parallelepipedorum rectangulorum, necessum est scire rationem baseos unius ad basin alterius, & præterea rationem altitudinis unius ad altitudinem alterius. quia ratio unius solidi ad aliud composita est ex rationibus longitudinum, latitudinum, & altitudinum; quod facile intelligitur ex dictis de rationibus rectangulorum. Iam si parallelepipedum basin habet duplam baseos alterius parallelepipedum, &




altitudinem triplam altitudinis, primum erit bis triplum, vel ter duplum, vel uno verbo sextuplum alterius.

35. Si bases duorum parallelopipedorum reciproce sunt ut illorum altitudines, parallelepipeda sunt æqualia. Hoc probatur ut vigesima septima hujus libri: nam quantum unum excedit alterum in latitudine & longitudine, tantum exceditur in altitudine.

36. Quando parallelepipeda rectangula habent omnia latera proportionalia, appellantur *similia* & sunt in ratione triplicata suorum laterum, ut diximus de parallelogrammis esse in ratione duplicata.


37. Parallelepipeda rectangula similes inter se sunt ut cubi, super latera homologa constituti: nam tam cubi quam parallelepipeda sunt inter se in ratione triplicata laterum homologorum.

38. Rectangula quorum eadem fuerit altitudo, ita se habent inter se ut bases illorum. Sint rectangula *A* & *B* inter parallelas *df* & *ac* constituta, ita ut *ad* æqualis sit *cf*: dico *A. B. :: ab, bc* id est, rectangulum *A* esse ad rectangulum *B*, ut basis *ab* se habet ad basin *bc*. ut si, ex. gr. *ab* est dupla *bc*, *A* etiam erit duplum *B*; & si *ab* sit tripla, vel quadrupla *bc*; erit etiam *A* triplum vel quadruplum *B*:  
nam



nam *A* nihil aliud est quam linea *ab* multiplicata per lineam *ad* (6.17.) & *B* nihil aliud est, quam linea *bc*, multiplicata per eand. *ad* vel *be* ipsi æqualem. E. (6.15.)  $A.B::b, bc.$

39. Omnia parallelogramma, quæ sunt in eisdem parallelis, sunt inter se ut illorum



bases. Dico parallelogrammum *adeb* esse ad parallelogrammum *afgc*, ut *ab* ad *ac*: nam constitutis re-  
ctangulis punctatis super easdem bases, erunt illa re-


ctangula æqualia parallelogrammis. (3.14.)

Sed hæc rectxangula sunt illorum bases: (per præcedentem) E. parallelogramma etiam sunt ut illorum bases, nim. *adeb*, *afgc*::*ab, ac*.

40. Triangula in eisdem parallelis constituta sunt ut bases; sunt enim semisses parallelogrammorum.

41. Quando triangula habent bases suas in eadem linea recta, & eorum vertex incidit in idem punctum, tunc censentur esse inter easdem parallelas, ut *ade* & *cde*, vel etiam *ade* & *bde*.

42. Si in triangulo ducatur linea parallela ad basin, hæc proportionaliter secabit trianguli crura. Sit




triangulum *abc* & linea *de* parallela ad *bc*, dico  $ad. ae::ab.$

$ac &::db. ec.$  Nam si concipian-

tur


tur lineæ  $cd$  &  $eb$ , triangulum  $ced$  erit ad triangulum  $ead$ , ut  $ce$  ad  $ea$ : (6.40.41.) similiter triangulum  $bde$  ad triangulum  $dae$ , est ut  $bd$  ad  $da$ . Sed triangulum  $ced$  est æquale triangulo  $bde$ : (3.16.) E. etiam triangulum  $bde$  five  $ced$  est ad triangulum  $ead$  ut  $bd$  ad  $da$  vel ut  $ce$  ad  $ea$ : ergo etiam  $bd.da::ce.ea$ , quia tam ratio  $bd$  ad  $da$ , quam ratio  $ce$  ad  $ea$  exprimunt eandem rationem trianguli  $bed$  vel  $ced$  ad triangulum  $ead$ .

43. Si in triangulo  $acb$  ducatur linea  $de$ , parallela ad basin  $cb$ , dico  $ed$ .  
 $cb::ad.ab$  vel  $::ae.ac$ : nam ducta  $ef$  parallela ad  $ab$ , erit  $fb$  æqualis  $ed$ . (3.9.) sed per præcedentem  $fb.cb::ea.ca::$  ergo  $ed$ ,  $cb::ea.ca$  vel  $::da.ba$ .



44. Triangula similia appellantur illa, quæ habent omnes tres angulos æquales, id est, singulos hujus singulis alterius, licet triangula ipsa sint inæqualia.

Ex. gr. si angulus  $A$  est æqualis ang.  $a$ , & angulus  $B$  ang.  $b$ , & ang.  $C$  ang.  $c$ , totum triangulum  $ABC$  erit simile triangulo  $abc$ .




45. Si duo triangula habuerint duos angulos duobus angulis utrumque utrique æquales, etiam reliquus reliquo æqualis, & tiran-

triangula ipsa similia erunt: nam cum tres anguli in quovis triangulo efficiant duos rectos, (2.9.) necessum est, si duo anguli unius trianguli sunt æquales duobus rectis alterius trianguli, etiam tertium unius tertio alterius æqualem esse.

46. Omnia triangula similia habent sua latera (circa angulos æquales) proportionalia. Dico  $AB. ab :: AC. ac :: BE. bc$ . Nam si in majori triangulo  $ABC$  sumatur  $Ab$  æquale  $ab$ , &  $Ac$  æquale  $ac$ , triangulum  $Abc$  totum æquale erit triangulo  $abc$ ; (2.11.) sic angulus  $Abc$  est æqualis ang.  $abc$  (2.11.) ergo etiam æqualis est angulo  $B$ , qui per hypothesin æqualis est ang.  $b$ :  $g$ . linea  $bc$  est parallela lineæ  $BC$ : (1.31.) Ergo (6.42.43.)  $Ab. AB :: Ac. AC :: bc. BC$ .


47. Omnia triangula similia, inter se rationem duplicatam habent suorum laterum homologorum. Sit  $abc$  simile  $ABC$ ,

ita ut  $ab. AB :: bc. BC$ . Primo, si  $b$  &  $B$  sunt anguli recti, sint terminata rectangula  $bc da$ , &  $BCDA$ , hæc rectangula  $bbd$  &  $BD$  erunt inter se in ratione duplicata lateris  $bc$ , ad latus homologum  $BC$ , vel ut quadratum super  $bc$  constitutum, ad quadratum super  $BC$ . (6.29.33.) Sed triangulum  $abc$  est semissis rectanguli  $bcd$ , (3.8.) & triang.  $ABC$  est



est semissis rectanguli  $B C D$ . (3. 8.) Ergo etiam hæc triangula sunt inter se in ratione duplicata laterum homologorum, &c. Secundò, si triangula non sunt rectangula, ut in figura secunda, sint ductæ parallelæ  $a d$  &  $A D$ , & postea sint constituta rectangula  $b c d e$  &  $B C D E$ , i. triangula  $a d c$  &  $A D C$  erunt similia, quia angulus  $d$  est æqualis angulo  $D$ . nimirum ambo recti. Et præterea, angulus  $d a c$  est æqualis ang.  $D A C$ , quia sunt æquales angulis  $a c b$  &  $A C B$ : (1. 31.) Ergo  $a c . A C :: c d . C D$ . (6. 46.) Ergo  $a c . A C :: b c . B C ::$  (per hypothesin)  $E . c d . C D :: b c . B C$ : & per consequens etiam rectangula  $b d$  &  $B D$  sunt similia (6. 31.) & inter se sunt ut quadrata suorum laterum homologorum: (6. 33.) Ergo etiam semisses illorum, id est, (3. 18.) triangula  $a b c$  &  $A B C$  sunt in ratione duplicata suorum laterum homologorum, vel ut quadrata &c.

48. Polygona similia sunt, quæ habent æque multa latera, ita ut singuli anguli unius sint æquales singulis alterius polygona, & latera illorum circa angulos æquales proportionalia, ut si angulus  $A$  est æqualis ang.  $a$ , & ang.  $B$  ang.  $b$ . &c. & præterea  $A B . a b :: B C . b c ::$




$C D . c d$  &c. hæc duo polygona sunt similia.

D


49. In-

49. Inter curvilineas vel mixtas figuras, *similes figurae* sunt illæ, quibus inscribi vel circa quas describi possunt figuræ similes;



ita ut polygonum, quod inscriptum fuit, vel descriptum circa unam, etiam alteri inscribi vel circumscribi possit simile. Ex. g. si pro lubitu inscribi aliquod poly-

gonum  $AB C D E$ , majori curvilineæ figuræ, & etiam possum inscribere aliud simile minori curvilineæ,  $abcde$ , hæc duæ curvilineæ erunt similes. Similiter, si sumissem duas mixtas, ut duo segmenta circuli  $ABC$  &  $abc$ , & uni inscripsissem



pro lubitu triangulum  $ABC$ , possem vero alteri simile  $abc$  inscribere, erunt hæc duo segmenta similia; & absolutis


circulis, hæc segmenta erunt æquales portiones circulorum, ita ut si arcus  $BAC$  est tertia pars sui circuli, etiam  $bac$  erit tertia pars sui circuli: & si ad centrum ducantur lineæ  $BD, CD, bd, cd$ , anguli  $D$  &  $d$  erunt æquales. (Vid. 4. II. & sequentes.)

50. Omnes circuli sunt figuræ similes.

51. Omnia polygona similia dividi possunt in æqualem numerum triangulorum, simi-

similem. Sint polygona  $AB C D E$  &  $a b c d e$  & primum sit divisum in sua triangula per lineas  $BE$ .  $CE$ :

(3. 14.) dico, si alterum quoque sit divisum per lineas  $be$  &  $ce$ , omnia triangula unius erunt similia triangulis alte-




rius. Ex.gr.  $abe$  simile est  $ABE$ , nam angulus  $a$  est æqualis ang.  $A$ , (per hypothesin) & præterea  $AB$ .  $ab :: AE$ .  $ae ::$  (etiam per hypothesin) Ergo triangulum  $ABE$  est simile  $abe$  (6. 46.) Porro probatur angulum  $EB C$  esse æqualem angulo  $ebc$ , quia angulus  $AB C$  supponitur esse æqualis  $a b c$ , & ceu jam probatum, angulus  $abc$  est æqualis ang.  $ABE$ : si igitur ab æqualibus auferantur æqualia, angulus  $EB C$  æqualis erit angulo  $ebc$ . Similiter probatur angulum  $ecb$  esse æqualem  $ECB$  & per consequens (6. 45.) totum triangulum  $ecb$  erit simile triangulo  $EB C$ , & sic de reliquis.

52. Omnia polygona similia inter se sunt in ratione duplicata suorum laterum homologorum, sive ut quadrata super latera homologa constituta. Dico, ut quadratum  $AB$  se habet ad quadratum  $ab$ , sic totum polygonum  $AB C D E$  se habet ad polygonum  $a b c d e$ : nam cum omnia triangula unius polygoni similia

sint triangulis alterius (6. 51.) erunt omnia hæc triangula unius polygoni ad omnia alterius in ratione duplicata laterum homologorum, quæcumque etiam illa fuerint, id est, ut quadratum  $AB$ , ad quadratum  $ab$ .

53. Omnes figuræ similes, etiam curvilineæ, inter se sunt ut quadrata super latere quodam figurarum similium sive inscriptarum sive circumscriptarum consti-



tuta. Sint ex. gr. circuli, quibus inscripti sint duo triangula similia  $bac$  &  $BAC$ , dico totum circulum  $ABC$  se habere ad cir-


culum  $abc$ , ut quadratum  $BC$  ad quadratum  $bc$ , sive quod idem est, ut quadratum semidiametri  $DB$  ad quadratum semidiametri  $db$ ; nam circulo  $abc$  (saltem cogitatione,) inscribi vel conscribi potest quodcumque polygonum. (4. 30.) Sed omne polygonum inscriptum  $abc$  minorem rationem habebit ad circulum  $ABC$ . quam quadratum super  $bc$  ad quadratum  $BC$ , & omne circumscriptum circulo  $abc$  majorem rationem habebit ad circulum  $ABC$ , prout facile probari poterit per præcedentem & per ea, quæ dicta sunt de circulo in libro quarto: E. &c.



54. Omnia hæc applicari possunt ad solida. *Solida similia* sunt illa, quæ habent angulos æquales & latera proportionalia, vel quibus inscribitur, vel circumscribitur &c.

55. Solida similia inter se sunt ut cubi, &c. Vid. 6. 36. 37. &c.

56. Si in triangulo rectangulo  $abc$  ducatur ab angulo recto  $a$  perpendicularis  $ad$  in *hypotenusam* (five latus maximum)  $bc$ , tria erunt rectangula inter se similia, nimirum  $adc$ ,  $adb$  & totum  $bac$ : nam 1. quodlibet horum trium triangulorum habet angulum rectum. 2. triangula  $abc$  &  $abd$  habent angulum  $b$  communem: E. sunt similia: (6. 45.) 3. triangula  $abc$  &  $adc$  habent angulum  $c$  communem: E. sunt similia.



57. Perpendicularis  $ad$  est media proportionalis inter  $cd$  &  $db$ , id est, ut  $cd$ ,  $da$ :  $da$ ,  $db$ . Nam cum triangula  $cda$  &  $adb$  sint similia per præcedentem, erit  $cd$  (crus minus trianguli  $cda$ ) ad  $da$  (crus majus) ut  $ad$  (crus minus trianguli  $adb$ ) ad  $db$  crus majus. (6. 46.)

58. Quadratum  $ad$  est æquale rectangulo ex  $cd$  &  $db$  constituto: nam cum  $cd$ ,  $da$ :  $da$ ,  $db$  (per præcedentem) rectan-


gulum extremorum  $cd$  &  $db$  erit æquale rectangulo mediorum  $da$  &  $da$  (6. 28.) Sed cum duo latera hujus rectanguli sint æqualia, quia  $da$  bis sumitur, sequitur rectangulum hoc esse quadratum  $da$ : & sic propositio sequens generalis poni potest.

59. Quadratum mediæ proportionalis semper æquale est rectangulo extremorum.


60. Ad exprimendum rectangulum, sufficit tres literas adhibere. Ex. gr. si ponitur rectangulum  $bdc$ , tunc volumus exprimere rectangulum, cujus alterum latus est  $bd$  & alterum  $dc$ ; & si diceretur rectangulum  $bcd$ , tunc vellemus exprimere rectangulum, cujus alterum latus esset  $bc$ , & alterum  $cd$ .



61. In omni triangulo rectangulo quadratum super hypotenusa (sive maximo latere) constitutum est æquale duobus quadratis crurum. (vel reliquorum laterum.)

Si quadratum  $bcmn$  per perpendicularem  $ade$  in duo rectangula  $dem$  &  $den$  divisum; dico rectangulum  $dem$  esse æquale quadrato  $ac$ , & rectangulum  $den$  quadrato  $ab$ ; & per consequens totum quadratum  $bcmn$  esse æquale qua-




dratis  $ac$  &  $ab$ : nam I. cum duo trian-  
gula  $adc$  &  $bac$  sint similia (6.56.) erit  
 $dc$  ad  $ac$  (in minori triangulo  $adc$ ) ut  
 $ac$  ad  $bc$ : (in majori triangulo  $bac$ ) er-  
go  $ac$  est media proportionalis inter  $dc$  &  
 $bc$  vel  $cm$ ; sic quadratum  $ac$  est æquale  
rectangulo  $dcm$  (6.59.) Ob eandem  
rationem probatur  $ba$  esse mediam pro-  
portionalem inter  $bd$  &  $bc$  vel  $bn$  &c.

62. Si in tribus lateribus trianguli re-  
ctanguli constituentur tres figuræ similes,  
similiterque positæ, maxima erit æqualis  
duabus reliquis: nam cum  
figuræ hæ similes sint ut qua-  
drata in lateribus homologis  
constituta, (6.53.) figura  $A$    
erit ad figuram  $R$  &  $C$ , ut qua-  
dratum  $bc$  ad quadrata  $ca$   
&  $ab$ . Sed quadratum  $bc$  est æquale duo-  
bus reliquis: (per præcedentem) ergo, &c.

63. Si super maximo latere  $bc$  fiat se-  
micirculus  $bac$ , & super  
reliquis lateribus duo alii  
semicirculi  $bna$ , &  $amc$ ;   
maximus semicirculus æ-  
qualis erit reliquis duobus. (per præceden-  
tem.) Si ab utraque parte auferatur com-  
mune, segmenta nim. striata  
 $ba$  &  $ac$ ; quod ab utraque  
parte reliquum, erit æquale;  
id est, triangulum  $bac$  ab  $n$ . 

na parte æquale erit duabus lunulis  $bna$  &  $amc$  ab altera parte: & hæc est *quadratura Lunarum Hippocratis*.

64. Quando triangulum  $bac$  est Isosceles, lunulæ sunt æquales; ita ut triangulum  $ba o$ , semissis trianguli  $bac$ , sit æquale cuivis lunulæ: sed quando triangulum est scalenum, ut in




secunda figura, lunulæ sunt inæquales, & æque difficile est dividere triangulum  $bac$  in duas partes per lineam  $ao$ , ut demonstrari possit triangulum  $ba o$  esse æquale lunulæ  $bna$  & triangulum  $oac$  lunulæ  $ama$ ; æque difficile est: inquam, hoc præstare, quam invenire quadraturam circuli.

65. Duæ chordæ se secantes in circulo, habent sua segmenta *reciproca*, id est, reciproce proportionalia. Dico ut  $ae.be::$

$ed.ec$ . & per consequens rectangulum  $aec$  esse æquale rectangulo  $bed$ : nam si concipiantur  $dc$  &  $ba$ , cerunt duo triangula similia,  $aeb$  &  $dec$ . Nam I. habent angulum ad  $e$  op-


positum ad verticem; (I. 23.) angulus  $d$  est æqualis angulo  $a$ , (4. 12.) quia insistent eidem arcui  $bc$  & in eadem circumferentia

est:




est: Ergo hæc duo triangula sunt similia; sic  $ae.be::ed.ec.$  (6.46.)

66. Si  $ac$  est diameter circuli &  $db$  perpendicularis, erit  $de$  vel  $be$  media proportionalis inter  $ae$  &  $ec$ , quia  $de$  æqualis erit  $eb$  (4.6.) sic  $ae.de::be$  vel  $de.ec.$  & quadratum  $de$  æquale rectangulo  $aec.$



67. Duæ lineæ ductæ à puncto extra circulum assumpto ad circumferentiam, ab eaque intus terminatæ, inter se sunt reciproce ut illarum segmenta externa: Dico  $ac.ad::ae.ab$  & per consequens rectangulum  $cabe$  esse æquale rectangulo  $dae$ : nam si concipiantur lineæ  $bd$  &  $ec$ , erunt duo triangula similia  $abd$  &  $aec$ : nam 1. angulum  $a$  communem habent. 2. Angulus  $d$  est æqualis angulo  $c$ , (4.12.) quia insistant eidem arcui  $be$ : Ergo triangula  $abd$  &  $aec$  sunt similia; (6.45.) sic  $ad.ac.$  (quæ sunt maiora latera duorum triangulorum)  $:: ab.ae.$  (quæ sunt minora latera eorundem triangulorum.)






68. Si una harum linearum  $ab$  tangat circulum in  $b$ , dum interea altera eundem secat in  $e$  &  $d$ , tunc  $ab$  est media propor-

tionalis inter  $ae$  &  $ad$ : nam ductis lineis



$be$  &  $bd$ , triangula  $abd$  &  $acb$  erunt similia, quia 1. angulum  $a$  communem habent. 2. Angulus  $abc$  est æqualis angulo  $bde$  (4.17.) cum ergo hæc duo triangula similia sint,  $ae.ab::$  (quæ sunt duo latera minoris trianguli  $abe$ ):  $ab.ad$  (quæ sunt latera homologa alterius trianguli  $adb$ .)


69. Sit diameter  $ab$  secata in  $c$  per perpendicularem infinitam  $ce$ , vel intra circulum, ut in prima figura, vel in circumferentia ut in secunda figura,



vel extra circulum, ut in tertia figura: sit præterea ex puncto  $a$  pro lubitu ducta linea recta, secans perpendicularem in  $e$ , & circulum in  $d$ ; dico semper  $ad.ac::ab.ac$ . Nam si ducatur linea  $bd$ , erunt duo triangula similia  $cac$  &  $dab$ , quia 1. angulum habent communem  $cac$  &  $dab$ . 2. etiam rectum habent; nam ang.  $ace$  rectus est (per hypothesin) & ang.  $bda$  quoque est rectus (4.14.) ergo hæc duo triangula sunt similia  $ad.ac::ab.ac$ .


70. In secunda figura  $ab$  semper est media proportionalis inter  $ad$  &  $ae$ , & in prima, media est  $aE$ , ubi circulus lineam  $ce$  secat.

71. Si in triangulo inscripto, angulus  $bac$  est divisus bifariam, id est, in duas partes æquales, per lineam  $aed$ . Dico  $ba. ae :: ad. ac$ ; nam ducta linea  $bd$ , erunt duo triangula similia  $abd$  &  $aec$ , quia 1. angulus  $d$  est æqualis angulo  $c$ . (4. 12.) tanquam insistens eidem arcui  $ab$  & in eadem circumferentia. 2. angulus  $bad$  est æqualis angulo  $eac$  per hypothesin: E. hæc duo triangula sunt similia: & propterea  $abad :: ae. ac$ .




72. Quando angulus in vertice ita divisus est in duas partes æquales, segmenta basis sunt proportionalia cum lateribus  $ba. ac :: be. ec$ : nam concipiatur  $ef$  parallela ad  $ba$ , tunc erit  $ba. ac :: ef. fc$ . Sed  $e$  f est æ-

qualis  $af$ , quia ang.  $aef$  æqualis est ang.  $eab$ . (1. 31.) & per consequens angulo  $ea$   $f$ : sic triangulum  $afe$  est Iso-



sceles; (2. 15.) & vice hujus comparisonis  $ba. ac :: ef. fe$ . ponere possumus hanc  $ba. ac :: af. fc$ . vel etiam (6. 42.)  $be. ec$ . Q. E. D.

73. Si duo circuli se intus contingant, & ex puncto contactus *a* ducatur tangens, &



perpendicularis *acb*, quæ per centra duorum circulorum transibit, (4. 5.) & præterea quævis alia linea secans duos circulos in *e* & *d*. Dico semper  $ae.ad::ac.ab$ : nam ductis lineis *ec* &

*db*, triangula *aec* & *adb* erunt similia, cum habeant ang. communem in *a* & alium rectum in *e* & *d*. (4. 14.)

74. Etiam arcus *ec* erit ad arcum *db*, ut totus circulus *aec* ad circulum *adb*. (6. 49. & 4. 11. &c.)







## LIBER SEPTIMVS

*De Incommensurabilibus.*

## I.

**M**inor quantitas dicitur in posterum *metiri* majorem, quando minor aliquoties sumpta exacte æquat majorem. Ex. gr. ponamus ulnam continere sex pedes, pes unus *metietur* ulnam, quia pes sexies sumptus exacte æquat ulnam.

2. Quantitas, quæ metitur majorem, appellatur *pars* majoris, & major dicitur *multiplex* minoris: sic pes est *pars* ulnæ, & ulna est *multiplex* pedis.

3. Si sumatur magnitudo unius passus, qui continet pedes duos & dimidium, & tentaverit quis metiri ulnam, id præstare non poterit, nam si sumatur passus tantum bis, resultabunt duntaxat quinque pedes, qui nondum æquant ulnam: & si idem passus ter sumatur, resultabunt pedes septem cum dimidio, qui ulnam excedent: sic igitur hæc quantitas duorum pedum cum dimidio non metitur ulnam, neque

proprie dicitur *pars ulnæ* : nihilominus dicere possumus illas esse *partes*, nam hæc quantitas continet quinque pedes dimidios : sed pes dimidius est *pars ulnæ*, nam si duodecies sumatur, eam metitur : sic igitur passus hic continet partes ulnæ, quia continet quinque pedes dimidios, qui sunt

$\frac{5}{12}$  id est, quinque partes duodecimæ unius ulnæ.

4. Quando duæ quantitates ita comparatæ sunt, ut inveniri possit tertia quantitas, quæ sit pars utriusque, id est, quæ utramque metitur, tunc hæ duæ quantitates sunt *commensurabiles* : sic quantitas unius passus, & ulna sunt duæ quantitates commensurabiles, quia dari potest tertia quantitas, nimirum pes dimidius, qui metietur ulnam & passum : nam pes dimidius quinques sumtus æquat passum, & idem pes dimidius sumtus duodecies æquat ulnam.

5. Si vero possibile non est, invenire tertiam quantitatem, quæ metiatur utramque, tunc hæ duæ quantitates sunt *incommensurabiles*.

6. Magnitudines commensurabiles sunt *ut numerus ad numerum*, id est, hæ magnitudines exprimi possunt per certos numeros, ita ut magnitudo se habet ad aliam magnitudinem, sic certus numerus se habeat

ad alium certum numerum. Ex. gr. si linea est unius ulnæ vel sex pedum, & alia linea unius passus s. duorum pedum cum dimidio, hæ duæ lineæ erunt ut numerus ad numerum; nam quia pes dimidius metitur utramque, alteram per quinque & alteram per duodecim, manifestum est, cum altera contineat quinque pedes dimidios, & altera duodecim, has duas lineas esse ut 5. ad 12. & per consequens ut numerus ad numerum.

7. Si duæ magnitudines non sunt ut numerus ad numerum, id est, si possibile non est exprimere magnitudines per duos numeros, erunt incommensurabiles: quod certum est per præcedentem.

8. Dispiciendum igitur nunc est, an revera tales magnitudines dentur, quæ per numeros exprimi non possunt: nam si hoc est, necessum erit dicere, dari magnitudines incommensurabiles.

9. *Numerus planus* est qui provenire potest ex multiplicatione duorum numerorum. Ex. gr. sex est numerus planus, quia provenit ex multiplicatione 3. & 2. nam bis ter sunt sex. Similiter 15. est numerus planus, quia provenit ex multiplicatione 5. per 3. Similiter 9. est numerus planus, quia provenit ex 3. per 3.

10. Numeri, qui in se mutuo multiplicati, planum producant, appellantur  
*late-*

*latera plani*, ut 2. & 3. sunt *latera plani* 6. Similiter 3. & 5. sunt *latera plani* 15.

II. Si concipiantur unitates ut parva quadrata, ea in formam rectanguli collocari poterunt, si numerus illarum fuerit planus. Ex. gr. 12. quadrata collocantur in formam rectanguli, cujus alterum latus continet 6. & alterum 2. Similiter 48. constituet rectangulum, cujus alterum latus est 12. & alterum 4. Vid. fig. sequentes *B* & *C*.

12. Numerus quadratus est planum, cujus latera sunt æqualia, ut 4. resultans ex multiplicatione 2. per 2. ut 9. proveniens ex 3. per 3. ut 16. ex 4. per 4. &c.

13. Numerus quadratus collocari potest in formam quadrati; & numerus qui collocari potest in formam quadrati, est quadratus, & qui non potest hac ratione collocari, non est numerus quadratus.

14. Numeri *plani* *similes* sunt, qui collocari possunt in formam rectangulorum similium, id est, quorum latera sunt proportionalia ut 12. & 48. nam latera plani 12.



sunt 6. & 2. ceu videre in figura *B*. & latera plani 48. sunt 12. & 4. ceu videre est in




in figura C. sed 6. 2 :: 12. 4.

15. Omnes numeri quadrati sunt plani similes. (6. 32.)

16. Omnis numerus collocari potest in forma lineæ rectæ, & in hoc statu haberi potest pro plano: hinc 3. in figura A erit planum simile 12. nam latera plani 3. sunt 3. & 1. quia semel ter faciunt ter, & latera plani 12. sunt 6. & 2. sed 3. 1 :: 6. 2.

17. Dantur numeri, qui non sunt plani similes, ut ab 1. usque ad 10. sunt 1. 4. 9. qui cum quadrati sint, similes sunt; postea sunt 2. 8. qui habent unum latus duplum alterius: reliqui non sunt plani similes, ut 3. 5. 6. 7.

18. Si numerus quadratus multiplicet alium num. quadratum, producetur tertium quadratum ex.gr. A. 4. & B. 9. sint numeri quadrati & se multiplicent, producantq; numerum C. nim. 36. Dico hunc numerum tertium esse quadratum: nam multiplicare B per A est sumere B toties, quot sunt unitates in A. - Sed totum numerum B. 9. considerare possum, tan-



quam

quam quadratum unicum, illudque toties sumere, quot sunt unitates s. parva quadrata in  $A$ : & quemadmodum unitates in  $A$  sunt positæ in formam quadrati; sic etiam toties quadratum  $B$  ponere poterò, tanquam tot unitates: hinc erunt 4.  $B$ . quæ constituent quadratum totum  $C$ . 36.

19. Si sint duo numeri plani similes, major dividi potest in tot quadrata, quot sunt unitates in minori.  $A$ . 3. &  $B$ . 12. sunt plana similia: ita ut latus 3. ad latus 6. sit ut latus 1. ad latus 2. Possum dividere pla-



num  $B$ . 12. in tria quadrata similiter locata ut tria parva quadrata plani  $A$ , & quodlibet majorum

quadratorum in  $B$  respondebit 4. illorum in  $A$ . Similiter si plana sunt 8. & 72. possum dividere 72. in 8. quadrata, quorum quodlibet continebit 9. illorum in minori plano 8. Idem etiam accidet, si vel unus vel ambo sunt numeri fracti, ut si  $A$  continet 3. cum dimidio &  $B$  14. possum dividere 14 in tria quadrata cum dimidio, eodem modo disposita ut in  $A$ , ceu videre est in parvis quadratis punctatis, quæ figuris adjecta sunt. Similiter si plana sunt  $B$ . 12. &  $D$ . 27. possum dividere 27. non tantum in tria quadrata eodem modo disposita ut illa in  $A$ , sed

*A*, sed etiam in 12. eodem modo posita ut illa in *B* :

quod videre est

per lineas punctatas.

*D*



Ad hoc

præstandum, tantum dividuntur latera majoris plani in tot partes, in quot sunt divisa latera homologa minoris plani. Figura ipsæ rem totam facilem reddent.

20. Numeri plani, qui sic dividi possunt, ut tot sint quadrata in majori plano, quot sunt unitates in minori, sunt similes: hæc est conversa præcedentis.

21. Duo numeri similes in se mutuo multiplicari producunt numerum quadratum. Nam diviso majori plano in tot quadrata, quot sunt unitates in altero plano (7.19.) Multiplicabitur planum per aliud, si majora quadrata majoris plani toties sumantur, quot sunt unitates vel parva quadrata in minori plano, id est, toties quot sunt ipsa. Sed multiplicare numerum quadratum per eundem numerum, nihil aliud est quam constituere quadratum ex quadratis. Ex. gr. *A*. 3. & *B*. 27. cum sint plana similia, considero *B*. 27. ut planum compositum ex tribus majoribus quadratis, ut *A*. 3. est planum compositum

ex

ex tribus unitatibus vel tribus, parvis quadratis. Si jam sumo



hæc tria majora quadrata toties, quot sunt unitates in *A*, id est, ter; tunc produco ter tria quadrata majora *B*, i. e. 9. quadrata,

quorum quodlibet respondet 9. illorum, quæ sunt in *A*, & omnia 9. quadrata in *B* respondebunt 81. illorum in *A*; ita ut *A*. 3. multiplicatum in *B*. 27. producat 81. qui est numerus minorum quadratorum in formam quadratam dispositus, & per consequens (7. 13.) hic numerus 81. est quadratus. Similiter si plana sunt 12. & *D*. 27. divido 27. in 12. quadrata, quæ multiplico per 12. & resultant 144. majora quadrata posita in formam quadrati, quæ respondent 324. illorum in minori plano.


22. Si duo numeri plani sint similes, quacunque ratione unum disponatur, eadem ratione poterit disponi alterum. Sint 3. & 12. plana similia ut supra. Si disponantur 12. in lineam rectam ad constituendum rectangulum, cujus latus unum sit 12. & alterum 1. Dico etiam 3. posse disponi in rectangulum simile, cujus latus unum habebit 6. & alterum semissem unius &c.

23. Si



23. Si numerus dividat alium numerum quadratum, producat numerum tertium, qui erit planus similis divisoris. Sit quadratum  $ac$  16. & dividatur per quemcunque numerum ex.gr.

per 8. Id quod fit, si sumatur octava pars lateris  $ad$ , nimirum  $ae$  & ducatur parallela  $ef$ ; nam resultabit planum  $af$ , quod erit octava pars quadrati  $ac$ . Sed




dividere numerum vel planum per 8. est fumere octavam partem hujus numeri si-ve plani. Dico  $af$  esse planum simile ad 8. Nam cum 8. sit dispositus in lineam rectam ad constituendum rectangulum, cujus unum latus sit 8. & alterum 1. rectangulum  $af$  ipsi erit simile, quia  $ae$  sumta est octava pars ab  $ad$  vel  $ab$ : Ergo ut 8. ad 1. (quæ sunt latera plani 8. divisoris) Sic  $ab$  ad  $ae$  (quæ sunt latera plani provenientis ex quadrato  $ac$  divisi per 8.) Ergo &c Q. E. D.

24. Si duo numeri plani se mutuo multiplicantes producant quadratum, sunt similes.

25. Duo numeri plani non similes se mutuo multiplicantes, non possunt producere numerum quadratum. Hæ propositiones sunt corollaria præcedentium.

26. Si

26. Si duo numeri sint plani similes, eorum æque multiplices quicunque & illorum partes æquales quæcunque, sunt etiam plani similes. Sint plani  $a b c d$  3.



&  $ABCD$  12. similes, ita ut  $ab. AB :: bc. BC$ . Dico si sumatur duplum unius &

duplum alterius (vel quivis alius æque multiplex) hæc dupla erunt similia: Nam sumpta  $ae$  dupla  $ad$ , &  $AE$  dupla  $AD$ , ad constituendum planum  $be$  duplum plani  $bd$  & planum  $BC$  duplum plani  $BD$ , manifestum est ut  $ad. AD :: ae. AE$ . sed  $ad. AD :: ab. AB$ . Ergo etiam  $ae. AE :: ab. AB$ ; Et per consequens plana  $be$  &  $BE$  sunt similia. Similiter se habebit si sumantur illorum semisses  $bo$ ,  $BO$  vel quævis aliz partes æquales.

27. Si duo numeri sint plani non similes, eorum æque multiplices quicunque, & eorum partes æquales quæcunque etiam erunt non similes. Hoc sequitur ex præcedente.

28. Inter duos numeros planos similes quoscunque, incidit numerus medius proportionalis. Sint numeri plani similes 2. & 8. Dico possibile esse invenire tertium numerum qui medius proportionalis

nalis

nalis erit : nam si concipiatur planum 8. in lineam rectam

$AB$  dispositum,  $A$   $B$

& planum 2. etiam

in lineam rectam

$AD$ , & ex his  $D$   $C$

duabus lineis fiat

planum  $AC$  16. hoc planum  $AC$  16. pro-

venit ex multiplicatione duorum nume-

rorum 2. & 8. (6.17. & seqq.) & per conse-

quens numerus parvorum quadratorum

totius plani  $AC$  16. erit numerus quadra-

tus, (7. 21.) & poterit disponi in figuram

quadrati (7. 13.) Sit igitur dispositus in fi-

guram quadratam  $ac$ ; Sic

quadratum  $ac$  erit æqua-

le plano  $AC$ , quia est i-


dem numerus aliter sal-

tem dispositus. Ergo

(6.59.) latus  $ab$  4. erit

medius proportionalis

inter  $AD$  2. &  $AB$  8.



29. Inter duos numeros non similes

non potest cadere numerus medius pro-

portionalis. Sint numeri 4. & 6. in lineam

rectam dispositi, & se mutuo multiplican-

tes producant planum 24. hoc planum 24.

non est numerus quadratus; (7.25.) & per

consequens non poterit disponi ut nume-


rus quadratus. Ergo non poterit haberi

numerus medius inter 4. & 6. Nam hic

nu-

numerus qui nunc concipitur medius, multiplicatus per se ipsum, produceret numerum quadratum, aliunde æqualem plano ex 4. & 6. (6. 59.) quod est impossibile quia planum 24. ex 4. & 6. productum non est numerus quadratus.


30. Sint duæ lineæ  $ae$  &  $ec$ , ut numerus ad alium numerum non similem: ex. gr. ut 1. ad 2. Sit præterea  $eb$  media proportionalis, ita ut  $ae. eb :: eb. ec$ . Dico  $eb$  esse in-



commensurabilem duobus extremis  $ae$  &  $ec$ : nam cum  $ae$  &  $ec$  sint ut 1. & 2. id est, ut numeri non similes (per hypothesein) æque ac illorum æque mul-

tiplices quicunque, (7. 27.) nunquam erit possibile invenire numerum medium proportionalem inter  $ae$  &  $ec$ , (per præcedentem) & per consequens  $eb$  non erit ad  $ae$  vel  $ec$  ut numerus ad numerum: Ergo illa est incommensurabilis.

31. Diameter quadrati  $ab$  est incommensurabilis lateri  $ac$ .



Nam sumpta  $ad$  dupla  $ac$  & facto triangulo  $abd$ , quod erit simile  $abc$ , quia cum  $cd$  sit æqualis  $cb$ , angulus  $cdb$  est æqualis angulo  $cbd$ ; (2. 15.)

Sic

Sic angulus  $c d b$  est semissis recti æque ac  $c a b$ . Ergo  $a b d$  est rectus, &c. Sic  $a c : a b :: a b : a d$ . Ergo  $a b$  est media proportionalis inter  $a c$  1 &  $a d$  2. Et per consequens (per præcedentem) incommensurabilis.

32. *Potentia* lineæ appellatur quadratum quod constituitur super illa linea. *Potentia* lineæ  $a c$  est quadratum  $a c b e$ , & *potentia* lineæ  $a b$  est quadratum  $a b d f$ . Et linea  $a b$  dicitur *bis posse lineam*  $a c$ , quoniam mos loquendi à Græcis transumptus & in Geometriam receptus fuit.

33. Diameter  $a b$  est commensurabilis *potentiæ* lateri  $a c$ , id est, quadratum  $a b d f$  est commensurabile quadrato  $a b c e$ , cum unum sit duplum alterius.

34. Sed si sumatur  $a o$  media proportionalis inter  $a b$  &  $a c$ , hæc media  $a o$  erit incommensurabilis in potentia, id est, quadratum lineæ  $a o$  erit incommensurabile quadrato  $a c$ , vel quadrato  $a b$ : nam quadratum  $a c$  ad quadratum  $a o$  est in ratione duplicata  $a c$  ad  $a o$ , (6. 29.) id est, ut  $a c$  ad  $a b$ , (6. 30.) Sed  $a c$  est incommensurabile  $a b$ : (7. 31.) Ergo etiam quadratum  $a c$  etiam est incommensurabile quadrato  $a o$ .

35. *Secunda potentia* lineæ est cubus, qui hanc lineam pro latere habet.

36. Si sumantur  $a n$  &  $a m$ , duæ mediæ proportionales inter  
 $a$  ———  $n$        $a c$  &  $a b$ , ita ut  $a c . a n ::$   
 $a$  ——— ———  $m$        $a m . a b$ . erit linea  $a n$  in-  
 commensurabilis secunda  
 potentia  $a c$ , id est, cubus  $a c$  erit in-  
 commensurabilis cubo  $a n$ , quia cubus  $a c$   
 est ad cubum  $a n$  in ratione triplicata la-  
 teris  $a c$  ad latus  $a n$ , id est, ut  $a c$  ad  $a b$ .  
 Sed  $a c$  &  $a b$  sunt incommensurabiles &c.  
 Sunt vero etiam  $a c$  &  $a m$  commensurabi-  
 les secunda potentia, nam cubus  $a m$  est  
 duplus cubi  $a c$ .

37. Quæ dicta sunt de numero plano faci-  
 le applicari possunt numeris solidis. *Nume-  
 ri solidi* appellantur illi, qui proveniunt ex  
 multiplicatione numeri plani per quem-  
 cunque numerum: Ex. gr. 18. est nume-  
 rus solidus ortus ex 6. (qui est numerus  
 planus) multiplicato per 3. vel ex 9. multi-  
 plicato per 2.

38. *Numeri solidi similes* sunt illi, quo-  
 rum parvi cubi ita disponi possunt, ut con-  
 stituant parallelepipeda rectangula similia.

39. *Numeri cubici* sunt illi qui dispo-  
 ni possunt in formam cuborum, ut 8. vel  
 27. quorum latera sunt 2. & 3. bases vero 4.  
 & 9.

40. Omnis numerus cubicus multipli-  
 cans alium numerum cubicum, producit  
 tertium numerum cubicum.

41. In-

41. Inter duos numeros solidos similes, incidunt duo numeri medii proportionales. *Saltem applicari debent solidis, quæ jam demonstrata sunt in ordine ad plana.*

42. Hæ demonstrationes quibus probatur dari lineas & magnitudines incommensurabiles, probant etiam *continuum* non esse compositum ex punctis finitis: nam si diameter æque ac latus quadrati essent composita ex punctis finitis, punctum metiretur latus & diametrum: Nam punctum inveniretur certis aliquot vicibus in latere & certis quoque vicibus in diametro; quod est impossibile (per demonstrationes præcedentes.)

43. Quia in triangulo rectangulo quadratum lateris maximi est æquale duobus quadratis reliquorum laterum, (661.) Semper adhibitum fuit illud triangulum ad inveniendas incommensurabiles: nam si omnia tria latera sunt commensurabilia, poterunt omnia tria exprimi tribus numeris, & tunc quadratum maximi numeri erit æquale quadratis duorum reliquorum numerorum; ut si maximum latus est 5. pedum, minimum 3. mediocre 4; quadratum ex 5. erit 25. & reliqua quadrata erunt 9. & 16. & hæc duo simul sumpta 9. & 16. constituunt tertium 25. Sed si latus minimum est 2. & mediocre 3. maximum latus non poterit exprimi per numeros, quia quadra-

zum minoris lateris 4. additum quadrato mediocris 9. facit 13. qui exprimit quadratum lateris maximi: Sed ut hic numerus 13. non est numerus quadratus, sic etiam non potest habere latus sive radicem per aliquem numerum expressam.

44. Omni tempore solliciti fuerunt in indaganda aliqua methodo ad inveniendos diversos numeros, qui exprimerent tria latera trianguli rectanguli, ut securi esse possimus, hæc tria latera esse commensurabilia. En methodum, qua inveniri possunt omnes numeri possibiles huic scopo convenientes.


45. Si sumantur duo numeri quicunque, (etiam ipsa unitas) quorum differentia saltem est unitas & jungantur duo quadrata horum duorum numerum; resultabit numerus qui erit radix quadrati æqualis duobus quadratis? Et hic numerus exprimit latus maximum trianguli rectanguli, latus mediocre exprimetur numero unitate saltem minori; & latus minimum per duos primos numeros sibi invicem additos. Ex gr. sumtis 1. & 2. & quadrato utriusque 1. & 4. conjungo hæc duo quadrata 1. & 4. & produco 5. dico 5. poterit exprimere latus maximum, & mediocre, & 3. minimum: ita ut 25. quadratum maximi lateris sit æquale 16. & 9. quadratis reliquorum duorum laterum. Similiter si su-



mo 2. & 3. eorumque quadrata 4. & 9. con-  
 jungo, produco 13. Dico 13. & 12. & 5. ex-  
 primere latera trianguli rectanguli, ita ut  
 169. quadratum de 13. æquale sit 144. & 25.  
 quadratis ex 12. & 5. Similiter sumtis 3. &  
 4. eorumque quadratis 9. & 16. additis pro-  
 ducuntur 25. Dico 25. esse maximum latus  
 trianguli, 24. latus mediocre & 7. minimum.

*Hæc omnia facilius inveniuntur hac ra-  
 tione.*

46. Si disponantur unitates decussa-



tum, omnes numeri constituentes figuram  
 quadratam erunt numeri convenientes ad

exprimendum latus maximum. Latus minimum erit numerus comprehensus in duobus prioribus ordinibus figuræ quadratæ, & latus medioere erit unitate minus latere maximo.

47. Si hæc figura continuata fuerit, dabit omnes numeros possibiles: Sed notari debet æque multiplices trium numerorum inventorum idem præstare; ut inventis 5. 4. & 3. eorum dupli 10. 8. & 6. exhibebunt tria latera trianguli, ita ut 100. quadratum ex 10. sit æquale 64. & 36. quadratis ex 8. & 6. Similiter eorum tripli 15. 12. 9. idem faciunt: Quivis enim videt omnes hos numeros semper eandem servantes proportionem non nisi unum triangulum exprimere, nimirum illud quod exprimitur per 5. 4. & 3. & sic omnes hi numeri debent haberi pro iisdem.





## LIBER OCTAVUS

## De Progressionibus &amp; Logarithmis.

## I.

**P**rogressio est series quantitatum, quæ inter se invicem similem aliquam habitudinem habent, & qualibet harum quantitatum appellatur terminus.

2. Quando termini se mutuo insequentes æqualiter crescunt vel decrescunt; Progressio appellatur *Arithmetica*, ut sunt numeri naturali serie procedentes 1. 2. 3. 4. 5. &c. vel etiam numeri impares 1. 3. 5. 7. 9. 11. &c. vel etiam ut 4. 8. 12. 16. vel etiam 20. 15. 10. 5. 0.

3. Progressio arithmetica potest augeri in infinitum sed non diminui.

4. Si in progressionem arithmetica sumantur quatuor termini, quorum duo priores à se invicem tantum distant, quantum duo posteriores; Hi quatuor termini dicuntur proportionales in proportionem arithmetica, ut in progressionem numerorum

naturalium 1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. &c. Si sumamus 2. 3. :: 9. 10. (hæc nota :: in posterum indicabit proportionem arithmeticam) erit eadem proportio arithmetica inter 2. & 3. quæ est inter 9. & 10. id est, 10. excedere 9. tantum, quantum 3. excedit 2. Similiter 3. 5. :: 8. 10. sunt in proportionem arithmetica. Sicut etiam 1. 5. :: 5. 8. ubi 5. bis repetitur & est medium arithmeticum inter 1. 9.

5. In proportionem arithmetica aggregatum duorum extremorum est æquale aggregato duorum mediorum, ut in 2. 3. :: 9. 10. aggregatum ex 2. & 10. est 12. & aggregatum ex 3. & 9. etiam est 12. Similiter in 3. 5. :: 8. 10. aggregatum ex 3. 10. est 13. & aggregatum ex 5. & 8. quoque est 13. Ratio hujus ex se satis manifesta est, nam si 10. excedit 8. etiam id quod additur 8. nimirum 5. excedit tantum illud quod additur 10. nimirum 3. & sic oritur æqualitas.

6. Aggregatum sive summa primi & ultimi termini est æqualis summa secundi & penultimi, vel terii antepenultimi &c. ut in primo exemplo 1. & 9. faciunt 10. & similiter 2. & 8. vel etiam 3. & 7. vel 4. & 6. semper sunt 10. & in medio restat 5. qui bis sumtus (tanquam respondens duobus, quia æqualiter distat à primo & ultimo) etiam efficit 10.

7. Si addatur primus terminus ultimo & multiplicetur illorum summa per semissem

fem numeri terminorum, productum erit  
 æquale aggregato omnium terminorum  
 simul sumtorum, ut hic si 1. addatur 9. ut  
 oriantur 10. & multiplicentur per 4. &  $\frac{1}{2}$

(sunt enim 9. termini) fiat 45. qui sunt  
 summa omnium terminorum ab 1. usque ad  
 9. Hoc manifestum est per præcedentem.

8. Quando termini progressionis sunt  
 continuo proportionales; id est, si 1. est ad  
 2. ut idem est ad 3. & ut 4. ad 5. &c. Tunc  
 progressio appellatur *Geometrica*, ut 1.2.4.8.  
 16.32. vel etiam 1. 3. 9. 27.71. vel etiam 3.

1   1   1   1

12.48.192.768. vel 8.4.2.1 — — — — &c.  
 2   4   8,16,

9. Progressio *Geometrica* potest augeri  
 & diminui in infinitum.

10. Quando progressio incipit ab 1. se-  
 cundus terminus appellatur *radix* vel *latus*:  
 tertius appellatur *quadratum* vel secundus  
 gradus: quartus, *cubus* vel tertius gradus:  
 quintus *quadrati quadratum* vel quartus  
 gradus, sextus *sursolidus* vel quintus gradus,  
 septimus *quadrati cubus* &c.

11. Si sumantur quatuor termini, quo-  
 rum duo priores tantum distant à se invi-  
 cem in progressionē, quantum duo poste-  
 riores, erunt simpliciter proportionales, &  
 productum extremorum erit æquale pro-  
 ducto mediorum 6.28.)

12. Sit Quantitas  $A B$  divisa in  $C$ , in  $D$ , in  $E$ , in  $F$  &c. ita ut  $A B. A C :: A C. A D :: A D. A E$ , &c. Dico  $B C. C D. D E. E F$  &c.



esse in progressionē Geometrica continue proportionales, &  $A B. A C :: B C. C D :: C D. D E$  &c. nam quia  $A B. A C :: A C. A D$  erit *dividendo*  $A B$  minus  $A C$ . (id est,  $C B$ .)  $A C :: A C$  minus  $A D$ . (id est,  $D C$ .)  $A D$  & per consequens *alternando*  $C B. D C :: A C. A D$  vel  $:: A B. A C$ . Sic de omnibus aliis probabitur  $D C. E D. F E$  &c.

13. Sit progressio quantitatū in linea recta  $B C, C D, D E, E F$ , &c. Et sit summa  $C d$  æqualis termino secundo  $C D$ , ut habeamus  $d B$ , differentiam primi & secundi termini, & fiat ut  $B d$  ad  $B C ::$  sic  $B C$  ad aliquam quartam lineam, nimirum  $B A$ . Dico si numerus terminorum  $B C, C D, D E$  &c. sit finitus, licet quam maximus sit, omnes hos terminos simul sumtos, etiam si



Alorum sint centum mille milliones, fore minores  $B A$ . Si quis supponeret esse hos terminos infinitos in multitudine, tunc

hi termini simul sumti erunt præcise æquales  $BA$ : Nam quia per hypothesin  $Bd$  (id est,  $BC$  minus  $Cd$  vel  $CD$ ) est ad  $BC$  :: ut  $BC$  (i. e.  $AB$  minus  $AC$ ) est ad  $AB$ ; Facile patebit ut  $BC. CD :: AB. AC :: AC. AD$  &c. & per consequens omnes termini  $CD. DE. EF$  &c. erunt adhuc intra punctum  $A$ , ad quod eò magis appropinquabitur quo magis augebitur numerus terminorum; Et sic quidem videmus omnes hos terminos, (qui in schola appellantur *partes proportionales*) si actu infiniti essent, non facere longitudinem infinitam, quoniam sunt inclusi in  $BA$ .

14. Hæc demonstratio facilior redditur in exemplo progressionis particularis, cujus termini sunt in ratione dupla, ex. gr.  $BC$  dupla  $CD$ . &  $CD$  dupla  $DE$ . &c. nam si numerus terminorum est finitus, etiam si illorum essent centum milliones, & sumatur terminus ultimus & minimus, ex. gr.  $FE$ , eique adjungatur alia quantitas ipsi æqualis, scil.  $FA$ ; manifestum est  $EA$  esse æquale penultimo termino  $ED$ ; nam penultimus  $ED$  est duplus ultimi  $FE$ , per hypothesin. Sed  $EA$  etiam est duplus  $FE$ , quia ponimus  $FA$  æquale  $E. F$ . Similiter  $AE$  cum  $DE$ , id est,  $AD$ , erit æquale sequenti termino  $CD$ ; & tandem  $AC$  erit æquale  $BC$ . Ita ut exinde videre liceat primum & maximum terminum semper æ-

qualem esse omnibus reliquis simul sumtis, modo addatur quantitas æqualis ultimo & minimo termino : Verum si nihil addatur, primus semper erit major omnibus reliquis simul sumtis. Si quis supponat hos terminos esse actu infinitos, tunc maximus  $BC$  erit præcise æqualis omnibus reliquis infinitis simul sumtis,  $CD, DE, EF$  &c.

$\begin{array}{ccccccc} & FE & D & & C & & d & & B \\ A & & & & & & & & \end{array}$

nam quivis facile videt quo plures adjiciuntur termini eo magis appropinquare versus  $A$ , dum semper medietas quæ restat diminuitur. Sed quando continuo quantitas diminuitur medietate, & residuum iterum medietate & sic porro, manifestum est, si supponatur actu infinites medietate fuisse diminutam, nihil tandem restare. Hoc etiam demonstrari potest per deductionem ad impossibile monstrando omnes hos terminos infinitos simul sumtos, neque esse majores neque minores  $BA$ .

15. Exinde resolvi possunt difficultates quæ in scholis moventur contra divisibilitatem continui, & a Geometriæ ignaris pro insolubilibus habentur, cum tamen in rei veritate nihil sint quam meri paralogismi.

16. Si ponantur duæ progressionēs, altera Geometrica incipiendo  $ab$  1. & altera Arithmetica incipiendo  $ab$  0, ita ut termini



mini unius respondeant e regione terminis alterius, tunc termini Arithmeticae appellantur *Logarithmi*, & *exponentes*, ut

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256.

17. Quod in progressionem Geometricam, peragitur per multiplicationem & divisionem, id in Logarithmis absolvitur per additionem & subtractionem: ut si essent res numeri 2. & 8. :: 64. & desideraretur quartus numerus proportionalis in progressionem Geometricam, necessum erit multiplicare 8. per 64. (utpote qui sunt duo termini medii) nam productum 512. erit æquale (6.28.) producto ex 2. & alio quarto numero, tanquam extremis quatuor proportionalium: ad inveniendum vero quartum hunc numerum, duntaxat necesse est dividere 512. per 2. & prodibunt 256. eritque tota ratio 2. 8. :: 64. 256. ita ut 64. & 256. tantum a se invicem distent in ordine progressionis, quantum 2. & 8. (8. 11.) sed si loco numerorum Geometricorum 2.8::64. sumti fuerint Logarithmi ipsis respondentes, nimirum 1. 3. :: 6. & quis veller quærere Logarithmum quartum, debuisset addere 3. & 6. ut prodeant 9. & subtrahere 1. de 9. ut prodeant 8. qui esset Logarithmus numero Geometrico 256. respondens.

18. Similiter si sumantur duo numeri Geometrici 4. & 8. quibus respondent Lo-

rithmi 2. & 3. multiplicatis 4. per 8. prodibunt 32. qui respondent Logarithmo 5. qui ex additione 2. & 3. oritur.

19. Similiter si sumantur 16. & multiplicentur per seipfos, resultabunt 256. qui respondebunt Logarithmo 8. qui exinde oritur si 4. sibi ipsi addatur.

20. Si quis desideraret numerum Geometricum Logarithmo 16. respondentem deberet sumere 256. qui respondet 8. & illos in se multiplicare, & prodibunt 65536.

21. Si quis etiam desideraret numerum Geometricum, qui responderet Logarithmo 23. debet sumere duos Logarithmos, qui simul sumti constituent 23. ut 7. & 16. & inter se multiplicare numeros Geometricos ipsis respondentes, nimirum 128. (sub 7.) per 65536. (qui essent sub 16.) & productum erit 8388608. quod responderet 23. Logarithmo, id est, quod vigesimum quartum locum, post numerum primum 1. habere debet.

22. Exinde videre est qua ratione facile quis respondere possit quaestioni quae ordinariè proponitur, quanti veniret equus, si hac conditione emeretur, ut pro primo clavo solvatur, teruncius & pro secundo clavo duo teruncii, pro tercio quatuor, pro quarto octo, & sic usque ad vigesimum quattum: Nam vigesimus quartus con-

Habit

stabit 8388608 terunciis, id est, 69905 libris 8. terunciis, & duplicata hac summa (juxta 8. 14.) prodibit totum equum constare 139810. libris.

23. Si quis haberet in magnis tabulis alicujus libri duas progressionem longas jam absolutas, ubi Geometrica Arithmeticae responderet; posset quis in numeris Geometricis inveniendis calculandi labore superfedere: nam si quis daret hos tres numeros 32. 64. 128. & desideraret quantum Geometricum; loco multiplicationis 64. per 128. & divisionis producti per 32. (quod in magnis numeris maxime molestum est) saltem sumantur Logarithmi trium numerorum datorum, nimirum 5. 6. 7. addantur 6. & 7. & à producto 13. subtrahantur 5. restabuntque 8. Logarithmus quarti numeri Geometrici: consule dein tabulam & respondebit Logarithmo 8. numerus Geometricus 256.

24. Sed quoniam in tali progressionem Geometrica omnes numeri non occurrunt, hoc invenerunt medium constitueruntque duas progressionem, quarum altera, quæ continet omnes numeros 1. 2. 3. 4. 5. &c. & videtur esse progressio Arithmetica, nihilominus proprietates habet Geometricæ; & altera quæ continet numeros apparenter maxime irregulares, nihilominus est progressio arithmetica. Ecce lineam quæ perfectè continet omnia hæc mysteria.

25. Sit



$AD$ ,  $AE$  erunt in progressionē Arithmetica, ut 1. 2. 3. 4. & sic repræsentabunt Logarithmos, quibus respondebunt lineæ Geometricæ  $Aa$ ,  $Bb$ ,  $Cc$ , &c.

26. Quælibet partium  $ED$ ,  $DC$  &c. sit æqualiter divisa in  $F$ ,  $G$ ,  $H$  &c. & sint ductæ parallelæ  $Ff$ ,  $Gg$  & mediæ proportionales inter collaterales, id est,  $Ee$ .  $Ff::Ff$ .  $Dd::Dd$ .  $Gg$ . &c. denuo sint aliæ mediæ proportionales ductæ per medium cuiusvis partis  $EF$ ,  $FD$ ,  $DG$  &c. & sic consequenter, usque dum lineæ parallelæ sibi invicem maximè vicinæ fiant, & tandem concipiatur linea curva, quæ transeat per extremitates omnium harum parallelarum  $e$ ,  $f$ ,  $d$ ,  $g$  &c. Hac ratione habebis lineam, cuius proprietates sunt notatu dignissimæ, & usus maximi, prout suo loco patebit.

27. Si hæc figura accurata cum diligentia in tabula quadam magna describeretur, tunc posset quælibet pars  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ , &c. non tantum in 100. vel 1,000, sed in 10,000. vel 100,000. vel plures divididi. Ita ut si  $AB$  fuerit 100,000.  $AC$  esset 2000,000. &  $AD$  300,000, &c. secundum progressionem Arithmeticam.

28. Suppositâ linea  $Ee$  10,000. partium, concipimus per quamvis partem lineas parallelas cum  $AE$ , quæ curvam in totidem punctis secant. Exempli gratia, sic



424, tunc esset hic numerus Logarithmus numeri 9,000. &c.

29 Hac ratione posset quis conficere tabulam Logarithmorum ab 1. usque ad 10,000, & ulterius, si quis voluerit producere lineam *AE*.

30. Nota, ut habeas omnes Logarithmos ab 1. usque ad 10,000, sufficit quærere Logarithmos post 1,000. usque ad 10,000. id est, (ducta linea parallela *dt*) sumendo Logarithmos omnium partium post *t* usque ad *e*, quarum Logarithmi continentur inter *E* & *D*: nam per hoc habebis Logarithmos omnium aliarum partium, quæ sunt post *t* ad *E*, & quarum Logarithmi sunt inter *D* & *A*. Exempli gratia, cum *O o* sit 9,900. partium & ejus Logarithmus 399,563, idem numerus assumi poterit pro Logarithmo numeri *N* 990. & numeri *y* *T* 99. mutando duntaxat cifram primam 3. quia secundum compositionem hujus lineæ *O*, *N*. vel *N* *T*, æquales esse debent *E* *D* vel *D* *C*, quod quivis facile demonstrabit. Sic *O* *N*, vel *N* *T* continebunt 100,000. & quia *A* *O* est 399,563. ablati *O* *N* 100,000, restabunt 299,563. pro *A* *T*, à quibus si iterum auferantur 100,000. restabunt 199,563 pro *A* *T*; & eadem ratione cum *AV* habeat 395,424. pro Logarithmo numeri *V* 9,000. etiam

etiam habebis 095, 424. pro logarithmo  $X \times 9$ . vel 195, 424. pro logarithmo numeri 90. vel 295, 424. pro logarithmo numeri 900.

31. Ut hæc omnia etiam ad praxim deducantur per calculum, non necesse est ullam talium figurarum delineationem instituere, sed solum delineatas concipere: nam ope arithmetice possum invenire numerum medium proportionalem  $Ff$  inter duos  $O d$  &  $E e$ , & postea etiam medios inter  $D d$  &  $Ff$ , vel inter  $Ff$  &  $E e$  &c. Sed ea quæ explicavimus sufficiunt, ut habeamus cognitionem, quantum quidem nobis necesse est, naturæ & artificii logarithmorum: nam opus non est, ut ipsi calculi laborem subeamus, & tabulam logarithmorum condamus, quia jam peractus est hic labor. Deus enim, boni publici causa, homines quosdam excitavit, quibus magnam largitus fuit patientiam, ut superare potuerint molestias laborum, quæ videri poterant intolerabiles. Scimus quippe ultra viginti viros, stipendio ad id conductos per viginti annos & quod excedit in calculando assiduitate plane improba defudasse.

32. Præter has duas progressionem datur & tertia, quæ appellatur *Harmonica*, quando sumtis tribus terminis, qui



se immediate consequantur, observare licet, quod maximus ad minimum fit ut differentia inter maximum & medium, ad differentiam inter medium & minimum, ut 30. 20. 15. 5. &c. sunt in progressionem harmonica; nam sumtis 30. 20. 15. differentia inter 30. & 20. est 10. & differentia inter 20. & 15. est 5. sed 10. 5 :: 30. 15.

33. Hæc progressio potest diminui in infinitam, sed non augeri.

*Ea quæ jam dicta sunt de hac progressionem magnum usum non præstant, neque etiam plane extraordinariis proferendis nunc incumbo.*

*In continuatione hujus Geometriæ observabuntur quedam proprietates hujus progressionis notatu dignissimæ, quæ aliquam lucem adferre poterunt illis, quæ habemus de musica veterum, cujus obscuritas nondum detecta est. Ibi demonstrabitur respectus seu habitudo, quam hyperbole habet ad hanc progressionem; nam quemadmodum angulus rectilineus inservit inveniendis inter duas datas tot mediis, quot quis voluerit habere in ratione arithmetica; Et ut linea illa curva, quam descripsimus in usum logarithmorum, etiam inservit inveniendis inter duas datas tot mediis, quot quis desideraverit in ratione Geometrica; Sic notare licebit hyperbolen inserv-*

*servire inveniendis inter duas datas tot mediis, quot quis voluerit in ratione harmonica.*

34. Datur quoque progressio quadratorum, & cuborum, quadrati quadratorum, fursolidorum, quadrati cuborum &c. ut 1. 4. 9. 16. 25. 36. &c. quia omnes sunt numeri quadrati, quorum radices sunt numeri naturales 1. 2. 3. 4. 5. 6. &c. Similiter 1. 8. 27. 64. 125. 216. sunt cubi eorundem numerorum. Similiter 1. 16. 81. 256. 625. 1296. sunt quadrati quadrata eorundem numerorum.

35. In progressione quadratorum posita 0 pro primo termino, sic 0 1. 4. 9. 16. &c. summa omnium terminorum est major tertia parte ultimi termini multiplicati per numerum terminorum; & hic excessus qui est ultra tertiam, semper tanto minor est, quo major est numerus terminorum. Similiter in progressione cuborum, hæc summa terminorum major est quarta parte; & in quadrati quadratis, illa est major quinta parte, & sic consequenter in reliquis. Hoc ut probemus, sufficit saltim facere inductionem, prout videre est in hac tabula, ubi secunda columna continet progressionem quadratorum post 0. Tertia columna complectitur summas terminorum. Exempli gratia, ibi videre licet summam post 0. usque

1	0	0	0	$\frac{1}{1}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{6}$
2	1	1	2	$\frac{5}{12}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{12}$
3	4	5	12	$\frac{7}{18}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{18}$
4	9	14	36	$\frac{9}{24}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{24}$
5	16	30	80	$\frac{11}{30}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{30}$
6	25	55	150	$\frac{13}{36}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{36}$
7	36	91	252					

que ad 9. esse 14. Quarta columna continet productum cujusque termini multiplicati per numerum terminorum qui sunt post 0. usque ad ipsum; numerus ille notatus est in prima columna, ut 36. est productum ex 9. multiplicatis per 4. Quinta columna comprehendit fractiones, quæ exhibent proportionem numerorum tertie

tiæ & quartæ columnæ, ut è regione 14.

& 36. ponitur  $\frac{7}{18}$ , qua fractione hoc volumus 14. esse ad 36. ut 7. est ad 18. & sic etiam esse summum terminorum 14. ad productum ex 9. multiplicatis per 4. nim. ad 36. ut 7. ad 18. Vltcrius, in eadem co-


1	0	0	0	$\frac{1}{1}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{6}$
2	1	1	2	$\frac{5}{12}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{12}$
3	4	5	12	$\frac{7}{18}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{18}$
4	9	14	36	$\frac{9}{24}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{24}$
5	16	30	80	$\frac{11}{30}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{30}$
6	25	55	150	$\frac{13}{36}$	vel	$\frac{1}{3}$	†	$\frac{1}{36}$
7	36	91	252					

lumna

lumina quinta, post  $\frac{7}{8}$  observantur & hi  
 characteres (vel  $\frac{1}{3} + \frac{1}{8}$ ;) quibus hoc  
 volumus,  $\frac{7}{8}$  tantum valere, quantum una  
 tertia una cum una decima octava parte,  
 quia revera  $\frac{7}{8}$  tantum valent quantum  $\frac{5}{8}$   
 una cum  $\frac{1}{8}$  id est,  $\frac{1}{3} + \frac{1}{8}$  ita ut summa  
 14. sit tertia pars ex producto 36. & præter  
 illam adhuc una decima octava pars ex 36.  
 Similiter, reperio 30. tanquam summam ter-  
 minorum usque ad 16. esse majorem tertia  
 parte ex 80 tanquam producto ex 16. per 5.  
 & excessum esse  $\frac{1}{24}$ : Nam  $\frac{30}{80}$  tantum va-  
 lent quantum  $\frac{3}{8}$ , vel quantum  $\frac{9}{24}$  vel quan-  
 tum  $\frac{8}{24} + \frac{1}{24}$  vel tandem quantum  $\frac{1}{3} + \frac{1}{24}$   
 Sed  $\frac{1}{24}$  tantum non est quantum  $\frac{1}{8}$ ; sic  
 igitur in continuatione hujus tabulæ obser-  
 vare licet, hos excessus, qui sunt ultra tertiam  
 partem, semper diminui, prout numerus  
 terminorum crescit: nam hi excessus  
 sunt 1 1 1 1 1 &c. dum denominator  
 24 30 36 42 48  
 fractionis interea semper augetur numero  
 senario.

34. Si quis constitueret similem tabulam cuborum, tunc videra erit fractiones, quæ erunt ultra partem quartam, semper valore diminui, dum interea illarum denominator augetur quaternario, quoties novus terminus in progressionē additus fuerit; & similiter in reliquis progressionibus per similes tabulas id observare dabitur, quod generaliter in propositione præcedente dictum fuit.

*Omnia hæc erunt maxime utilia in continuatione hujus Geometria, ubi etiam plures aliæ progressionēs occurrent.*





## LIBER ULTIMUS.


*Problemata vel Geometria  
Practica.*

## I.


**P**roblema appellatur in Geometria propositio, quæ docet aliquid constituere ac praxin demonstrat, contra ac *Theoremata*, quæ sunt propositiones speculativæ, in quibus considerantur passionēs seu proprietates rerum jam factarum.

2. Ex puncto dato a quod est in linea b a c perpendicularē erigere.

Abseinde circino utrinque partes æquales a c & a b : parum refert si hæ partes magnæ sint seu parvæ, modo fuerint æquales. Aperi paulo plus crura circini & ex punctis b & c, tanquam centris, duos describe arcus similes, se mutuo in puncto d interfecantes. Postea adplicata regula ad puncta a & d, duc lineam a d, quæ erit perpendicularis desiderata (2. 16.)




3. *Ex puncto dato d ducere perpendiculararem versus lineam b*



a c. Ex centro *d* describe arcum circuli, qui secet lineam in duobus locis *b* & *c*: dein ex hisce duobus punctis *b* & *c* eadem circini apertura, describe duos parvos arcus, se mutuo interfecantes in *e*, & erit linea

*de* perpendicularis quæsitæ. (2. 16.)

4 Quando puncta data *a* vel *d* sunt ad extremitates chartæ vel superficiæ, in qua figura constitui debet, & non assumi potest distantia debita ultra punctum *a*, secundum praxes præcedentes; tunc hac ratione processus erit instituendus. Si pun-



ctum *a* datum est in linea, assume extra lineam punctum, ubi libuerit versus *e*, & ex eo tanquam centro describe circulum, qui transeat per *a* &


secet lineam in *b*: Dein ex *b* duc lineam *be*, quæ si continuata fuerit, secabit circulum in *d*; recta *da* ducta erit perpendicularis ad *ba*. (4. 14.) Si verò punctum *d* datum est extra lineam, duc lineam pro habitu *db*, & ex medio hujus lineæ describe

circ-



circuluum  $b a d$ , qui secet  $b a$  in  $a$ ; linea  $d a$  erit perpendicularis desiderata, (4.14.)

5. *Ad datum punctum, data recte linea, parallelam ducere.* Sic linea data  $a b$ , & punctum datum  $c$ , per quod ducenda sit parallela: ex puncto  $c$  tanquam centro describe arcum circuli, qui secet lineam datam in  $a$ ; dein in eadem linea data accipe punctum  $b$  pro libitu, quod tamen,




quantum fieri potest, remotum sit à puncto  $a$ , & ex hoc puncto  $b$  eadem circini apertura fac alium arcum circuli  $d$ : Accipe circino distantiam  $a b$ , & hac ipsa apertura, ex puncto  $c$  tanquam centro, describe arcum qui secet alium in  $d$ ; applicata regula ad duo puncta  $c$  &  $d$  habebis lineam  $c d$  parallelam lineæ  $a b$ ; nam quadrilaterum  $c a b d$ , habet latera opposita æqualia per ipsam constructionem; & per consequens est parallelogrammum, per conversam novæ propositionis libri ter-

iii.

6. *Inter duas lineas datas  $a c$  &  $e c$  invenire mediam proportionalem*  
Dispositis lineis datis  $a c$  &  $e c$  in lineam


rectam, ut constituent lineam totam  $ac$ ,



quare in ea medium  $f$  & ex hoc puncto  $f$  describe circum-  
lum  $abc$ : erige perpendi-  
cularem  $eb$ , quæ secet cir-  
cumferentiam circuli in  
puncto  $b$ , erit linea  $ab$  me-  
dia proportionalis, ita ut  
 $ac \cdot eb :: eb \cdot ec$ . (6. 66)


3. *Constituere quadratum equa-  
le reſtanguſulo dato.* Accipe mediam  
proportionalem inter duo latera rectangu-  
li, & quadratum super hac media constitu-  
tum erit quaſitum (6 59.)

8. *Datis tribus lineis, invenire  
quartam proportionalem.* Sint lineæ  
datæ  $ad, de, ab$ ; constitutis  $ad$  &  $ab$  in  
unam rectam, &  $de$  transver-  
ſam poſita, ut emergat trian-  
gulum  $ade$ , produc latus  $ae$   
verſus  $c$ , & ex puncto  $b$  duc  
paralleliam  $bc$ , dico lineam  
 $bc$  eſſe quartam proportiona-  
lem deſideratam, & ut  $ad, de. :: ab. bc$ .  
(6. 43.)




9. *Triangulo dato  $abc$  equa-  
le parallelogrammum reſtanguſulum  
conſtituere.* Per ſummitatem  $c$  duc  $ce$   
paralleliam baſi  $ab$ , erit reſtanguſulum  
 $abdc$

$ab$  &  $c$  duplum triangu-  
li  $acb$ : (3. 18.) divisa  
verò basi  $ab$  in duas par-  
tes æquales, & erecta per-  
pendiculari, orietur re-  
ctangulum æquale trian-  
gulo.




10. Dato rectangulo, constitue-  
re aliud rectangulum æquale, quod  
habeat longitudinem datam. Sit re-  
ctangulum datum  $abc$ , cui consti-  
tutum sit aliud æquale,  
quod pro latere habeat lon-  
gitudinem  $ei$ . Hic habe-  
mus tres lineas datas, ni-  
mirum  $ab$ ,  $bc$  (quæ sunt  
latera rectanguli dati) &  
 $ei$ , quæ esse debet latus al-  
terius rectanguli constituendi. Nunc igitur  
inquirenda est quarta linea, quæ sit  
alterum latus hujus rectanguli. Datis his  
tribus lineis, quære ex illis quartam pro-  
portionalem (9. 8.) quæ sit  $eh$ , ita ut  $ei$ .  
 $ab :: bc :: eh$ : dico rectangulum  $iebh$  fore  
desideratum æquale rectangulo  $abc$ .  
(6. 27.)



11. Quodcunque polygonum in  
quadratum effingere. Resolve poly-  
gonum in triangula (3. 22. vel 24.) & con-  
stitue tot rectangula æqualia his triangu-

lis, 9 9.) ita ut omnia hæc rectangula habeant eandem longitudinem: (9. 10.) conjunge omnia hæc rectangula, ut unum ex illis resultet, & fac quadratum (9. 7.) æquale huic rectangulo, & habebis quod quæris.

*12. Dividere circulum in quatuor, in sex, & omnes arcus in duas partes æquales.* Vt dividatur in quatuor partes, necessum est ducere duas perpendiculares per centrum, ut *dac* & *Bae*.



Si eum vis dividere in octo partes, divide quemvis arcum *Bc*, *e* & *c*. in duas partes; quod fit, si ex punctis *B* & *c* duos arcus eadem circini apertura descripseris: nam ducta linea ex puncto in-

tersectionis ad centrum *a*, dividet arcum *B* & *c* in duas partes æquales: eodem modo procedes cum reliquis arcubus. Vt dividere possis circulum in sex partes, accipe circino semidiametrum: nam ea nim. semidiameter sexies circumferentiæ applicata, hanc perfecte metietur: sic consequenter dividi potest circulus in partes 12. & 24. & 48. &c.

*13. Di-*

*13. Dividere circulum in quinque, in quindecim & alias partes aequales.* Hoc fieri potest geometricè hac

methodo, quam demonstro in Algebra. Constitue triangulum rectangulum, cujus alterum crus sit semidiameter circuli, & alterum semissis semidiametri. Ab hypotenusa hujus trianguli aufer dimidium

semidiametri, residuum erit chorda 36. & latus Decagoni. Duplicato hoc arcu, prodi-

bi arcus 72. qui est quinta pars circuli; &

chorda horum 72. erit hypotenusa trianguli rectanguli, cujus alterum crus est semidiameter, & alterum decagoni latus. Sed quemadmodum per præcedentem docui-

mus invenire 60. Sic etiam habebimus dif-

ferentiam inter 36. & 60. nimirum 24. quæ est decima quinta pars circuli. Sed in praxi brevissima & certissima via est, circino iteratis vicibus aperturam querere, quæ, si quinquies adplicata fuerit circumferentiæ, eam exacte metiatur: postea qualibet harum partium eodem modo dividatur in tres, querendo per circinum & repetendo, si prima vice rem non tetigeris: & habebis

F 5      cir.

circulum in quindecim partes divisum. Si quælibet harum 15. partium etiam dividatur in quatuor, & quælibet harum quatuor in sex, erit totus circulus in 360. gradus divisus. Et hæc divisio maximè commoda est ad praxin. Nota, quod nondum inventa sit methodus dividere geometricè arcum, in tres partes æquales, neque in quinque, neque in septem, neque in alias partes impares. Dico geometricè, nihil præter lineam rectam & circulum adhibendo.

*Divisio hæc circuli in 360. gradus etiam maximè utilis est, si quis sciverit usum circini seu instrumenti proportionum: est hoc genus aliquod circini, quod habet brachia*



*sa B, & C, in quibus notata sunt diversa lineæ & diversa divisiones, quarum illæ, quæ maximam usum præstant, reducuntur ad duas: nam in uno*

*latere circini est quædam lineæ in quobis brachio a e B, & a e C, quæ inserit divisioni totius circuli in 360. gr. una opera absolvenda, & ut pro lubitu gradus quoscunque sumere possim. Divisio circini absolvitur modo sequente.....*

14. Instrumentum proportionum  
signare seu preparare, ut in inserviat  
divi-


*divisioni circuli.* Concipe semicirculum

$a E D B$ , qui exacte divisus sit in 180. si ex puncto  $a$  per singulos gradus ducerentur arcus, qui secarent lineam  $a e B$ ; exempli gratia, si ex 60.  $E$  duceretur arcus  $E e$ , & ex 90.  $D$  arcus  $D d$  &c. notari deberet 60. in brachio instrumenti è regione  $e$ , & 90, è regione  $d$  &c. Si in altero brachio  $a C$  pariter processeris, habebis hoc latus instrumenti divisum, prout necessum est.

15. *Explicare usum instrumenti proportionum, quatenus inservit divisioni circuli.* Sit datus circulus  $A f$ , accipe circino communi semidiametrum  $A f$ , dein adplicato altero pede hujus circini communis ad punctum  $e$ , id est, gradum 60. in uno brachio circini seu instrumenti proportionum, tandiu remove aut admove alterum brachium, usque dum pes alter communis circini præcisè incidat in punctum  $e'$  alterius brachii Instrumenti proportionum, ita ut distantia  $e e'$  equalis sit semidiametro  $A f$ ; Jam si statim in-


venire volueris 90. circuli dati, impone saltem duos pedes circini in duo puncta  $d, d'$ , & transfer hanc distantiam in  $f g$ , & habebis arcum  $f g$  90, graduum. Sic si vo-

lueris sumere 35. gradus, saltim impone pedes circini communis in puncta lineæ  $aB$ , &  $c$ , in quibus est 35. gradus, & transfer hanc distantiam in circum datum, & hac ratione procedere debes cum quovis



alio gradu. Omnia hæc fundantur in propositionibus 42. 43. 49. 50 libri sexti: nam quemadmodum omnes circuli sunt figuræ similes, (6. 50.) chorda  $AD$  ad semidiametrum  $AF$  ut chorda  $AD$  ad semidiametrum  $ed$ , id est, ut  $ad$  ad  $ae$ . Aliunde verò triangula  $add$  &  $ace$  sunt similia, & sic  $dd::ad. ae$ . Sed  $dd$  per constructionem æqualis est  $fg$  &  $ee$  lineæ  $Af$ : ergo  $fg. Af::ad. ae$ .

**16. Signare s. preparare instrumentum proportionum, ut inservire possit divisioni linearum rectorum.** Ex centro circini sunt in brachiis




ductæ duæ lineæ versus  $B$  &  $C$ , quarum quolibet divisa sit in 100. vel 200 partes æquales, & sic inservient ad dividendam una opera lineam da-



datam, in quocunque partes volueris. Exempli gratia, sit linea data  $bc$  &  $ab$  ea debeant sumi  $\frac{25}{97}$  id est 25 nonagesimæ septimæ partes; Hoc in passu dividi deberet tota linea  $bc$  in 97 partes æquales, ut ex iis sumi possent 25. quod prolixum esset; sed ope circini proportionum id facile absolvi-  
tur. Accipe circino communi longitudinem lineæ  $bc$ , & applicato uno pede nonagesimæ septimæ parti  $B$  unius brachii instrumenti proportionum, admove vel remove alterum brachium tamdiu, usque dum pes alter præcise incidat in 97. partem  $C$  alterius brachii; dein transfer distantiam  $ec$  in  $bf$ , &  $bf$  erit exacte  $\frac{25}{97}$  totius lineæ  $bc$ : id quod etiam fundatur in eo, quod triangula  $ABC$  &  $Aec$  sunt similia.

*17. Super datam lineam constituere angulum tot graduum, quot desiderave-*


*rit.* Sit linea data  $ac$ , super qua constituendus detur angulus



30. graduum. Ex puncto  $a$ , tanquam centro, describe circulum  $ef$ , in quo sumes per circinum proportionem, vel aliter 30. gradus à  $c$  usque ad  $f$ , & per

hunc 30. gradum ducatur linea  $af$ , quæ cum linea  $ac$  constituet angulum 30. graduum.

18. *Cognitis angulis dati trianguli & uno latere, invenire reliqua latera.* Sit tibi dicatur, esse alicubi triangulum, cujus basis  $AC$  sit decem ulnarum




& anguli ad basin, ut  $ACB$  habeat 150. gr. & angulus  $CAB$  20. gr. (& per consequens tertius angulus ad verticem erit 10. quia omnes tres anguli 150. 20. 10. simul sumti efficiunt 180. id est, duos rectos) & à te quæreretur, quot ulnas habere debeat quodvis reliquorum duorum laterum  $AB$ , &  $CB$ . Fac in charta vel potius in tenui chartaceo triangulum simile  $acb$  sequentem in modum: Accipe basin pro lubitu  $ac$  10. pollices longam, vel quascunque alias decem

cem partes : super  $c$  a describe duos angulos, alterum  $c a b$  20. grad. & alterum  $a c b$  150. grad. (9. 27.) & duæ lineæ  $a b$ ,  $c b$  se mutuo interfecabunt in aliquo loco, nimirum in  $b$ . Metire igitur quot pollices sint in  $a b$  vel in  $c b$ : nam certus esse potes, tot esse ulnas in  $AB$ , quot pollices fuerunt inventi in  $ab$ ; & similiter tot esse in  $CB$ , quot fuerunt in  $cb$ : nam cum triangula propter angulos æquales sint similia, eris  $ac$ , ad  $ab$  ::  $AC$ .  
A. B.

19. *Metiri distantias, altitudines, profunditates, & generaliter omnes magnitudines locorum diffitorum & inaccessibilium.* Si in vertice alicujus montis, qui eminens apparet, constituta sit turris *B E*; & quis vellet observare illius distantiam & altitudinem, is deberet aliquo instrumento (ex. gr. quadrante, id est, quarta circuli parte, quæ divisa sit in 90. grad. & instructa regula quadam, circa centrum mobili, quam *diopiram* appellamus) hoc inquam instrumento sumere deberet duos angulos in diversis stationibus, sequentem in modum. Si es in statione *A*, ita constitue instrumentum, ut latus unum exacte respondeat lineæ horizontali *AD*, & hunc situm neque attollendo neque deprimendo muta: Applica

oculum ad  $A$ , id est, centrum instrumenti & dirigere regulam versus verticem turris  $B$  tamdiu, donec illa cum tuo radio visuali coincidat: tunc hæc regula in circumferentia instrumenti notabit gradus anguli  $BAD$ : Est enim circumferentia instru-




menti in gradus divisa. Postea muta stationem, & progredere in loco plano ad 10. ulnas (vel pro lubitu in quavis alia distantia) usque ad  $C$ , & ibi denuo cape alium angulum  $BCD$ , cujus ope habebis angulum deinceps  $BCA$ , quia hi duo simul sumti æquales sunt duobus rectis: & sic in triangulo  $ACB$  cognitam habes basin, quam 10. ulnis longam sumfisti: præterea etiam cognitos habes duos angulos ad basin; & per consequens ex hisce potes elicere latus  $CB$  vel latus  $AB$  (9. 18.) Accipies etiam altitudinem  $BD$ , vel distantiam

tiam  $AD$ , si in parvo triangulo simili du-  
cas ex puncto  $b$  perpendicularem  $bd$ ; nam  
 $BD$  vel  $AD$  habebunt tot ulnas, quot  
 $bd$ , vel  $ad$  pollices. Si acquisita altitu-  
dine  $BD$ , eadem methodo etiam investi-  
getur altitudo  $ED$ , habebis quoque ma-  
gnitudinem  $EB$  à vertice ad basin vel pe-  
dem turris.

Interdum loco accessus versus terram &  
observationum à vertice ad basin, nec non  
angulorum, qui à radiis visualibus & hori-  
zontali constituentur; interdum inquam  
conducit sumere duas stationes juxta se in-  
vicem: sed ad idem recidit, & praxis reve-  
ra non differt. Hoc medio, ut quibus videt,  
metiri possumus omnes magnitudines, quæ  
saltim concipi possunt, si modo extremitates  
duorum locorum distitorum observare licet.  
Nolo hic pluribus describere praxes specia-  
les, neque enarrare commoda ex perspicil-  
lis & opticis tubis, qui dioptræ instrumen-  
ti applicari possunt commodo observantium  
inestimabili.

## 20. Delineare planum alicujus loci.


Sit urbs vel alius locus  $AECDE$ , & desi-



deretur à te illius  
planum delineari;  
Accipe omnes di-  
stantias laterum &  
linearum ex angulo  
in angulum ducta-  
rum, easque trans-

fer

fer in chartam secundam proportionem:  
Exempli gratia inventa  $AB$  30. ultimarum,




$BE$  59.  $CD$  50.  $BE$   
67.  $AE$  49. &c. &  
facta in charta ali-  
qua scala, divisa in  
100. partes parvas,  
duc lineam  $ab$  30.

partium,  $bc$  67.  $ae$

44. hæ lineæ simul conjunctæ constituunt  
triangulum  $ABE$ , & si continuaveris ef-  
ficere triangulum  $bce$  simile  $BE C$ , &c.  
habebis figuram totam  $abcde$  similem  
loco  $AB C D E$ .

21. Si non datur intrare locum, vel  
metiri distantias angulorum  $BE$ ,  $EC$ , ne-  
cessum est sumere angulos loci, eosque in  
figuram transferre, ita ut si angulus  $BAE$   
fuerit 66. grad. etiam angulus  $bac$  sit 66.  
grad. & sic de reliquis.

22. *Exhibere delineationem urbis  
vel regionis.* Ascende in duo loca eleva-  
ta  $A$  &  $B$ , è quibus conspiciere possis urbem  
vel regionem, cujus delineationem dare vis.  
Habeas quadrantem, vel integrum circulum  
vel etiam saltem semicirculum in gradus di-  
visum & dioptrà circa centrum mobili in-  
structum: colloca primo instrumentum su-  
per  $A$ , ita ut unum latus respiciat ex  $A$  ver-  
sus  $B$ . instrumento sic collocato ac firmato,  
respice turres, ædes, montes & alia loca no-  
tabi.



tabilia ut,  $E D, C$ , &c. atque omnes hos angulos accipe mediante dioptra, eisque memorie ergo nota; angulus  $CAB$ , exempli

○ I      ○ I

gratia, est  $50. 30.$  angulus  $DAB$   $45. 8'$  &c. Dein procede eodem modo super  $B$  & nota

○ I

angulum  $ABC$  esse  $40. 10.$  & angulum  $ABD$

○ I

$47. 28.$  &c. Postea in charta assume pro lubitu lineam  $ab$ , & describe angulos æquales illis, quos invenisti;  $cab$  æqualem  $CAB$ ,  $dab$  æqualem  $DAB$ ,  $abc$   $ABC$  &c. & sic habebis puncta  $c, d, e$  &c. quæ erunt in eadem à se invicem distantia ac turres vel alia loca notabilia  $C, D, E$  &c. Datis jam locis principalioribus reliqua facile delineari possunt. Ad instituendam verò operationem accuratiorem, maxime conducet sumere etiam angulos tertii imò quarti loci; ut si omnia coinciderint, quis

quis certus sit, operationem bene fuisse institutam.


23. Cognitis duobus lateribus trianguli, & angulo ab illis lateribus comprehenso, invenire tertium latus & reliquos duos ang. ....

24. Cognitis duobus lateribus & angulo uni horum laterum opposito, invenire tertium latus & reliquos angulos. ....

25. Cognitis omnibus angulis & uno latere invenire reliqua latera. ....

26. Cognitis tribus lateribus, invenire omnes angulos. Hæc omnia exacte inveniuntur, si saltem in chartaceo constituuntur triangula similia.

27. Metiri aream (id est, magnitudinem sive capacitatem interiorem) alicujus trianguli dati  $abc$ . Ex vertice  $b$  duc perpendicularem  $bd$  ad



basin  $ac$  productam, si necesse fuerit; divide  $ac$  in 10. (vel pro la-



libitu in quasvis alias partes ) & vide quot partes contineantur in  $b d$  per 10. habebis aream trianguli, ( 3. 18 ) Vt si  $b d$  contineret 12. partes, quales sunt decem in  $a c$ , tunc necessum esset multiplicare 6. per 10. ut oriantur 60. capacitas trianguli  $a b c$ , id est, triangulum hoc tantum spatii comprehendit, quantum 60. continebunt parva quadrata, quorum quodvis latus esset decima pars lineæ  $a c$ .

*In praxi nulla datur methodus quæ faciliior vel etiam exactior sit, quam hæc ipsa; nihilominus in certis casibus maxime conducit cognitio metiendi abstractè, quæ tamen non habetur nisi mediante calculo. Ex igitur principia, ex quibus artificium calculandi eruitur.*

**28. Cognitis in triangulo rectangulo  $a b d$  duobus lateribus, invenire tertium latus per calculum.**


Sit crus  $b d$  3. ulnarum, & crus  $a d$  4. ulnarum: multiplica 3. per 3. & 4. per 4. ut exinde oriantur duo quadrata, quæ in summam collecta æqualia erunt quadrato hypotenusæ  $a b$ : (6. 61.) & per consequens quadratum  $a b$ : (6. 61. & per consequens quadratum  $a b$  est 9 plus 16. id est 25. Ut igitur mihi confiet magnitudo  $a b$ , saltim sumo latus vel radicem quadratam ex 25. quæ est 5. & exinde concludo  $a b$  esse 5. ulnarum. Si hypothe-

potenusa  $a b$  5. nota est cum uno latere  
 $a d$  4. tunc subtrahi debet quadratum 16. à  
 quadrato 25. & restabunt 9. quorum radix  
 est 3 magnitudo alterius cruris  $b d$ . Inter-  
 dum accidit, ut duo quadrata crurum in u-  
 nam summam collecta, non constituent  
 numerum quadratum, vel ut quadratum  
 unius cruris subtractum à quadrato hypo-  
 tenuse non relinquat numerum quadra-  
 tum: ut si crura sunt 2. & 3. quadrata  
 erunt 4 & 9. que addita faciunt 13. Sed  
 13. non est numerus quadratus & per conse-  
 quens non habet exactam radicem; sed nihil-  
 ominus dantur numeri, qui proxime acce-  
 dunt, ut hic  $3\frac{3}{5}$  est proxime radix ex 13 nam  
 $3\frac{3}{5}$  in se multiplicatis, faciunt 13. minus  
 $\frac{1}{25}$ : & sic latus  $a b$  est  $3\frac{3}{5}$  paulo majus.

*Hic non traditur methodus extrahendi  
 radices quadratas, quia hac est regula A-  
 rithmetice, de qua hic non agitur.*

29. Computare tangentem, se-  
 cantem & sinum 30. graduum. Sit  
 exempli gratia  $b a$  radius sive sinus totus,  
 $a d$  secans 30. grad.  $b d$  tangens,  $c e$  sinus;  
 Observatu facile est,  $b d$  esse semissim lineæ  
 $a d$ : nam ducta  $a g$  alia secante 30. grad.  
 trian-

triangulum  $g a d$  erit  
 æquilaterum: nam  
 quivis angulorum  $g$   
 $d$  &  $a$  erit 60. grad.  
 cum igitur  $b d$  sit se-  
 missis lineæ  $d g$ , et-  
 iam erit semissis lineæ  $a a$ : ob eandem  
 rationem  $c e$  erit semissis lineæ  $a c$ . Po-  
 sito igitur in triangulo rectangulo  $a e c$ ,  
 hypotenusam  $a c$  esse 2. & crus  $a e$  1. &  
 sublato quadrato 1. à quadrato 4. restabunt  
 3. æqualia quadrato lateris  $a e$ , quod æ-  
 quale est  $c o$  ( sinui arcus  $c$ , 1. 60. graduum. )  
 Sed si loco 2. & 1. pro  $a c$  &  $c e$  nos sumamus  
 1, 000, 000 & 500, 000, quadratum ex  $c e$ ,  
 nimirum 250, 000, 000, 000, subtractum  
 à quadrato 1, 000, 000, 000, 000, relin-  
 quet 750, 000, 000, 000, cujus radix quàm  
 proxime est 866, 025, pro  $a e$  vel  $c o$  sinu  
 60. graduum.



30. Cognito  $c e$  sinu anguli cu-  
 juscunque, invenire  $c o$  sinum comple-  
 menti hujus anguli. Complementum  
 anguli, est illud quod ad 90. grad. deest.  
 Exempli gratia, si angulus  $c a b$  habuerit 30.  
 grad. complementum illius erit 60. grad.  
 nam 60. una cum 30. efficiunt 90. grad.  
 Propositio hæc demonstrata est in præce-  
 dente.


31. Co-

31. Cognito  $c$  e *sinu anguli*, & *sinu complementi*, nimirum  $c$  o vel  $a e$ ; invenire *tangentem*  $b d$ , & *secantem*  $a d$ . Quia triangula  $a o c$  &  $a b d$  sunt similia, tunc sequitur  $a e. c e :: a b. b d ::$  &  $a e. a c :: a b. a d ::$  & sic per regulam trium in arithmetica, posito arcum  $c b$  esse 30. grad. elicitur tangentem  $b d$  esse 577, 350. & secantem  $a d$ , 1, 154, 700.

32. Cognitis *sinu*, *tangente* & *secante* alicujus arcus  $b c$ ; invenire *sinum*, *tangentem* & *secantem* *medietatis arcus*. Ducta  $a f$  per medium arcus  $b c$ , erit  $d f. f b :: a d, a b$  (6. 72.) & per consequens dabitur tangens  $b f$  15. grad. ut & sinus & secans eorundem 15. grad. Porro etiam denuo bifariam diviso arcu  $b f$ ,

dabitur sinus, tangens & secans 7. & 30. & postea 3. grad. 45. min. & sic in infinitum.

33. Invenire *sinum*  $c e$  45. grad.



Est hic sinus æqualis sinui complementi eorundem 45. gr. nimirum  $a e$  & per consequens inventi-  
turi etiam tangens & medietas 22. 30. & 11. 15. &c.

34. In-

34. *Invenire sinum 36. grad.*

Postquam circulo inscripsisti pentagonum regulare, habebis proportionem lateris huius pentagoni ad radium. (9. 13.) Sed latus hoc est chorda 72. grad. & semissis huius chordæ est sinus medietatis 72. gr. & min. 36. Hac ratione cognitus est sinus 36 grad. & per consequens etiam tangens & secans ut & semis-

o o o I o I

ses 18. 9. 4. 30. 2. 15. &c.

35. *Invenire sinum, tangentem & secantem 12. grad. & medietatum*

o o o I I

6., 3., 1. 30., 45. &c. Postquam cognita est chorda 24. grad. quæ est latus polygoni regularis 15. laterum (9. 13.) etiam innotescet &c.

36. Omnibus his collectis habebimus sinus, tangentes & secantes angulorum

I o I o I o I o I

45, 1. 30. 2. 15., 3. 4. 4. 30. & reliquos om-

I I

nes de 45. ad 45.

37. *Invenire sinus omnium arcuum, qui sunt inter duos arcus iam inventos à 45. ad 45.* Instituenda est regula proportionum. Exempli gratia,

I I

cum sinus 45. sit 1308. erit sinus 1. 29. quia

G

ut

I I

ut 45. 1. :: 1308. 29. ob eandem rationem

I

sinus 20. erit 581. Similiter, ut habeas si-

O I

num 3 30. sic procedes: cum sinus 3. sit

O I

5233. (9. 35.) & præterea sinus 3. 45. sit  
6540. (9. 32.) apparet hæc 45. minuta, quæ

O O I

sunt inter 3. & 3. 45. importare 1307. pro  
augmentatione sinus: nam sublato 5233.

O I

sinu 3. grad. à 6540. sinu 3. 45. restant 1307.

O I

Si igitur volueris indagare sinum 3. 40. sic

I

dices: Si 45. (quæ sunt post 3. grad. jusque

O I

ad 3. 45.) important 1307. pro augmento

I

sinus, quantum augmenti inferent 30. quæ

O O I

sunt inter 3. & 3. 30. peracta operatione in-  
venio 871. quæ partes si addantur ad 5233.  
resultabunt 6104. pro sinu 3. 30. & sic in re-  
liquis omnibus.

*Hac methodo conduntur tabula sive si-  
nuum sive tangentium & secantium omni-  
um angulorum à minutis ad minuta ab 0.  
usque ad 90. grad.*

Nota

*Nota, per hanc ultimam regulam non inveniri exacte sinus, quia sinus non eadem proportionem cum arcibus sua augmenta capiunt: sed error tam exiguus est, ut non necessum sit exactiorem operationem instituisse.*

38. Mediantibus his tabulis computantur triangula, quia certi sumus in quovis triangulo latera inter se esse, ut sinus angulorum oppositorum: exempli gratia in triangulo  $abc$ , ex centro  $e$  circulo circumscripto, perpendiculares  $ei$ ,  $eb$ , dividunt bifariam latera  $ab$  &  $bc$  (4. 6.) hinc  $ab$ .  $bc :: ai$ .  $bb$ . Sed  $ai$  est sinus anguli  $aei$ , vel  $acb$ , qui (4. 13.) illi æqualis, & similiter  $bb$  est sinus anguli  $bcb$  vel  $bac$ : Ergo, &c.



39. Ex hoc principio, cognitis duobus angulis & uno latere, vel duobus lateribus & uno angulo, invenire reliqua. Operare per regulam proportionum; ut se habet unum latus cognitum ad sinum anguli oppositi noti; sic se habet alterum latus notum ad quartum numerum, qui erit sinus anguli alteri lateri oppositi. Vel m. si duo anguli sint cogniti cum uno latere, sic procedendum erit; ut se habet sinus anguli dati ad latus huic angulo oppositum: sic se habet sinus alterius anguli cogniti ad quar-

tum numerum, qui erit latus alteri huic angulo oppositum &c.

40. Operationes hæ nunc in compendium redactæ sunt: nam solliciti fuerunt, non tantum sinus & tangentes in tabulas redigere, sed etiam illorum logarithmos, è regione respondentes; Ita ut loco multiplicationis & divisionis, quam labore intolerabili in calculo sinuum & tangentium adhibere necessum habemus, in applications logarithmorum saltem additione vel subtractione utamur: ut si in triangulo  $ABC$ , (9.18) cujus latus  $AC$  est notum nimirum

Sin. ang. $A$ . 20 gr.	9. 5340517
$AC$ . 10. ulnarum.	1. 0000000
Summa	10. 5340517.
Sin. ang. $B$ . 10. gr.	9. 236702.
Residuum quod est	
$CB$ . 19, $\frac{7}{8}$ ulnarum.	1. 2943815.

10. ulnarum angulus  $ABC$  10. grad. angulus  $CAB$  20. grad. quæreretur latus  $BC$ , dicendum esset, ut se habet sinus anguli  $B$  (qui in tabulis est 17364.) ad latus  $AC$ , quod est cognitum 10. ulnarum: sic se habet sinus anguli  $A$  (qui est in tabulis 34202) ad latus



rus  $CB$ . quod quantur ad hoc quantum  $CB$  inveniendum necessum esset multiplicare secundum terminum 10. per tertium 34202. & productum 342020 dividere per primum 17364. quod prolixum est. Sed loco horum numerorum accipimus illorum logarithmos, addendo logarithmum 20. grad. logarithmo 10. ulnarum, & à summa auferendo logarithmum 10. grad. & restabit logarithmus 1.294385. qui in tabula reperitur inter 19. & 20. ita ut latus  $CB$  ferme sit 20. ulnarum.

*Libri, qui situs & logarithmos tradunt, specialius hæc explicant. Nihilominus puto me tantum dixisse, quantum scire necesse est, ut quis in his omnibus proprio Marte progredi possit. Adduntur quedam aliæ proportionales hanc rem concernentes in continuatione hujus Geometriae.*

**41. Invenire lineam rectam, quæ quàm proxime æqualis sit circumferentia circuli.** Sumta duodecies  $b$ . &

tangente 30. grad. hisque duodecim tangentibus ita circa circumulum dispositis, ut semper binæ & binæ ponantur in directum, ceu videre est in figura art. 27. in qua  $d$  &  $g$  sunt duæ tangentibus oppositæ, ita ut quælibet respondeat 30. grad. & similiter  $e$  &  $h$ , &  $d$  &  $i$ , &c. producet hac ratione polygonum circumscriptum 6. laterum, cujus circum-

ferentia major erit circumferentia circuli (4. 27.) Si verò sinus *ie* duodecies sumatur, constituetur polygonum inscriptum 6. laterum, cujus circumferentia minor est circumferentia circuli. Hinc si radius *ab* datus sit partium 1, 000, 000, erit tangens *bd* 577, 350. duodecies sumta, id est, 6. 928, 200, major circumferentia circuli, & sinus *ec* 500, 000 duodecies sumtus, nimirum 6, 000, 000, minor erit circumferentia circuli.

42. Sed si loco tangentis & sinus de 30. grad. quem duodecies sumasti, nunc accipias tangentem & sinum unius gradus, nimirum 17455 & 17452. constituentur duo polygoni, alterum circumscriptum 6, 283, 800. majus, & alterum inscriptum 6, 282, 720. minus circulo.

43. Tandem sit radius datus 100, 000, 000, 000, & accipiat tangens & sinus unius minuti 21600 es, (nam tot sunt minuta in circulo) constituetur 628, 318, 512, 000 minus (nam sinus 1. minuti est 29, 088, 820.) & 628, 318, 533, 600. majus. (nam tangens 1. minuti est 29, 088, 821.) Et si hi tres numeri, radii nimirum, polygoni circumscripti & inscripti dividantur per 100, 000, restabunt pro radio 1, 000, 000 : & perimenter polygoni circumscripti erit 6, 283, 185  $\frac{336}{1000}$  & perimenter inscripti erit 6, 283,

185  $1\frac{12}{100}$  Ita ut hæ duæ circumferentiæ, quarum altera est major circumferentia circuli, & altera minor, nihilominus inter se non differant centum millesima parte radii. Si quis voluerit sumere sinum & tangentem unius secundæ, immensum in modum proximior fieret æqualitas perimetrorum polygoni circumscripti & inscripti.

44. In praxi assumitur diametrum esse quam proxime ad circumferentiam ut 7. ad 22. id est, si semidiameter vel radius divisus sit in 7, circumferentia proxime continebit illarum partium 44: & hoc convenit cum eo, quod explicavimus. Nam  $7,44 :: 100, 628\frac{4}{7}$ .

45. *Invenire aream circuli dati.*

Si radius vel semidiameter divisus sit in 1000, circumferentia proxime habebit 6283. Jam multiplicata semissi hujus circumferentiæ 3141. per radium 1000 erit productum 314 1000. pro tota area circuli: (4.41.) Si vero semidiameter fuerit alterius mensuræ exempli gratia 9. pollicum, dicendum erit 1000. 3141 :: 9.  $16\frac{269}{7000}$  & ultimus

hic numerus postea multiplicandus (qui esse debet semicircumferentia) per 9.

( qui est semidiameter ) & resultabunt.

173  $\frac{421}{888}$  pro area circuli.

*Vi mihi videtur, magis commoda est hac proportio de 1000. ad 3141. quam illa qua communiter adhibetur 7. ad 22.*

46. *Metiri capacitatem parallelepipedì, vel cylindri.* Multiplica basin per altitudinem perpendiculararem.

47. *Metiri pyramidem vel conum.* Multiplica tertiam partem bascos per altitudinem.

48. *Metiri spheram.* Multiplica tertiam partem superficiei per semidiametrum, vel etiam duas tertias maximi circuli per diametrum.

**F I N I S.**



**APPEN-**

APPENDICIS LOCO

adjicere placuit

*Caput nonum Part. IV.*

ex

LOGICA SIVE  
ARTE COGI-  
TANDI,

*ex Gallico sermone in Latinum  
translata;*

quia illud cum methodo auctoris no-  
stri maxime convenit.



*De quibusdam defectibus in Geometrarum metodo passim obvis.*

**Q**Uod in Geometrarum metodo obviam est, jam vidimus ad quinque regulas à nobis reductum, in quibus observandis nimii esse non possumus: & fatendum quidem est, rem esse prorsus admirabilem, tot occulta & eruta esse, & firmissimis rationibus demonstrata ope regularum adeo paucarum: ita ut inter omnes Philosophos soli Geometræ sint, qui suis è scholis & libris disputationes litesque exterminarunt.

Nihilominus si, sepositis præjudiciis, dicenda sententia sit, uti ea laude spoliari non debent, quod viam præ cæteris omnibus maxime certam instituerunt ad veritatem assequendam, ita negari non potest, quin in aliquos defectus lapsi sunt, qui à fine quidem proposito eos non averterunt, sed tamen per devia & incommodas viarum asperitates circumduxerunt. Et hoc illud est quod tractis ipsius Euclidis exemplis conabor ostendere.

**DEFECTUS PRIMUS.**

*De certitudine, quàm de Evidentia; de intellectu convincendo, quàm illuminando magis laborare.*

Lau-

Laudi Geometris dandum, quod nihil proferant nisi certum & demonstratum. Sed videntur non satis animadvertisse ad perfectam alicujus veritatis scientiam, non sufficere illam habere pro vera & demonstrata, si insuper rationibus petitis ab ipsis rei cognitionis visceribus penitissimè non pervideamus, cur illa vera sit. Nam quamdiu citra hoc genus certitudinis consistimus, animis nostris plenè factum non erit satis, altiore quippe penitioremque rerum cognitionem concupiscimus, quòd indicio est, nos veram perfectamque cognitionem nobis nondum comparavisse. Dici potest, quod hic Defectus cæterorum, quos infra perstringemus, causa sit & origo; ac proinde non est cur illi denudando diutius hoc loco immoremur, cum id in sequentibus fiet.

### DEFECTUS SECUNDUS.

*Ea probare, quæ probatione non egent.*

Fatentur Geometræ non esse probanda, quæ ex se clara sunt: Ea tamen sapissime probant. Quia cum ad assensum extorquendum magis, quàm ad intellectum illuminandum sese, uti diximus, applicuerint, hoc abundantius crediderunt se fuisse præstituros, si res etiam evidentes probatiunculis stabilirent, quàm si easdem simpliciter proponerent, agnoscendamque menti evidentiam committerent.

Hoc illud est, quod Euclidem impulit ad

probandum duo trianguli latera simul sumpta esse tertio majora. Quamvis hoc ex ipsa linear rectæ notione evidens sit, quæ est earum brevissima, quæ inter duo puncta duci possunt; & quæ est naturalis mensura intervalli, quo punctum à puncto distat: quod tamen non foret, si omnium linearum brevissima non esset, quæ à puncto ad punctum ducuntur.

Hoc etiam illum compulit, ut Problema demonstrandum faceret, quod poterat inter postulata reposuisse, sc. *ducere lineam æqualem lineæ datæ*. Quamvis hoc facillimum sit, imò facilius quam circulum dato radio describere.

Procul dubio hic defectus ex eo ortum duxit, quod Euclides non consideravit omnem certitudinem omnemque evidentiam cognitionum nostrarum in scientiis naturalibus huic principio inniti: *Quicquid in clara & distincta Idea alicujus continetur, potest de illo verè affirmari*. Ex quo sequitur, si per simplicem tantum Idæ considerationem, nullis aliis Ideis ascitis, cognosci potest attributum in illa Idea contineri, propositionem debere pro evidenti & clara haberi, quemadmodum superius dictum est.

Novi equidem esse quædam prædicata, quæ minori negotio cognoscuntur Ideis inesse, quam alia; sed si inesse cognosci possunt mediocri attentione, ita ut nullus, cui

Una



sana mens, de eorum connexionē possit seriò dubitare, sufficere arbitror, ut Propositiones ejusmodi, ex Idearum simplici consideratione enatæ, principiorum loco sint, quæ demonstratione non indigeant: Sed, ut plurimum, brevi aliqua explicatione. Ac proinde contendo neminem, qui vel tantillum ad ideam lineæ rectæ attenderit, non esse perspecturum, non tantum quod à duobus punctis ejus notio dependeat, (quod Euclidi postulatum est) sed etiam, idque facile & clarissimè, quod, (si linea recta rectam secet, sintque in secante duo puncta, quorum utrumlibet æqualiter distat à duobus punctis in linea secta) quod, inquam, aliud in secante idari punctum non possit, quod non æqualiter distet à duobus punctis in linea secta assignatis. Ex his facile cognosci poterit, quando linea ad lineam erit perpendicularis, sine angulorum triangulorumque auxilio, quæ tum demum tractari debent, cum multa fuerint demonstrata, quæ non nisi ope linearum perpendicularium demonstrari possunt.

Observatione etiam dignum est, maximos Geometras pro principiis ponere Propositiones hac nostra multo obscuriores. Archimedes etenim pulcherrimas suas demonstrationes huic axiomati inædificavit. Si *duæ lineæ in eodem plano easdem extremitates habent; & si curvæ vel cavæ sint ver-*

*sus eandem partem, contenta minor erit  
continente.*

Fateor equidem, probare id, quod probatione non indiget, vitium videri quam minimum, imò in se nullum esse: Est tamen, si ea consideremus, quæ inde sequuntur. Hinc enim illa naturalis ordinis inversio oritur, de quo infra agemus, cum hæc prurigo ea probandi, quæ pro claris ex se & evidentibus supponi debent, ipsos Geometras adegerit, ad illa tractanda, (ut scil. iis probandis inservire possent, quæ probari non debebant) quæ postea tantum secundum naturalem rerum ordinem essent resumenda.

### DEFECTUS TERTIUS.

*Demonstrare per impossibile.*

Hoc genus demonstrationum, quo quid demonstratur, non per propria rei principia, sed per aliquod (si res aliter sese haberet,) inde subsequutum absurdum, apud Euclidem frequentissimum est. Cum tamen manifestum sit, tales demonstrationes assensum quidem nostrum extorquere, non autem intellectum clarigare: qui tamen scientiarum finis præcipuus esse debet. Animus enim noster tranquillus quietusque non fit, nisi sciat & rem esse, & rationem cur ita sit, quod non habetur à Demonstratione deducente ad impossibile.

Non tamen omnino rejiciendæ sunt tales demonstrationes: nam adhiberi possunt ad  
pro-

probandas conclusiones negativas, quæ propriè corollaria tantum sunt aliarum propositionum, vel ex se evidentium, vel aliàs demonstratarum. Et tunc etiam hoc genus demonstrationis ad impossibile adigens, explicationis potius loco habendum est, quàm novæ demonstrationis.

Tandem dici potest hæc demonstrationes tunc tantum admittendas, cum aliæ excogitari non possunt. Culpa tamen non caret, qui illis utitur ad conclusiones positivas probandas. Jam verò multa sunt in Euclide hoc modo demonstrata, quæ tamen facili negotio aliter possent demonstrari.

#### DEFECTUS QUARTUS.

*Demonstrare per aliena & remota.*

Hoc vitium apud Geometras Communissimum est: parum illi solliciti sunt, unde probationes accersant, modo demonstrativas nanciscantur; cum tamen demonstratio imperfectissima sit, quæ instituitur per aliena & remota, à quibus res demonstratæ secundum naturæ ordinem non dependent.

Dictis lucem ab exemplis scenerabimur. Euclides l. 1. pro 5. probat triangulum Isosceles habere duos angulos ad basim æquales, ad hoc, latera æqualiter producit, nova hinc triangula fabricatur, quæ demum cum aliis jam factis comparat.

Nunquid autem incredibile non est, rem adeò facilem, ac est hæc angulorum æqualitas,

litas, tantis ambagibus indigere ad sui probationem. Nunquid quidpiam magis ridiculum, quàm hanc angulorum æqualitatem à peregrinis illis angulis deducere; cum naturalem ordinem servanti, & facilimi & maxime naturales modi quam plurimi se offerant illam æqualitatem probantes.

Propositio 47. l. 1. quæ probat quadratum basis angulo recto subtensæ, æquale esse quadratis reliquorum laterum, inter Euclideanas propositiones decantatissima est. Evidens tamen est adductam demonstrationem naturalem non esse, cum æqualitas quadratorum à triangulorum æqualitate non dependeat, quod tamen est hujus demonstrationis medium; sed à linearum. proportionem, quæ facile potest demonstrari ope solius perpendiculari, ab angulo recto ad basin demissi.

Euclides totus scater hujusmodi demonstrationibus à remotis & alienis.

### DEFECTUS QUINTUS.

*Non observare naturalem rerum ordinem.*

Turpissimum Geometrarum vitium hoc est; nullum enim illi ordinem sibi observandum rati sunt, modo priores propositiones ita disponant, quæ posterioribus possint demonstrandis inservire; ac proinde veræ methodi regulas negligentes, (qua docemur à simplicibus, & maxime generalibus semper ordiri, ut demum ad composita & parti-

cula

cularia descendamus, ) omnia confundunt; unà lineas & superficies, triangula & quadrata commiscunt; figurarum ope linearum proprietates demonstrant, aliaque multa invertunt, unde scientiæ pulcherrimæ labes foedissima aspergitur.

In Euclidis Elementis creberrimum est hoc vitium. Cum quatuor prioribus libris de extenso actum fuerit, quinto agitur de proportionibus omnimodarum generaliter magnitudinum: sexto extensum resumitur: septimo, octavo, & nono de numeris differitur, ut de extenso demum agatur in decimo. En præposterum omnium ordinem! sed etiam in particularibus infinites peccat, primū librum orditur à constructione trianguli æquilateris, & demum, post duas supra viginti propositiones, generalem methodum præscribit trianguli conficiendi ex datis tribus lineis rectis, modo duæ sint tertia majores, quod ex constructione trianguli æquilateris super linea data notum erat.

Nihil de lineis perpendicularibus demonstrat, vel de parallelis, nisi per triangula. Superficierum dimensiones cum dimensionibus linearum confundit.

Libro primo pro. 16. demonstrat, producto latere trianguli, angulum exteriorum majorem altero interiorum oppositorum, & inferius post 16. propositiones, probat hunc angulum esse æqualem duobus rectis.

Ex-

Exscribendus nobis esset Euclides, si omnia hujus vitii exempla vellemus adducere.

### DEFECTUS SEXTUS.

*Non adhibere divisiones & partitiones.*

Et hujus vitii accusanda Geometrarum methodus. Non quod Generum de quibus agunt omnes species non notent, sed quia id faciunt termines simpliciter definiendo, definitiones tum subjiciendo, cum tamen declarare deberent & genus tot species habere, & plures non posse habere, quia Generalis Idea Generis plures recipere differentias non potest; quod multum lucis afferret ad generis specieique naturas penitus cognoscendas.

Exempli libro primo Euclidis habentur definitiones omnium specierum trianguli; sed quis non videt multam claritatis affusurum, si ita illæ proponerentur.

Triangulum dividi potest, vel secundum latera, vel secundum angulos.

Latera sunt vel Omnia æqualia, & vocatur *Æquilaterum*. Vel Duo tantum æqualia, & vocatur *Isofceles*. Vel Omnia inæqualia, & vocatur *Scalenum*.

Anguli sunt vel Omnes acuti, & vocatur *Oxigonum*. Vel Duo tantum acuti, & tunc tertius est. Vel Rectus, & dicitur *Rectangulus*. Vel Obtusus, & dicitur *Ambligonum*.

Præstat autem, tum demum hanc trianguli divisionem tradere, cum prius explicatæ & demonstratæ fuerint generales trianguli proprietates, unde poterit cognosci duos saltem angulos in triangulo debere esse acutos, quia tres junctim duobus rectis æquivalent.

Hoc vitium coincidit cum illo inversi ordinis: non enim debemus de speciebus agere vel eas etiam definire nisi postquam probe ipsum genus cognovimus, præsertim si multa de genere dici possunt & explicari, sine specierum mentione.



# INDEX

Vocum in hac Geometria  
explicatarum.

Primus numerus notat librum, &  
reliqui articulum.

## A.

<i>Æquilaterum</i>	2. 7
<i>Equimultiplex</i>	6. 15
<i>Alternando, invertendo &amp;c.</i>	6. 9. 8
<i>Amblygonium vel obtusangulum</i>	2. 6
<i>Anguli alterni, interni</i>	1. 30
<i>Angulus rectus, obtusus, acutus</i>	1. 17
<i>Anguli externi trianguli</i>	2. 10
<i>Anguli oppositi, deinceps</i>	1. 17
<i>Angulus rectilineus, curvilineus, mixtus.</i>	1. 6
<i>Angulus subtensus vel oppositus</i>	2. 17
<i>Arcus</i>	1. 11
<i>Area, capacitas vel magnitudo figura</i>	9. 25

## C.

<i>Circinus s. instrumentum proportionum</i>	9. 14
<i>Circulus</i>	1. 10
<i>Circumferentia</i>	ibid.
<i>Commensurabilis</i>	7. 4
<i>Commensurabilis potentia.</i>	7. 33
<i>Complementum in parallelogrammo.</i>	3. 12
<i>Complementum anguli</i>	9. 30
<i>Congrua figura</i>	2. 12
<i>Conversa propositio</i>	1. 33
<i>Convertendo, componendo &amp;c.</i>	6. 11 12. &c.
<i>Corpus s. solidum</i>	1. 4.
<i>Cru-</i>	



# INDEX.

<i>Crura, latera circa angulum rectum trian-</i> <i>guli</i>	6.61
<i>Cubicus numerus</i>	7.39

## D.

<i>Diagonalis, diameter, linea ducta ex an-</i> <i>in angulum in parallelogrammis</i>	3 7
<i>Diameter</i>	1.12. & 3.7

## E.

<i>Ex aquo, proportio</i>	6.13. 14
---------------------------	----------

## G.

<i>Geometrica progressio</i>	8.8
<i>Gnomon</i>	3 12
<i>Gradus progressionis</i>	8.10
<i>Gradus minuta, secunda</i>	1. 24

## H.

<i>Harmonica progressio</i>	8.32
<i>Homologa latera</i>	6. 31
<i>Hypotenusæ, maximum latus trianguli</i> <i>rectanguli</i>	6. 61

## I.

<i>Incommensurabilis</i>	7.5
<i>Invertendo, alternando &amp;c.</i>	6. 8. 9. &c.
<i>Iso-perimetre</i>	4.32 in fine
<i>Iso-celes, triangulum habens duo crura æ-</i> <i>qualia</i>	2.7

## L.

<i>Latera sive radices numerorum</i>	7.10
<i>Logarithmi</i>	8. 26

## M.

<i>Magnitudo</i>	6. 1
<i>Metiri</i>	7.1
<i>Minu.</i>	

# INDEX.

*Minuta, gradus* 1. 24  
*Multiplicare lineam per aliam lineam, vel*  
*per superficiem* 6. 17. 18.

## N.

*Numerus planus* 7. 9. *solidus* 7. 37  
*Numeri plani similes* 7. 14  
*Numerus quadratus* 7. 12. *cubicus* 7. 39

## O.

*Obliqua, linea* 1. 17  
*Oxygonium vel acutangulum* 2. 5

## P.

*Parallele* 1. 26  
*Parallelogrammum* 3. 2  
*Parallelogramma circa diametrum* 3. 12  
*Pars* 7. 2. *Partes* 7. 3  
*Perpendicularis* 1. 15  
*Planum vel superficies plana* 1. 5  
*Possè: linea potest bis aliam* 7. 32  
*Potentia prima* 7. 32. *secunda* 7. 35  
*Problema, Theorema* 9. 1  
*Progresio Arithmetica* 8. 2. *Geometrica* 8. 8  
*Harmonica* 8. 32.  
*Progresio quadratorum, cuborum &c.* 8. 34  
*Proportio* 6. 6

## Q.

*Quadrilaterum, figura quatuor later.* 3. 1  
*Quantitas* 1. 2  
*Quadrati quadratum, sur solidus &c.* 8. 10

## R.

*Radix vel latus numerorum.* 7. 10  
*Ra-*

# INDEX.

<i>Radius vel semidiameter</i> 1. 13. <i>vel sinus totus</i>	4. 7.
<i>Ratio</i>	6. 2
<i>Ratio composita</i>	6. 26
<i>Ratio duplicata</i> 6. 29. 30. <i>Triplicata</i>	6. 36
<i>Ratio aequalis vel proportio</i>	6. 4. 6
<i>Ratio major</i>	6. 5
<i>Reciproca</i>	4. 9
<i>Rectangulum simpliciter pro parallelogrammo rectangulo</i>	3. 3
<i>Rhombus</i>	3. 4
<i>Rhomboides</i>	3. 5

## S.

<i>Scalenum, triangulum tribus lateribus inaequalibus</i> 2. 7. <i>Conus vel Cylindrus vel parallelepipedum</i>	5. 12
<i>Secans, tangens, sinus</i>	4. 9
<i>Similia triangula</i> 6. 44. <i>Rectangula</i>	6. 30
<i>Sinus, tangens, secans</i>	4. 9
<i>Sinus complementi</i>	9. 28
<i>Solida</i> 6. 54. <i>Figura</i>	6. 48. 47
<i>Solidum corpus</i> 1. 4. <i>Angulus solidus</i>	5. 4
<i>Superficies plana vel planum</i>	1. 4
<i>Surfolidus, quadratus, cubus &amp;c.</i>	8. 10

## T.

<i>Tangens, sinus, secans</i>	4. 9
<i>Termini progressionis</i>	8. 1
<i>Theoremata, Problemata</i>	9. 1
<i>Trapezium, quadrilaterum irregulare</i>	3. 2



M. O. m.  
18/12/91  
Reg.

36 x

